

اندازه گیری طیف مقادیر نرمال اروفلومتری در مردان ۱۵-۴۵ ساله شهر تبریز

دکتر مهدی عابدین زاده^۱، دکتر محسن امجدی^۲

چکیده

مقدمه: با توجه به نیاز نموداری مرجع برای مقادیر اروفلومتری مردان و این که اروفلومتری تستی آسان، غیر تهاجمی و ارزان برای غربالگری و مشخص شدن اختلالات دفع ادرار می باشد این نوموگرام با شامل شدن طیف مقدار حداکثر سرعت جریان ادرار و متوسط جریان ادرار ارتباط معنی داری با حجم ادرار دفع شده بر اساس سن دارد. میانگین حداکثر سرعت جریان ادرار در حجم های ادراری بین ۱۵۰-۴۰۰ ml/s و میانگین متوسط سرعت جریان ادرار در حجم های ادراری بین ۴۰۰-۱۵۰ ml/s است بیشترین میزان حداکثر سرعت جریان ادرار در افراد زیر ۳۰ سال داشتیم و میزان آن ۳۹ ml/s بود با افزایش سن حداکثر سرعت جریان ادرار کاهش می یافتد. این مطالعه به علت نیاز به یک نمودار مرجع برای ارزیابی نتیجه آزمون اروفلومتری مردان در سنین ۱۵-۴۵ سال در حجم های مختلف ادراری در جمعیت نمونه ای که دارای ساختار اجتماعی - فرهنگی، جسمانی شبیه جامعه ما باشد صورت گرفته است.

روش بوسی: آزمون اروفلومتری در مردان ۱۵-۴۵ سال سالم شهر تبریز به صورت مقطعی و انتخاب طبقاتی خوش ای صورت گرفته است. حداکثر سرعت جریان ادرار (Qmax) و سرعت متوسط جریان ادرار (Qave) با حجم مقایسه و نوموگرام حجم ادرار با حداکثر (Qmax) و متوسط جریان ادرار (Qave) رسم شد این نوموگرام طیف وسیعی از حجم های ادراری ۲۵-۸۰۰ ml را شامل می شود.

نتایج: طبق نتایج به دست آمده حداکثر جریان ادرار با حجم ادرار دفع شده ارتباط دارد. همچنین متوسط جریان ادرار ارتباط معنی داری با افزایش سن داشت ($P=0.023$). در این مطالعه میانگین حداکثر سرعت جریان ادرار در حجم های ادراری بین ۴۰۰ ml-۱۵۰ ml برابر ۲۶ ml/s و میانگین متوسط سرعت جریان ادرار در حجم های ادراری بین ۴۰۰ ml-۱۵۰ ml/s است. بیشترین میزان حداکثر سرعت جریان ادرار در افراد زیر ۳۰ سال داشتیم و میزان آن ۳۹ ml/s بود با افزایش سن حداکثر سرعت جریان ادرار کاهش می یافتد.

در این تحقیق شتاب جریان ادرار نیز در مردان محاسبه شد همچنین اندازه گیری شبیه اولیه منحنی (Initial Slop) در حجم های ادراری زیر ۱۵۰ ml در افراد نرمال و غیر نرمال نشان داد که میزان شبیه منحنی داری با یکدیگر داشته و در افتراق افراد نرمال از غیر نرمال در حجم های ادرار زیر ۱۵۰ ml کاربرد کلینیکی دارد.

نتیجه گیری: نوموگرامهای به دست آمده از این مطالعه می توانند در تفسیر نتایج تست های ارودینامیک بیماران بخش های ارولوژی مورد استفاده قرار گیرد از میان وسیله های تشخیصی مثل سیستوسکوپی و رادیولوژی و ارودینامیک برای بررسی انسداد و اختلالات دفع ادرار به نظر می رسد که اروفلومتری تستی ساده و ارزان و غیر تهاجمی برای غربالگری و مشخص کردن این اختلالات باشد.

واژه های کلیدی: اروفلومتری - نوموگرام - مردان - مردان تبریز

مقدمه

حدودی این مسئله را آسان می کند و حائز اهمیت است که ارولوژیست ها اطلاعاتی در مورد مطالعات ارودینامیک و تفسیر نتایج آنها داشته باشند.

طی سالهای اخیر مطالعات ارودینامیک گسترش یافته و تغییرات تکنولوژی و ساختن تجهیزات جدید این مطالعه را ساده نموده است. اخیراً بررسی های وسیعی برای مشخص کردن کارآیی

زمانی که با بیماران دارای علایم ادراری تحتانی رو برو می شویم معمولاً انتخاب نوع آزمون جهت بررسی بیمار آسان نمی باشد. تجربیات بالینی در بررسی مسایل ارودینامیک تا

- ۱- استادیار گروه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
- ۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی رفسنجان
- ۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز

تعیین مقادیر طبیعی در مردان نرمال با توجه به سن و نعیین فراوانی منحنی‌های نرمال می‌باشد. چرا که در اکثر مطالعات این مقادیر به صورت منحنی رسم شده است تا تمامی مقادیر به دست آمده از اروفلومتری با این منحنی‌ها مقایسه شود.

روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعي و نمونه‌گیری به روش خوش‌های بوده است طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی جمعیت مردان ۴۵ تا ۱۵ ساله شهر تبریز با استفاده از مطالعه ۱۹۹۸ SD George ۱/۹۶ Z برابر ۸ و Qmax برابر ۲۵ بگیریم) و با توجه به این که هدف به دست آوردن یک نرمالیته در یک اجتماع است) و d (یعنی درجه اعتماد بیش از ۹۵٪ برای این مطالعه در صورتی که متوسط $\frac{S^2 Z^2}{D^2}$ حجم نمونه ۲۴۳ نفر به استفاده از فرمول دست آمد که در نهایت از نتایج ۳۳۰ آزمون اروفلومتری آنالیز به عمل آمد که این تعداد حجم نمونه تحقیق با توجه به لیست ۱۵ مرکز بهداشتی درمانی و با در نظر گرفتن پراکندگی جمعیتی و تفاوت‌های اقتصادی - فرهنگی به تناسب تعداد مردان مورد نیاز تعیین شد و نمونه‌گیری به صورت کاملاً تصادفی بود.

در این مطالعه فرد طبیعی به کسی اطلاق می‌شود که با توجه به شرح حال گرفته شده :

- در حال حاضر هیچگونه شکایت ادراری نداشته باشد.
- سابقه عمل جراحی اروثیتال و حتی سیسیتوسکوپی نداشته باشد.


- سابقه عفونت ادراری در ۳ ماه گذشته نداشته باشد.

پرسشنامه‌ای شامل سوالاتی در مورد تأهیل، سابقه عمل جراحی، سابقه عفونت ادراری و وجود یا عدم وجود علایم تحریکی و انسدادی سیستم ادراری تحتانی بود. سابقه هرگونه بیماری از جمله دیابت، دیسکوپاتی یا بیماری‌های عصبی و دست کاری مجرأ و سابقه مصرف دارو و یا رادیاسیون از افراد سؤال می‌شد بایستی نمونه‌های انتخابی از نظر تمام موارد ذکر شده منفی می‌بود از افراد شرکت کننده درخواست می‌شد که جهت انجام اروفلومتری در حالت نیمه ایستاده و با مثانه پر یا وقتی که فرد میل طبیعی به دفع ادرار داشت با دستگاه اروفلومتری MMS2000



تست‌های ارودینامیک و به دست آوردن معیارهای لازم جهت افتراق افراد نرمال از غیر نرمال صورت گرفته است^(۱). برای بررسی اختلال عملکرد سیستم ادراری تحتانی ساده‌ترین و بی‌ضررترین و ارزان‌ترین آزمون انجام اروفلومتری می‌باشد. تعیین مقادیر طبیعی پارامترهای اروفلومتری در حجم‌های مختلف ادراری دفع شده، اولین قدمی است که بر اساس آن، موارد غیر طبیعی مقایسه و تعیین می‌گردند. شیوع نسبتاً زیاد اختلال عملکرد سیستم ادراری تحتانی در مردان ایجاب می‌کند که ابتدا در مردان طبیعی این پارامترها اندازه‌گیری و تعیین شده و سپس یافته‌های بیماران با آنها مقایسه شوند.

با توجه به این که میزان سرعت جریان ادرار وابسته به حجم ادرار دفع شده است حدود نرمال باید طیف وسیعی از حجم‌های ادراری را بپوشاند و ایده‌آل آن است که به شکل یک نوموگرام باشد. علیرغم این که حداکثر سرعت جریان ادراری و متوسط سرعت جریان ادراری توسط انجمن بین‌المللی کنترل ادرار - International Continence Society (ICS) تعریف شده است ولی حداقل‌ها نامشخص می‌باشد. مطالعات گذشته اکثراً معطوف به اندازه‌گیری مقادیر اروفلومتری و طیف نرمال و تغییرات سنی در مردان مربوط به کشورهای خارجی است که اختلاف نسبتاً زیاد از نظر فیزیکی - عادات تخلیه ادرار - نحوه تخلیه ادرار - میزان مصرف مایعات و نوع آنها و عوامل متعدد دیگر در مردان نقاط مختلف جهان وجود دارد لذا این بررسی برای به دست آوردن مقادیر طبیعی اروفلومتری در مردان ۴۵-۱۵ ساله شهر تبریز صورت گرفته است و حداقل می‌تواند قابل تعمیم به مردان ۴۵-۱۵ ساله استانهای آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - ارومیه - کرمانشاه و زنجان باشد. در این تحقیق سعی شده است میزان نرمال پارامترهای اروفلومتری در مردان سالم برای حجم‌های مختلف ادرار از ۲۵-۸۰۰ ml محاسبه شده است و رابطه یافته‌های اروفلومتری، متوسط جریان ادرار، حداکثر سرعت جریان ادرار، حجم ادرار و زمان با یکدیگر ارزیابی شده است.

اهداف اصلی مطالعه به صورت رسم نمودار رابطه حداقل سرعت جریان ادرار و سرعت متوسط با توجه به حجم ادرار و



نمودار (۳): نوموگرام Qave در رابطه با حجم ادرار در مردان

نمودار (۴): رابطه بین Qave (متوسط جریان ادرار) و سن ارتباط بین متوسط جریان ادرار و سن کاملاً معنی دار است ($P<0.023$)


نمودار (۵): رابطه بین Qmax (حداکثر جریان ادرار) و سن همچنان ارتباط بین حداکثر جریان ادرار و سن معنی دار بود

ارتباط جریان ادرار (متوسط و جداکثر) در نمودارهای ۴ و ۵ مشاهده می شود. نمودارهای صدقی 50% , 80% , 90% حداکثر سرعت جریان ادرار و سن و متوسط جریان ادرار و سن زیر 30 سال و بالای 30 سال رسم شده است (نمودارهای ۶، ۷، ۸ و ۹).


انجام می شد. از میان 350 نفر دعوت شده برای انجام تست 350 نفر مراجعه نمودند که پس از تست 20 آزمایش به علت انسدادی بودن واضح کنار گذاشته شد که در مجموع 330 آزمایش با استفاده از برنامه SPSS تحت آنالیز آماری و رسم نمودار قرار گرفت و فراوانی شکل های طبیعی مشخص شده و با استفاده از T-Test موارد نرمал و غیر نرمال مقایسه شد.

نتایج

۳۳۰ جواب آزمایش اروفلومتری مورد آنالیز قرار گرفت سن متوسط افراد 24 سال و حجم متوسط ادرار 303 ml بود 59.7% افراد متأهل و بقیه مجرد بودند نمودار (۱).



نمودار (۱): نمودار سنی افراد آزمایش شده به صورت زیر بود که نشان دهنده پخش نرمال آنها در ذیر منحنی نرمal است با استفاده از پارامترهای جداکثر جریان ادرار، سرعت متوسط جریان ادرار و حجم نمودار مقادیر طبیعی به صورت درصد رسماً شد. بنابراین آنالیز آماری رابطه معنی دار مثبت بین جداکثر سرعت جریان ادرار و حجم ادرار ($P<0.001$) و سرعت متوسط جریان ادرار و حجم ($P<0.01$) وجود دارد (نمودارهای ۲ و ۳).



نمودار (۲) نوموگرام Qmax در رابطه با حجم ادرار در مردان

بحث


در این مطالعه اروفلومتری در حالت نیمه ایستاده و با مثانه پر انجام شد که در تمامی نمونه این وضعیت ثابت بود ولی در مطالعه Cimentep ، Unsala اثر وضعیت ادرار کردن بر پارامترهای اروفلومتری و باقی مانده ادراری در بیماران با بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) نشان داد که سرعت جریان ادرار و حجم باقی مانده ادراری وضعیت (ایستاده و نشسته) ادرار کردن در بیماران با بزرگی خوش خیم پروستات دارد^(۸). نمودارهای به دست آمده شامل مقادیر مختلف ادرار از ۲۵۰-۸۰۰ ml در سنین ۱۵ تا ۴۵ ساله شهر تبریز بود که می‌تواند به راحتی در مراکز ارودینامیک و درمانگاههای ارولوژی مورد استفاده قرار گیرد. ضرورت رسم این نمودارها به علت عدم کمیت‌های ثابت در حجم‌های مختلف ادرار و سن هر فرد می‌باشد. به عنوان مثال حداقل سرعت جریان ادرار ۴۰ ml/s در حجم ۴۰۰ ml برای یک فرد ۲۵ ساله ممکن است طبیعی باشد ولی در حجم ۲۰۰ ml حداقل سرعت چنین عددی به دست نخواهد آمد و ممکن است کمتر از این عدد باشد.

نمودارهای مختلفی از جمله نمودارهای Siroky در دست است که رابطه حداقل سرعت با حجم مثانه بررسی شده است که این نمودارها برای مردان ایرانی نداشتم.


بین متوسط سرعت جریان ادرار و حجم ادرار و حداقل سرعت جریان و حجم مثانه بررسی شده است که این نمودارها برای مردان ایرانی نداشتم. بین متوسط سرعت جریان ادرار و حجم ادرار و حداقل سرعت جریان ادرار و حجم ادرار ارتباط معنی دار به دست آمد. رابطه خطی بین حجم ادرار و زمان ادرار کردن وجود دارد و از نظر آماری کاملاً معنی دار است.

نمودارهای صد کی ۵۰٪/۸۰٪/۹۰٪ حداقل و متوسط سرعت جریان ادرار می‌باشد و از نظر آماری معنی دار است ($P=0.0001$). همچنین مقایسه شب منحنی در حجم‌های ادرار زیر ۱۵۰ ml در افراد نرمال گروه I با افراد غیر نرمال گروه II نشانگر تفاوت معنی دار آنها با یکدیگر است.


میانگین حداقل سرعت جریان ادرار در حجم‌های ادراری بین




نمودار (۶): Qmax و سن به صورت درصدی زیر ۳۰ سال



نمودار (۷): رابطه Qave و سن به صورت درصدی زیر ۳۰ سال



نمودار (۸): رابطه Qmax و سن به صورت درصد بالای ۳۰ سال



نمودار (۹): رابطه Qave و سن به صورت درصد بالای ۳۰ سال

و Q_{max} بوده است^(۱) و در مطالعه ما این نسبت ۱/۷ به دست آمد. در مطالعه ما تمامی افراد غیر نرمال در زیر منحنی های نسبت Q_{max} و Q_{ave} بر ریشه دوم حجم ادرار قرار می گیرند محاسبه شب منحنی اروفلومتری با استفاده از تعیین نسبت Q_{max} بر حجم ادرار زیر ۱۵۰ ml نشان داد که میزان متوسط شب منحنی در افراد نرمال ۶۲٪ و در افراد غیر طبیعی ۸۶٪ می باشد.

طبق گزارش Girman^(۲) مردان ۴۰-۲۴ سال Q_{max} کمتر از ۱۵ ml/s دارند^(۷). که در مطالعه ما این عدد ۰/۱۲٪ و ۰/۰۶٪ مردان ۴۰-۴۴ ساله Q_{ave} کمتر از ۱۵ml دارند. صفر درصد مردان ۴۰-۴۴ سال Q_{max} کمتر از ۱۰ml/s دارند. Aganovicd^(۸) برای مردان با انسداد خروجی ادرار <۱۰ (کمتر از ۱۰) گزارش کرده است و ۸۴٪ علایم خفیف و ۹۳٪ با علایم متوسط و ۹۵٪ با علایم شدید ادراری داشتند^(۹). هم خوانی بین پارامتر حد اکثر سرعت جریان ادرار (Q_{max}) و سن و حجم پروستات PSA سرمه (International Prostat Symptoom score) قابل ملاحظه بود اما حجم پروستات به تنهایی برای بررسی شدت بیماری کفایت نمی کند^(۱۰).

نتیجه گیری

با این بررسی مقادیر اروفلومتری برای مردان شهر تبریز محاسبه و نمودارهای حجم و حد اکثر جریان متوسط جریان ادرار رسم شده است که در حال حاضر برای ارزیابی بیماران استانهای آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-اردبیل-کرمانشاه- زنجان قابل استفاده می باشد. در ضمن با توجه به این مطالعه و مطالعات قبلی علی رغم این که استفاده از مقدار Q_{max} نوموگرام های موجود و توجه به تست اروفلومتری مناسب ترین راه افتراق افراد نرمال و غیر نرمال است ولی در صورت ضرورت به حجم های زیر ۱۵۰ ml می توان از تعیین شب اولیه منحنی به عنوان یک ملاک قابل اعتماد جهت افتراق بیماران و افراد نرمال استفاده نمود^(۵). Q_{ave} و Q_{max} می توان به عنوان تست غربالگری استفاده نمود.

References:

1. Haylen B T, Parys B T, Anyaegunam W I, Deborah ashby west C R (1989). Urine flow rates in

۱۵۰ ml تا ۳۰۰ ml برابر/s ۲۶ ml/s و میانگین حد اکثر سرعت در حجم ادراری بین ۱۵۰ ml تا ۴۰۰ ml برابر ۲۶/۳ ml/s به دست آمد که حدود ۲ ml/s بیش از مقادیر تعیین شده در دیگر مطالعات است و همچنین میانگین حد اکثر سرعت در حجم ادراری بین ۴۰۰ ml تا ۷۰۰ عدد/s ۳۰ ml/s به دست آمد که نشانگر اثر افزایش حجم بر سرعت است. مشخص کردن حد اکثر سرعت های جریان ادرار به دست آمده از یک فرد نرمال در حجم های مختلف در نمودار درصدی نشان می دهد که الگوی ادرار کردن در یک فرد تقریباً ثابت است در نتیجه فردی که در یک بار ادرار کردن در قسم特 خاصی از منحنی قرار می گیرد (مثلاً در قسمت ۰/۸۰ در سایر اروفلومتریها نیز به همین نحو خواهد بود و این مسئله در انجام اروفلومتریهای سریال ارزش دارد).

در مطالعه ما با افزایش سن حد اکثر سرعت جریان ادرار به میزان $0/9$ ml/s به ازای هر ۵ سال کاهش می یابد اما در مطالعه Girman نشان داد که حد اکثر سرعت جریان ادرار وابسته به سن است و با افزایش هر دهه میانگین حد اکثر سرعت جریان ادرار به میزان $2ml/s$ کاهش می یابد^(۶) و یا به عبارت دیگر به ازای هر ۵ سال افزایش سن میانگین متوسط سرعت جریان ادرار به میزان $ml/s ۴۳٪$ سرعت جریان ادرار کاهش می یابد.

ثبت جریان ادرار در مردان در حجم های $150 ml/s$ تا $300 ml/s$ به دست آمد که در دیگر مطالعات $3/2 ml/s$ و $5/38 ml/s$ به دست آمد^(۷) که از Q_{max} شده است ثتاب محاسبه شده در مردان نسبت به دیگر مطالعات بیشتر می باشد که نشانگر تخلیه سریع تر ادرار در مردان ایرانی است (نسبت به دیگر گزارشات). این تخلیه سریع تر می تواند به عادات تخلیه و رژیم غذایی و نوشیدنی های مردم ایرانی ما برگردد و جای تحقیق و جستجوی بیشتری دارد.

تلاش های متعددی برای مقایسه افراد نرمال و غیر نرمال برای مشخص کردن معیارهای جدید صورت گرفته است که از جمله آنها رسم منحنی Q_{max} و Q_{ave} نسبت به ریشه دوم حجم ادرار Voiding efficacy معیار E (Qmax.Corr) و معروفی معیار male and female urodynamic patients compared with the liverpool nomogarms. Br. J. urol. (1990). 65,

- 483-478.
2. Haylen BT, Parys BT, Deborah ashby , Sutherst JR frezer MI, west C.R (1988). **Maximum and average urine flow rates in normal male and female population the nomograms** -Br. J.urol(1989). 64, 30-38.
 3. Bates P, Bradley WE, Glen E, Melchior H, Sterling A . **First report on the standardization of termionlogy of lower urinar tract function** Br. J. urol 1976 .48,39-42.
 4. Siroky MB, Olsson CA Krane RJ. **The flow rate nomogram 1. Development.** J. Urol. 1979. 122, 665-668.
 5. Marsheall VR, Ryall R.L, Austin ML, Sinclair GR **The use of urinary flow rates obtained from voided volumes less than 150 ml in the assesment of voiding ability.** B.J. urol, 1983, 53, 28-33.
 6. J. hnD. Mcconnell MD **Epidemiology etiology pathophysiology, and Diagnosis of BPH,** 1998: 1430
 7. Girman **Natural History, evalution, and nonsurgical management of BPH.** Walsh, Reti. Vaughan, wein (eds). Campbells urology 7 th ed WB Saunders 1998 (1450).
 8. Unsal A, Cimentepe E. **Effect of Voiding position on uroflowmetric parameters and post – void residual urine volume in patients with benign prostatic hyperplasia.** Scand J Urol Nephrol 2004, 38(3): 240-20.
 9. Agahovic D. **The role of uroflowmetry in diagnosis of infravesical obstruction in the patients with benign prostatic enargement** Med Arh 2004, 58(Isuppl 2)109-11.
 10. Veselys, Knutsont, Dawber E, Dieuion, Dahlstrandc. **Relationship between age, prostate volume, PSA, symptomscorand uroflowmetry in men with lower urinarg tract symptows.** Scand J urol Nephrol 2003-37(4):322-8.

