



مقایسه شاخص‌های رشد کودکان پنج ساله با و بدون سابقه کم وزنی موقع تولد

مهران کریمی^۱، راضیه فلاح^{۲*}، محمدحسین فلاح زاده^۳، علی دهقانپور^۴، محسن میرزایی^۵

- ۱- متخصص کودکان، دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
- ۲- فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
- ۳- دانشیار گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
- ۴- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
- ۵- معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۸/۵

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

چکیده:

مقدمه: کم وزنی نوزاد در موقع تولد (LBW یا وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم) از جدی‌ترین مشکلات کودکان جهان امروز می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شاخص‌های رشد (وزن، قد، دور سر و BMI) کودکان پنج ساله با سابقه کم وزنی موقع تولد با کودکان دارای وزن تولد طبیعی (NBW یا وزن ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم) صورت گرفت. روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی تحلیلی، کودکان پنج ساله‌ای که از دی ۸۷ لغایت اردیبهشت ۸۸ به مرکز بهداشتی درمانی آژادشهر یزد مراجعه کرده بودند، از نظر شاخص‌های رشد بررسی شدند. کودکان با وزن موقع تولد طبیعی به عنوان گروه شاهد و کودکان با وزن کم موقع تولد (کمتر از ۲۵۰۰ گرم) به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. نتایج: میانگین تمامی شاخص‌های رشد در گروه NBW در سنین مختلف با اختلاف معنی‌داری بیشتر از گروه LBW بود. فراوانی کم وزنی شدید و کوتاه قدی در کودکان پنج ساله با سابقه کم وزنی موقع تولد، بیشتر بود. فراوانی لاغری در کودکان گروه LBW بیش از گروه NBW و فراوانی چاقی در گروه NBW بیشتر بود و فراوانی لاغری در دختران با سابقه کم وزن هنگام تولد بیش از پسران بود. نتیجه‌گیری: باتوجه به اینکه رشد کودکان LBW در ۵ سال اول بعد از تولد آهسته‌تر از کودکان NBW می‌باشد لازم است بر اهمیت پایش رشد کودکان LBW تأکید بیشتری شده و تا اقدامات تشخیصی و درمانی بموقع و زود هنگام امکان‌پذیر شود.

واژه‌های کلیدی: نوزاد کم وزن، اختلال رشد، کوتاه قدی، شاخص‌های رشد، کودکان

* (نویسنده مسئول)؛ تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۲۴۰۰۰، پست الکترونیک: fallah@ssu.ac.ir

- این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می‌باشد.

مقدمه

کم وزنی نوزاد در موقع تولد (LBW یا وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم) یکی از جدی‌ترین مشکلات بهداشتی کودکان جهان امروز است. بر طبق بررسی‌های انجام شده توسط WHO هر سال قریب به بیست میلیون نفر نوزاد کم وزن متولد می‌شوند (از هر ۶ نوزاد یک نفر) که بیشتر این کم وزنها در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است (۱). مرگ در شیر خواری در کودکان کم وزن بیش از چهل برابر نوزادان با وزن تولد طبیعی (NBW یا وزن تولد ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم) است (۲).

کودکانی که با وزن کم به دنیا می‌آیند در سال‌های پس از تولد ممکن است دچار اختلال رشد و تکامل شوند اگرچه انتظار می‌رود که جهش رشد (Catch up growth) موجب شود شیرخواران به وزن تقریباً طبیعی برسند. در صورتیکه کودک جهش رشد پیدا نکند به خصوص اگر دور سر به اندازه طبیعی نرسد احتمال بروز اختلال شناختی و افت تحصیلی بیشتر می‌شود (۳).

از طرفی کودکان LBW حتی از نظر مرگ و میر تا قبل از سن ۱۵ سالگی در معرض خطر بیشتری قرار دارند و آنها که زنده می‌مانند دو تا سه برابر بیشتر از کودکان دیگر از ناتوانی‌های کوتاه و طولانی مدت رنج می‌برند (۴). متخصصین نوزادان سعی می‌کنند با اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب از بسیاری شرایط تهدید کننده حیات نوزادان نارس پیشگیری و یا آنها را درمان کنند. اقداماتی که برای این نوزادان صورت گرفته و عوارضی که ممکن است در طی بستری در بخش نوزادان رخ داده باشند مثل آپنه، هیپوکسی، هیپوترمی، هیپوگلیسمی ممکن است اثرات مخربی بر بدن نوزاد به خصوص بر سیستم عصبی وی داشته که نتایج آن ممکن است فوری ظاهر نشده بلکه طی سال‌ها بعد به صورت تأخیر در رشد و تکامل کودک ظاهر شود. شیوع کم وزنی در استان یزد در یک مطالعه ۷/۹۷ درصد (۵) و در مطالعه‌ای دیگر ۸/۴ درصد (۶) گزارش شده است، اما اینکه چه میزان از کودکانی که با وزن کم به دنیا آمده‌اند در آینده اختلال رشد خواهند داشت به عوامل متعددی از جمله کیفیت مراقبت در بیمارستان بخصوص در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، نحوه تغذیه بویژه تغذیه با

شیرمادر، وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد که در هر جامعه‌ای قطعاً شرایط فوق با جوامع دیگر متفاوت است و نیاز به تحقیق در این مورد دارد. لذا این تحقیق، به منظور بررسی و مقایسه وضعیت پارامترهای رشدی (وزن، قد، دور سر، شاخص توده بدنی یا BMI) کودکان پنج ساله با سابقه کم وزنی موقع تولد (LBW) با کودکان دارای وزن تولد طبیعی (NBW) صورت گرفت.

روش بررسی

در یک مطالعه مقطعی تحلیلی، که حجم نمونه براساس فرمول Z و با حدود اطمینان ۹۵٪ و توان آزمون ۸۰٪، حدود ۱۵۰ نفر در هر گروه برآورد شد، کودکان پنج ساله‌ای که از دی ۸۷ لغایت اردیبهشت ۸۸ جهت واکسیناسیون به مرکز بهداشتی درمانی آزادشهر یزد مراجعه کرده بودند به روش نمونه‌گیری سرشماری وارد مطالعه شده و از نظر شاخص‌های رشد (وزن، قد، دور سر، BMI) بررسی شدند.

شرایط ورود به مطالعه در گروه با وزن کم شامل دارا بودن وزن هنگام تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم و در گروه با وزن تولد طبیعی دارا بودن وزن زمان تولد بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم بوده است.

نوزادان وزن کم به نسبت سن حاملگی (SGA)، موارد آسفیکی شدید و احیا بدو تولد، چند قلبی، آنومالی‌های مادرزادی ماژور، اختلالات کروموزوم و سندرم‌های ژنتیکی تهدید کننده حیات از مطالعه خارج شدند. همچنین در صورت عدم همکاری والدین، پیدا نشدن پرونده‌های خانوار و یا تکمیل نبودن ثبت مراقبت‌های کودکان در سنین مختلف، مورد از مطالعه حذف گردید.

لازم به ذکر است که واحد اندازه‌گیری وزن به کیلوگرم، قد و دور سر به سانتیمتر بود و شاخص توده بدنی یا BMI از تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر قد وی به مجذور قد وی به متر (kg/m²) بدست می‌آید.

علت انتخاب سن ۵ سالگی برای ارزیابی این بود که در این سن کودکان بر اساس برنامه واکسیناسیون کشوری، معمولاً جهت واکسیناسیون آورده شده و از طرفی بر اساس کتب مرجع

اطفال، انتظار می‌رود شاخص‌های رشد ترمیم یافته باشد. در ابتدا وزن موقع تولد کودکان مراجعه کننده بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده‌های بهداشتی آنها مورد بررسی قرار گرفت و کودکان با وزن موقع تولد طبیعی (۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم) به عنوان گروه شاهد و کودکان با وزن کم موقع تولد (کمتر از ۲۵۰۰ گرم) به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. شاخص‌های رشد به طور جداگانه برای هر کودک و بر اساس آخرین جداول شاخص‌های رشد که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) ارائه شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه شامل دو بخش بود که در بخش اول سئوالات مربوط به اطلاعات دموگرافیک خانوار و در بخش دوم سئوالات مربوط به اطلاعات کودک منتج شده از پرونده خانوار آمده است. بعد از وارد کردن اطلاعات و تکمیل پرسشنامه، تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS:15 صورت گرفت. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی از تست مجذور کای و

آزمون دقیق فیشر (در مواردی که فراوانی دو متغیر کمتر از ۵ بود) و جهت بررسی مقایسه میانگین‌ها از T-test استفاده شد. $Pvalue < 0/05$ به عنوان اختلاف معنی‌دار در نظر گرفته شد. شرکت در مطالعه با آگاهی و آزادانه از طرف والدین کودکان انجام گرفت. والدین ده کودک در اواسط کار از ادامه همکاری منصرف شدند.

انجام این طرح، خطراتی در بر نداشت و هزینه اضافی به بیمار و والدین وی اعمال نمی‌گردید. سؤالات والدین در مورد کودکان به دقت پاسخ داده می‌شد تا بتوان نگرانی و اضطراب آنها را، کاهش داد. لذا برای انجام این تحقیق، از نظر اخلاقی مشکلی وجود نداشت و کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، انجام این تحقیق را تایید کرده بود.

نتایج

در این مطالعه، ۳۰۰ کودک (۱۵۰ نفر در هر یک از گروه LBW و NBW) از نظر شاخص‌های رشدی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

جدول ۱: مقایسه میانگین وزن، قد و دورسر کودکان با و بدون سابقه کم وزنی در سنین قبل از ۵ سالگی

شاخص	سن به ماه	میانگین در گروه LBW	انحراف معیار	میانگین در گروه NBW	انحراف معیار	Pvalue
وزن	۱	۳/۳۸	۰/۷۲	۴/۴۷	۰/۶۱	۰/۰۰۰۱
	۲	۴/۲۳	۰/۹۴	۵/۳۳	۰/۶	۰/۰۰۰۱
	۶	۶/۵۵	۰/۷۶	۷/۵۸	۰/۸۹	۰/۰۰۰۱
	۱۲	۸/۴۲	۰/۹	۹/۲۹	۱/۰۱	۰/۰۰۰۱
	۱۸	۹/۶۸	۰/۹۶	۱۰/۶۹	۱/۲۳	۰/۰۰۰۱
	۲۴	۱۰/۷۱	۰/۹۶	۱۱/۶۲	۱/۴۴	۰/۰۰۰۱
	۳۶	۱۲/۵۱	۱/۴۹	۱۳/۳۹	۱/۷۰	۰/۰۰۰۱
	۴۸	۱۴/۵۶	۱/۶۹	۱۵/۵۷	۲/۲۷	۰/۰۰۰۴
قد	۱	۵۱/۰۵	۳/۶۹	۵۵/۴۹	۳/۳۶	۰/۰۰۰۱
	۲	۵۴/۱۶	۳/۵۷	۵۸/۵۷	۳/۵۳	۰/۰۰۰۱
	۶	۶۳/۳۳	۶/۰۷	۶۷/۱۲	۳/۱۷	۰/۰۰۰۱
	۱۲	۷۲/۶۴	۳/۱۹	۷۵/۴۲	۲/۸۳	۰/۰۰۰۱
	۱۸	۷۸/۴۰	۷/۱۲	۸۰/۹۱	۳/۰۹	۰/۰۰۰۱
	۲۴	۸۴/۴۴	۴	۸۶/۱۱	۳/۸۴	۰/۰۰۰۲
	۳۶	۹۳/۱۷	۴/۸۹	۹۴/۴۶	۴/۴۹	۰/۰۶۴
	۴۸	۱۰۲/۴۲	۵/۹۹	۱۰۳/۶	۴/۶	۰/۱۲۷
دور سر	۱	۳۵/۸	۱/۹۶	۳۷/۴	۱/۵۸	۰/۰۰۰۱
	۲	۳۷/۳	۲/۰۷	۳۹	۱/۷۸	۰/۰۰۰۱
	۶	۴۱/۹	۱/۳۷	۴۳/۳	۲/۲۴	۰/۰۰۰۱
	۱۲	۴۵/۴	۱/۳۶	۴۶/۲	۱/۵۷	۰/۰۰۰۱
	۱۸	۴۶/۹	۱/۲۷	۴۷/۸	۱/۶۷	۰/۰۰۰۱
	۲۴	۴۷/۹	۱/۱۸	۴۸/۶	۱/۴۴	۰/۰۱۰

NBW در سنین مختلف با اختلاف معنی‌داری بیشتر از گروه LBW بوده است و با افزایش سن این اختلاف در مورد قد و دور سر کمتر می‌شود اما در مورد وزن تغییری نمی‌کند.

جدول یک، به مقایسه میانگین قد، وزن و دور سر در سنین کمتر از پنج سالگی و جدول شماره دو به مقایسه این شاخص‌ها در سن پنج سالگی در کودکان با و بدون سابقه کم وزنی موقع تولد می‌پردازد و بیانگر آن است که میانگین تمامی شاخص‌ها در گروه

جدول ۲: مقایسه میانگین شاخص‌های رشد کودکان با و بدون سابقه کم وزنی موقع تولد در پنج سالگی

شاخص رشد	NBW		LBW	
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین
وزن	۲/۹۴۶	۱۸/۳	۲/۴۷۳	۱۶/۳۶
قد	۵/۵۸۵	۱۱۱/۸	۵/۳۴۷	۱۰۹/۰۵
BMI	۱/۵۶۴	۱۴/۵۸۰	۱/۳۷۸	۱۳/۷۰۷
دور سر	۲/۸۱۵	۵۰/۶	۱/۳۲۲	۵۰

گروه کودکان مورد مطالعه بر حسب جنس را نشان می‌دهد. فراوانی لاغری ($BMI \leq 2SD$) در کودکان گروه LBW بیش از گروه NBW و فراوانی چاقی در گروه NBW بیشتر بود ($P=0/008$) و فراوانی لاغری در دختران با سابقه کم وزنی هنگام تولد بیش از پسران با وزن تولد طبیعی حین تولد بود ($P=0/007$).

جدول سه و چهار، شدت کم وزنی و شدت کوتاه قدی را در دو گروه کودکان مورد مطالعه بر حسب جنس نشان می‌دهد. اگرچه فراوانی کم وزنی شدید ($P=0/03$) و کوتاه قدی ($P=0/05$) در کودکان پنج ساله با سابقه کم وزنی موقع تولد، بیشتر بود اما توزیع فراوانی کم وزنی شدید (وزن کمتر از $-2SD$) و کوتاه قدی (قد کمتر از $-2SD$) بین دو جنس، تفاوت معنی‌داری نداشت. جدول شماره ۵، مقایسه BMI در دو

جدول ۳: مقایسه شدت کم وزنی در دو گروه کودکان مورد مطالعه بر حسب جنس

جنس	NBW				LBW				
	Pvalue	$\geq 2SD$	نرمال	$\leq 2SD$	تعداد کل	$\geq 2SD$	نرمال	$\leq 2SD$	تعداد کل
پسر	۰/۲	۲	۶۵	۸	۷۵	۰	۴۲	۱۱	۵۳
		۲/۶۷	۸۶/۶۶	۱۰/۶۷	۱۰۰	۰	۷۹/۲۵	۲۰/۷۵	۱۰۰
دختر	۰/۰۶۹	۱	۷۲	۲	۷۵	۱	۸۴	۱۲	۹۷
		۱/۳۳	۹۶	۲/۶۷	۱۰۰	۱/۰۳	۸۶/۶	۱۲/۳۷	۱۰۰
جمع	۰/۰۳۷	۳	۱۳۷	۱۰	۱۵۰	۱	۱۲۶	۲۳	۱۵۰
		۲	۹۱/۳۳	۶/۶۷	۱۰۰	۰/۷۶	۸۴	۱۵/۳۳	۱۰۰

جدول ۴: مقایسه شدت کوتاه قدی در کودکان با و بدون سابقه کم وزنی موقع تولد بر حسب جنس

Pvalue	NBW		LBW		تعداد	جنس
	نرمال	≤2SD	نرمال	≤2SD		
۰/۰۷۳	۷۴	۱	۴۹	۴	تعداد	پسر
	۹۸/۶۶	۱/۳۴	۹۲/۴۵	۷/۵۵	درصد	
۰/۲۱	۷۵	۰	۹۵	۲	تعداد	دختر
	۱۰۰	۰	۹۷/۹۴	۲/۰۶	درصد	
۰/۰۵	۱۴۹	۱	۱۴۴	۶	تعداد	جمع
	۹۹/۳۳	۰/۶۷	۹۶	۴	درصد	

جدول ۵: مقایسه BMI در دو گروه کودکان مورد مطالعه بر حسب جنس

Pvalue	NBW			LBW			تعداد	جنس
	≥2SD	نرمال	≤2SD	≥2SD	نرمال	≤2SD		
۰/۱	۶	۵۹	۱۰	۰	۴۲	۱۱	تعداد	پسر
	۲/۶۷	۸۶/۶۶	۱۰/۶۷	۰	۷۹/۲۵	۲۰/۷۵	درصد	
۰/۰۰۷	۱	۶۹	۵	۴	۶۷	۲۶	تعداد	دختر
	۱/۲۳	۹۶	۲/۶۷	۱/۰۳	۸۶/۶	۱۲/۳۷	درصد	
۰/۰۰۸	۷	۱۲۸	۱۵	۴	۱۰۹	۳۷	تعداد	جمع
	۴/۶۷	۸۵/۳۳	۱۰	۲/۷۶	۷۲/۶۶	۲۴/۶۷	درصد	

بحث

دور سر) در کودکان ۵ ساله با سابقه کم وزنی زمان تولد کمتر از کودکان با وزن طبیعی موقع تولد بود که نتایج با بسیاری از مطالعات مشابه انجام شده تطابق داشته و در بعضی از مطالعات این اختلاف تا سن ده و ۱۴ سالگی نیز وجود داشته است (۱۰ تا ۱۵). نتایج دو مطالعه دیگر نشان داده‌اند که اگر چه قبل از سن ۸ تا ۱۰ سالگی متوسط شاخص‌های رشد کودکان LBW زیر صدک پنجاهم منحنی رشد قرار دارد اما در سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی (سنین نوجوانی) متوسط قد، وزن و اندازه دور سر آنها در حدود صدک پنجاهم قرار می‌گیرد (۷، ۱۶). تنها در درصدی از کودکانی که کم وزن بدنیا آمده‌اند جهش رشد رخ می‌دهد (۱۷). مطالعه Arifeen و همکاران نشان داد که ۶۳٪ شیرخوارانی که وزن کمتر از وزن متناسب با سن

توجه به وضعیت رشد کودکان بخصوص آنهایی که با وزن کم موقع تولد بدنیا آمده‌اند بسیار مهم است زیرا اختلال رشد می‌تواند با عوارض متعددی از جمله افزایش تعداد مراجعات برای معالجات درمانی، طولانی‌تر بودن طول دوران تحصیل، اختلال رشد در کودکی و کاهش حجم و ظرفیت ریه همراه باشد (۹-۷) در عین حال به نظر می‌رسد تغذیه نامناسب بعد از تولد و عقب افتادگی رشد یک نتیجه شایع و غیرقابل اجتناب در کودکان کم وزن است. این کودکان معمولاً در هفته‌های اول زندگی در بیمارستان بستری هستند و در این مدت از تغذیه کافی برخوردار نیستند و این عدم تغذیه مناسب با عقب افتادگی رشد کودک در سال‌های بعد مرتبط است. در این مطالعه، میانگین تمامی شاخص‌های رشد (وزن، قد،

در موقع تولد و یکسالگی کاسته شده که با نتایج بدست آمده از مطالعه ما تطابق دارد. در مطالعه آنها، کودکان LBW کوتاهی قد خود را نسبت به کودکان NBW جبران کرده بودند که با نتایج مطالعه ما تطابق نداشت، اگر چه در مطالعه ما اختلاف قد کودکان دو گروه کمتر شده بود اما تا سن ۵ سالگی این اختلاف بصورت معنی‌داری وجود داشت. علت این اختلاف شاید تفاوت در روش مطالعه (مطالعه ما گذشته نگر و مطالعه آنها آینده‌نگر بوده است)، منطقه جغرافیایی، عادات غذایی و ... باشد.

در بررسی حاضر، در گروه LBW دختران، BMI کمتری از پسران داشته‌اند در حالی که در گروه NBW اختلاف معنی‌دار بین دو جنس دیده نشد که مطالعه مشابهی که نتایج فوق را تأیید یا رد کند بدست نیامد اما شاید تغذیه نامناسب غذایی در دختران و توجه کمتر داشتن به تغذیه آنها به خصوص در کودکان با وزن کم حین تولد در جامعه، در این مسئله دخیل باشد.

نتیجه‌گیری

وزن کم موقع تولد بعنوان یکی از فاکتورهای خطر برای بروز اختلال رشد در آینده است و بنابراین لازم است بر اهمیت آموزش والدین، ثبت دقیق شاخص‌های رشد نوزادان LBW در پرونده‌های بهداشتی درمانی آنها توسط پرسنل مراکز بهداشتی، مراجعه منظم و مکرر والدین آنها به خصوص مادران و پیگیری روند رشد این کودکان تأکید شود تا بتوان با شناسایی زود رس اختلال رشد در این کودکان اقدامات تشخیصی و درمانی و آموزش‌های لازم به موقع انجام گیرد.

حاملگی (SGA) داشتند بودند تا سن یک سالگی شاخص‌های رشد طبیعی پیدا کردند (۱۵) اما در مطالعه مورد شاهدهی که توسط والونین و همکاران بروی ۱۰۹ کودک SGA و ۲۳۹ کودک با وزن متناسب با سن حاملگی انجام گرفت مشخص شد که کودکان SGA در مقایسه با کودک با وزن متناسب با سن حاملگی در تمام سنین قد کوتاه‌تر و وزن کمتری داشتند. آنها نتیجه گرفتند بیشترین جهش رشد و افزایش BMI در کودکان SGA در مدت یکسال بعد از تولد بوده است (۱۰).

Chatelaine معتقد است SGA و کم وزنی موقع تولد یک مشکل بهداشتی عمومی است و ۸-۱۰ درصد این نوزادان به رشد جبرانی دست نمی‌یابند و کوتاه قدی شدید و پایدار و مشکلات تکاملی مشخص دارند (۱۸).

احسان پور و همکاران با مطالعه مورد شاهدهی بر روی ۲۱۸ کودک که به دو گروه LBW و NBW تقسیم شده بودند، دریافتند که اگرچه گروه LBW تفاوت چشم‌گیری در وزن و قد و دور سر نسبت به کودکان با وزن تولد طبیعی در سن دو سالگی دارند اما میانگین وزن کودکان LBW دو ساله پنج برابر و کودکان NBW ۳/۵ برابر میانگین وزن هنگام تولد آنها شده است (۱).

عوامل متعددی از جمله وزن موقع تولد، تغذیه نامناسب، میزان رشد در سن صفر تا سه ماهگی و جنسیت در میزان رشد کودکانی که با وزن کم بدنیا آمده‌اند، موثر است (۱۹،۲۰).

مطالعه افتخار و همکارانش (۲۱) نشان داد که میانگین وزن کودکان LBW در پنج سالگی ۱۵/۷ کیلوگرم و در کودکان با وزنت تولد نرمال ۱۶/۷ کیلوگرم بود اما از اختلاف وزن دو گروه

منابع:

- 1- Ehsanpour S, Abdyazdan Z, Javanmardi Z. *Comparative study on growth indicators of children born with low birth weight and normal birth weight in two years after birth*. Shahrekord Univ Med Sci J 2001; 3(1): 69-74. [Persian]
- 2- Levene MI, Vries LD. *Epidemiology and perinatal services*. Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. Fanaroff and Martin neonatal- perinatal medicine: disease of the fetus and infant. 8th ed. Philadelphia:

Elsevier; 2006.p.19.

- 3- Cooke RW, Foulder-Hughes L. *Growth impairment in the very preterm and cognitive and motor performance at 7 years*. Arch Dis Child 2003; 88(6): 482-7.
- 4- Xu B, Rantakallio P, Järvelin MR. *Mortality and hospitalizations of 24 years old members of the low birth weight cohort in northern Finland*. Epidemiology 1998; 9(6): 662-5.
- 5- Islami Z, Aflatonian A. *Study to determine the prevalence of low birth weight(lbw) infants in Yazd*. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2002; 1(2): 3-8. [Persian]
- 6- Golestan M, Fallah R, Akhavan Karbasi S. *Neonatal mortality of low birth weight infants in Yazd, Iran*. Iranian Journal of Reproductive Medicine 2008; 6(4): 205-8.
- 7- Reuner G, Hassenpflug A, Pietz J, Philippi H. *Long-term development of low-risk low birth weight preterm born infants: Neurodevelopmental aspects from childhood to late adolescence*. Early Hum Dev 2009; 85(7): 409-13.
- 8- Hancox RJ, Poulton R, Greene JM, McLachlan CR, Pearce MS, Sears MR. *Associations between birth weight, early childhood weight gain and adult lung function*. Thorax 2009; 64(3): 228-32.
- 9- Ferrari A. *Risk factors for protein- energy malnutrition in pre- school shantytown children in Brazil*. Rev Paul Med 1998; 116(2): 1654-60 .
- 10- Valūniene M, Danylaite A, Kryžiūte D, Ramanauskaite G, Lasiene D, Lasas L, et al. *Postnatal growth in children born small and appropriate for gestational age during the first years of life*. Medicina(Kaunas) 2009; 45(1): 51-60.
- 11- Li HR, Feng LY, Zheng MS. *A longitudinal study of growth and development of low birth weight infants*. Zhonghua Hu Li Za Zhi 1996; 31(2): 63-7.
- 12- Ford GW. *Very low birth weight and growth into adolescence*. Pediatrics & Adolescent Medicine 2000; 154: 778.
- 13- Finnström O, Otterblad Olausson P, Sedin G, Serenius F, Svenningsen N, Thiringer K, et al. *Neurosensory outcome and growth at three years in extremely low birthweight infants: follow-up results from the Swedish national prospective study*. Acta- Pediatr 1998; 87(10): 1055-60.
- 14- Atkinson SA, Randall-Simpson J. *Factors influencing body composition of premature infants at term-adjusted age*. Ann N Y Acad Sci 2000; 904: 393-9.
- 15- Arifeen SE, Black RE, Caulfield LE, Antelman G, Baqui AH, Nahar Q, et al. *Infant growth patterns in the slums of Dhaka in relation to birth weight, intrauterine growth retardation, and prematurity*. Am J Clin Nutr 2000; 72(4): 1010-7.
- 16- Hirata T, Bosque E. *When they grow up the growth of extremely low birth weight infants at adolescence*. J Pdiatr 1998; 132: 1033-5.

- 17- Knops NB, Sneeuw KC, Brand R, Hille ET, den Ouden AL, Wit JM, et al. *Catch-up growth up to ten years of age in children born very preterm or with very low birth weight*. BMC Pediatr 2005; 5: 26.
- 18- Chatelaine P. *Children born with intra uterine growth retardation or small for gestational age: long term growth and metabolic consequences*. Endocr Regul 2000; 34(1): 33-6.
- 19- Nicolas E, Naomi P, Richard J. *Postnatal malnutrition and growth retardation: an inevitable consequence of current recommendations in preterm infants?* Pediatrics 2001; 107: 270-3.
- 20- Hui LL, Schooling CM, Leung SS, Mak KH, Ho LM, Lam TH, et al. *Birth weight, infant growth, and childhood body mass index: Hong Kong's children of 1997 birth cohort*. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162(3): 212-8.
- 21- Eftekhari H. *Comparison of growth and development of low and normal birth weight children at the age of five*. Tehran Univ Med J 1998; 3(6): 73-8. [Persian]

Comparison of Growth Parameters in Five Year-Old Children with and Without History of Low Birth Weight

Karimi M(MD)¹, Fallah R(MD)^{*2}, Fallahzadeh MH(PHD)³, Dehghanpoor A(MD)⁴, Mirzaee M(PhD)⁵

^{1,2} Department of Pediatrics, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

³ Department of Epidemiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

⁴ General Physician, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

⁵ Health Center of Yazd Province, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Received: 4 Mar 2011

Accepted: 27 Oct 2011

Abstract

Introduction: Nowadays Low birth weight (LBW or birth weight < 2500g) is one of the most serious problems among children around the world. The purpose of this study was to evaluate and compare the growth parameters (weight, height, head circumference and BMI) of LBW children at the age of five years with normal birth weight (NBW: birth weight: 2500- 4000 g) children.

Methods: In a cross-sectional analytic study, growth parameters of five year-old children referred to Azadshahr health care center in Yazd, Iran, from December 2008 to June 2009 were evaluated. NBW and LBW children were selected as control and case groups, respectively.

Results: Means of all growth parameters were significantly lower in LBW group. Frequency of severe failure to thrive and short stature was significantly higher in LBW group. Frequency of underweight was higher in LBW group and frequency of obesity was higher in NBW one. Frequency of underweight was higher in LBW girls.

Conclusion: Considering that growth in LBW children is slower than NBW children in the first five years of life, it is necessary to emphasize the importance of growth assessment of LBW children for early and timely diagnosis, work-up and management of growth retardation and prevention of subsequent problems.

Keywords: Low Birth Weight, Growth Retardation, Short Stature, Growth Parameters, Children

This paper should be cited as:

Karimi M, Fallah R, Fallahzadeh MH, Dehghanpoor A, Mirzaee M. *Comparison of growth parameters in five year-old children with and without history of low birth weight*. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci; 19(6): 766-74.

***Corresponding author: Tel: +98 351 8224000, Fax: +98 351 8224100, Email: fallah@ssu.ac.ir**