



بررسی تاثیر تمرين مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول‌های PBMN

زنان ورزشکار

امیر رشیدلمیر*

- استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۱۱/۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۴/۲۹

چکیده

مقدمه: بیماری‌های قلبی آترواسکلروزیس ناشات گرفته از آترواسکلروزیس، مهم‌ترین عامل مرگ و میر در بیشتر کشورهای است. انتقال‌دهنده ABCG1 مسئول ساخت و فرمدهی ذرات HDL بوده و به همین دلیل احتمالاً در جلوگیری از گسترش آترواسکلروزیس آترواسکلروزیس نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع تمرين تک جلسه‌ای (مقاومتی و استقامتی) بر بیان ژن ABCG1 سلول‌های PBMN بود.

روش بررسی: ۲۴ نفر از بین بانوان ورزشکار خراسانی. انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه هشت نفری کنترل، هوازی (AE) و مقاومتی (RE) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسه‌های تمرينی از آزمودنی‌های سه گروه خون‌گیری به عمل آمد. جداسازی لنفوسيت‌ها به روش سانتریفیوژ و تخلیص m-RNA به وسیله PCR نیمه کمی انجام شد. اطلاعات بوسیله آزمون آماری تی همبسته، آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعییبی توکی تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد که گروه‌های RE و AE در نتیجه تمرين افزایش معنی‌داری در بیان m-RNA ژن ABCG1 لنفوسيت تجربه کردند که این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود (به ترتیب $P \leq 0.001$ در مقابل $P \leq 0.14$).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تمرين‌های مقاومتی و هوازی می‌توانند با افزایش در بیان ژن ABCG1 در سلول‌های تک هسته‌ای خون زنان ورزشکار منجر به بهبود عملکرد انتقال معکوس کلسترول و در نتیجه فواید قلبی عروقی برای ورزشکاران گردد.

واژه‌های کلیدی: تمرين مقاومتی، تمرين هوازی، ژن ABCG1، PBMN

*نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۵۱۵۱۴۱۷۴، پست الکترونیکی: amir.rashidlamir@gmail.com

مقدمه

کلسترونول و فسفولیپید از سلول‌های فوم ماکروفاژ هستند. با این تفاوت که ABCA1 این مواد را به لیپوپروتئین‌های عاری از چربی انتقال داده و باعث تشکیل HDL اولیه می‌شود و ABCG1 مسئول انتقال کلسترونول به HDL بالغ است^(۱-۳). ABCA1 برای انتقال چربی‌ها از میان غشای پلاسمما و همچنین نگه داری مقادیر HDL-C در سطح مطلوب ضروری است. نقش ABCA1 به عنوان صادر کننده چربی سلول، زمانی معلوم گشت که این ژن، ژن معیوب در بیماران تانزیه ABCA1 (Tangier) بیماران تانزیه دارای HDL بسیار کم بوده، قادر به خارج کردن کلسترونول از سلول به Apo I-A نمی‌باشند و تجمع کلسترونول استر در بسیاری از بافت‌ها به ویژه سرخرگ‌ها دیده می‌شود. آترواسکلروزیس زود هنگام نیز از دیگر عوارض این بیماری است. از سویی بیان بیش از حد ژن ABCA1 در موش‌های تراریخته (Genetically Modified Organism)، منجر به کاهش معنی دار در اندازه و پیچیدگی آسیب‌های آترو اسکلروزی، افزایش خروج کلسترونول از سلول و در نهایت افزایش میزان و ترکیب HDL پلاسمما می‌شود^(۴). سلول‌های فوم ماکروفاژ علاوه بر عروق قلب در بسیاری از بافت‌های بدن نظیر کبد، ریه و طحال دچار تجمع پیدا می‌کنند و نقش یا کمبود انتقال دهنده‌های ABCA1 و ABCG1 باعث التهاب مزمن و گاهی آپوپتوزیز در این بافت‌ها می‌شود^(۵).

بیان ژن ناشی از تمرين در بافت‌ها به ویژه در لکوسیت یکی از مکانیسم‌های تنظیم هموستانز بدن است^(۶). سلول‌های سفید خون در نتیجه فعالیت بدنی افزایش می‌یابند. تمرينات کوتاه مدت باعث لنفوسيتوz و گرانولوسیتوz می‌شود^(۷). کونلی و همکاران نشان دادند که یک جلسه فعالیت بدنی نسبتاً شدید بیان صدها ژن از جمله ژن‌های التهابی و پیش التهابی و همچنین ژن‌هایی که در عملکردهای فیزیولوژیک نقش کلیدی دارند، تغییر می‌دهد^(۸). همچنین Buttner و همکارانش تاثیر دویدن بر روی ترمیم را با دو شدت ۸۰ درصد VO_{2max} و ۶۰ درصد VO_{2max} بر بیان ژن‌های سلول‌های سفید خون را

آترواسکلروزیس یک وضعیت التهابی مزمن است و زمانی رخ می‌دهد که به دلیل عدم توانایی سلول برای خارج کردن کلسترونول اضافی، کلسترونول استر در سلول‌های فوم ماکروفاژ تجمع یابد.^(۹) (۱) سلول‌های فوم ماکروفاژ سلول‌های متورمی در دیواره عروق هستند که عمدتاً از ماکروفاژهای غنی از LDL تشکیل شده‌اند و عامل فیزیکی انسداد عروق هستند^(۱۰).

رابطه معکوس بین مقادیر HDL پلاسمما و خطر آترواسکلروزیس آترواسکلروزیس نشان‌دهنده نقش HDL و گیرنده‌های آن (Apo A-II و Apo A-I) در پذیرش و انتقال کلسترونول است^(۱۱). برداشت کلسترونول‌های اضافی از سلول‌های فوم ماکروفاژ بوسیله HDL و آپولیپوپروتئین‌های اساسی اش Apo A-I یکی از کلیدی‌ترین مکانیسم‌های محافظتی HDL در مقابل آترواسکلروزیس است^(۱۲).

مطالعات مربوط به نقش HDL انسانی و مدل‌های حیوانی نشان داده است که)ABCA1 ATP Binding Cassette (ABC1 و)ABCG1 ATP Binding Cassette (Transporter A 1 و)Transporter G1 (Transporter G1) معرف اصلی سطوح HDL پلاسمایی بوده و به عنوان مهمترین عوامل محافظتی در برابر بیماری تصلب شریانی هستند^(۱۳-۱۵). ژن ABCA1 اولین و بارزترین عضو خانواده انتقال دهنده ABC می‌باشد و در کبد و ماکروفاژهای بافتی به میزان زیادی تظاهر می‌یابد^(۱۶). ژن ABCG1 نیز جز همین خانواده بوده و اخیراً به عنوان یکی از تنظیم کننده‌های مهم جریان کلسترونول در فرایند انتقال معکوس کلسترونول (Reverse Cholesterol Transport(RCT)) شناخته شده است. انتقال معکوس کلسترونول یک فرایند ضد تصلب شرایینی است و به جمع‌آوری کلسترونول اضافی از بافت‌های پیرامونی، از جمله ماکروفاژهای دیواره سرخرگی و بازگرداندن آنها به کبد، همراه با شکل‌گیری HDL گفته می‌شود. یکی از اجزای مهم RCT تنظیم ژن‌های خانواده انتقال دهنده‌های ABC توسط LXR است این انتقال دهنده‌ها که مهمترین آنها ABCA1 و ABCG1 هستند^(۱۷-۱۹).

ABC1 و ABCG1 تنظیم کننده کلیدی خارج کردن

بانوان ورزشکار خراسانی، ۲۴ زن ورزشکار انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه هشت نفری کنترل، هوازی و مقاومتی دایرہ ای تقسیم شدند(پس از تقسیم آزمودنی‌ها بصورت تصادفی با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنف و لون، نرمال بودن و همگن بودن واریانس گروه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از مشخص شدن نرمال بودن و همگنی آزمودنی‌ها از نظر سن، قد، وزن و BMI ادامه مراحل آشنایی آزمودنی‌ها با مراحل تمرین و اجرای پروتکل انجام گردید همچنین در مورد تعداد آزمودنی‌ها: با توجه به سختی آزمون مورد استفاده در تحقیق و لزوم انتخاب آزمودنی‌های ورزشکاری که توانایی اجرای آن را داشته باشند، همچنان: داشته باز استفاده از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه $n = \frac{Z^2 pq}{d^2}$ با اطمینان ۹۵٪، عدد $n=20$ بدست آمد و با توجه به احتمال کم شدن آزمودنی‌ها طی تمرین تعداد ۲۴ نفر در نظر گرفته شد).

از آزمودنی‌های شرکت کننده پس از معاینات پزشکی و اطمینان از سلامتی و عدم بیماری آنها و همچنین عدم مصرف هرگونه دارو، رضایت‌نامه کتبی دریافت شد. تمامی آزمودنی‌ها بطور کامل با پروتکل تمرینی آشنا شدند. هیچ یک از آزمودنی‌ها در زمان انجام پروتکل در دوره سیکل ماهیانه و سه روز پیش و سه روز پس از این دوره قرار نداشتند. رژیم غذایی و مصرفی آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامه سه روزه رژیم غذایی و با استفاده از جدول‌های مربوطه ارزیابی گردید و سپس رژیم غذایی روز قبل از نمونه‌گیری به آزمودنی‌ها پیشنهاد گردید و همچنین جهت یکسان‌سازی رژیم غذایی شب قبل از نمونه‌گیری، رژیم پیشنهادی محققین به صورت آماده شده در اختیار آنها قرار گرفت. وزن آزمودنی‌ها با استفاده از ترازوی دیجیتال و با دقیقه ۰/۰ کیلوگرم اندازه‌گیری شد. درصد چربی آزمودنی‌ها با استفاده از کالیپر و با بهره‌گیری از روش سه نقطه‌ای(تحت کتفی، شکمی، سه سر بازویی) اندازه‌گیری شد.

پروتکل تمرینی

تمرینات گروه مقاومتی شامل حرکات جلو بازو، پشت بازو، باز کردن کمر، اسکوات ۹۰ درجه، چهارسر ران، لیفت مرده و قایقی بود. حداقل قدرت برای نه آیتم مورد استفاده در پروتکل

بررسی کردند. نتایج حاکی از تنظیم مثبت ۴۵۰ ژن و تنظیم منفی ۱۵۰ ژن بود(۱۴). تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که بیان ژن ABCA1 و ABCG1 تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله رژیم غذایی پر چربی(۱۵) و تمرینات بدنی قرار می‌گیرد(۱۶، ۱۷، ۱۲، ۱۶، ۳). تا کنون مقالات اندکی به بررسی تاثیر تمرین(تک جلسه ای- مقاومتی- تداومی) بر بیان ژن ABCA1 و ABCG1 در بافت‌های انسان پرداخته‌اند(۱۷، ۱۶، ۱۲، ۱۶، ۳). اولین تحقیق در این زمینه پژوهش Hoang ABCA1 مرکز نموده است(۱۶). فعالیت بدنی بصورت عمومی بر بیان ژن ABCA1 IPAQ و مقادیر بیان ژن ABCA1 در عضله اسکلتی و لکوسیت‌های خون اندازه‌گیری شد. در تحقیق دوم Butcher و همکارانش تاثیر هشت هفته تمرینات با شدت کم(هر جلسه ۱۰۰۰۰ گام راه رفتن) را بر بیان ژن ABCA1 و ABCG1 لنفوسيت بررسی کردند(۳). Ghanbari-Niaki تاثیر تمرین تک جلسه‌ای مقاومتی را با سه شدت مختلف بر بیان ژن ABCA1 لنفوسيت‌های خون بررسی کرد(۱۲). سرانجام در آخرین تحقیق منتشر شده در این زمینه، Rashidlamir و همکاران به بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات کشته و تمرینات دایره‌ای مبتنی بر فنون کشتی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسيت پرداختند(۱۷).

سودمندی‌های تمرین برای سلامتی، به خصوص تاثیرات مثبت آن بر عملکرد سیستم قلبی عروقی مدت زیادی است که مشخص شده است ولی در مورد تاثیر تمرینات تک جلسه‌ای بر انتقال دهنده ABCG1 که نقش کلیدی در انتقال معکوس کلسترول و پیشگیری از آترواسکلروزیس دارد، نتایج محدود و دارای تنافض است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو پروتکل تمرینی تک جلسه‌ای(مقاومتی و استقامتی) بر بیان ژن ABCG1 سلول‌های تک هسته‌ای خون زنان ورزشکار بوده است.

روش بررسی

طرح تحقیق و افراد

طرح تحقیق حاضر سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده و از نوع تحقیقات تجربی می‌باشد. طی یک فراخوان از بین

برای اندازه‌گیری ABCG1 و بتا اکتین مورد استفاده قرار گرفت از این قرار بود.

برای بتا اکتین forward :
TCCCTGGAGAAGAGCTACG (19 bp)
 بتا اکتین Reverse :
GTAGTTCGTGGATGCCACA (20 bp)

ABCG1 ; PCR product length: 131 bp Tm: 58
 برای ; AGCCCAAGTCGGTGTGTGTC Forward
TGTATCCTTCTCCTCCACCAG; Reverse ABCG1
 PCR product length: 217 bp Tm=58

در انتهای محصولات PCR الکتروفوروز شدن و روی ژل آگاراز قرار گرفتند تا عکس‌های لازم از آنها تهیه شود. در انتهای پس از بدست آمدن نتایج با استفاده از دستگاه (یووی تک) و بدست آوردن مقادیر بتا اکتین برای هر نمونه، عددی‌های بدست آمده را بر مقادیر بتا اکتین بدست آمده برای هریک، تقسیم نمودیم و حاصل را در ۱۰۰ ضرب نمودیم تا مقادیر mRNA ABCG1 برای هر نمونه بر اساس درصد بدست آید (۱۷).

مقادیر در جدول ۲ و نمودار ۱ آورده شده است. پرایمر تجزیه و تحلیل آماری:

نرمال بودن داده‌ها و همگن بودن واریانس بین گروه‌ها به ترتیب با استفاده از ازمون کلوموگروف اسمیرنوف و آزمون لون بررسی شد و پس از حصول اطمینان برای استفاده از آزمون‌های پارامتریک، برای بررسی تغییرات بیان ژن درون گروهی از آزمون تی همبسته و برای بررسی اختلاف میانگین سه گروه از آزمون آنالیزواریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد.

نتایج

با توجه به نتایج جدول ۱ آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، بین مقادیر داده‌های آنتروپومتریک آزمودنی‌های شرکت کننده در پژوهش اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. همچنین بر اساس داده‌های آزمون لون، داده‌های آنتروپومتریک آزمودنی‌ها همگن بودند. نتایج حاکی از آن بود که هر دو گروه تمرین مقاومتی (RE) و تمرین استقامتی (AE) در نتیجه تمرین افزایش

تمرین مقاومتی تعیین و ۶۰٪ آن محاسبه گردید از آزمودنی‌ها خواسته شد تا تمرینات را با ۶۰٪ ۱RM و هر تمرین را به مدت ۲۵ ثانیه، با سرعت بیشینه، انجام دهند. این تمرینات را در سه سمت انجام داده و بین هر سمت ۵ دقیقه استراحت داشتند. پیش از پروتکل، ۱۰ - ۵ دقیقه به گرم کردن و حدود ۱۰ دقیقه به سرد کردن پس از پروتکل، اختصاص یافت. از آزمودنی‌های گروه تمرین هوازی خواسته شد تا مسافت ۱.۵ مایل را با ضربان قلب ثابت (۰.۷۰ VO_{2max}) بدوند. کنترل ضربان قلب با استفاده از دستگاه ضربان سنج دیجیتال (Polar) انجام شد.

روش‌های آزمایشگاهی و نمونه‌گیری
 قبل و بعداز جلسه تمرینی از تمامی آزمودنی‌های سه گروه در حالت ناشتا به میزان ۱۰cc از ورید بازویی نمونه‌گیری خونی به عمل خواهد آمد. نمونه‌های خونی در لوله‌های آزمایشی با ماده ضد انعقاد EDTA جمع‌آوری و به گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس انتقال داده شد، جداسازی سلول‌های تک هسته‌ای خون با استفاده از فایکول و بر اساس پروتکلی که در مقاله‌ی قبلی محققین بطور کامل توضیح داده شده است (۱۷) در این مرحله انجام شد.

تخليص mRNA لنفوسيت‌ها

لنفوسيت‌ها را در نیتروژن مایع قرار داده و بصورت کامل توسط mortal & pestle خرد کردیم. برای بدست آوردن mRNA، بافت تخریب شده در بافر RLT هموژنیزه شد و سپس RNase پودر بافت و نیتروژن مایع، در تیوب میکروسانتریفیوژ ۲ml free ریخته و اجزاء داده شد تا نیتروژن مایع تبخیر شود ولی لنفوسيت‌ها از حالت یخ زدگی خارج نشود. به میزان کافی بافر RLT اضافه شد. Lysate را مستقیماً به ستون QIAshredder که در تیوب قرار داشت، منتقل کرده و به مدت ۲ دقیقه و با سرعت بالا سانتریفیوژ کردیم. برای سنتز cDNA ۲۰۰ نانو گرم mRNA با استفاده از پرایمیر اولیگو (dT) و کیت (Fermentas GmbH, St. Leon-Rot) ساخت کشور آلمان ABCG1، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی بیان نسبی ژن mRNA از روش PCR نیمه کمی استفاده شد. پرایمیری که

مقاومتی، در میزان تغییرات بیان ژن ABCG1، بین گروهها اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید($p>0.05$). نتایج در جدول ۱ و ۲ آورده شده است.

معنی‌داری را در بیان m-RNA ژن ABCG1 لتفوسيت تجربه کردند ($F=14/57$ و $P\leq 0.001$). و با وجود افزایش مقادیر بیان ژن در هر دو گروه و افزایش بیشتر بیان ژن در گروه تمرين

جدول ۱: مشخصات آنتروپومتریک آزمودنی‌ها


متغیر	گروه کنترل (N=۸)	گروه RE (N=۸)	گروه AE (N=۸)	P value
سن (سال)	۲۱/۳۷±۱/۷۶	۲۱/۸۷±۳/۰۴	۲۱/۱۲±۲/۳۵	۰/۳۸۹
قد(سانتی متر)	۱۶۱/۶۹±۱/۸۵	۱۶۰/۵۰±۳/۹۹	۱۶۳/۱۲±۵/۲۰	۰/۴۶۱
وزن (کیلوگرم)	۵۹/۶۸±۷/۶۵	۵۶/۳۵±۹/۳۱	۵۸/۲۵±۷/۸۰	۰/۴۲۰
شاخص توده بدن (kg/m ²)	۲۲/۸۸±۳/۴۹	۲۱/۸۰±۳/۰۱	۲۱/۸۲±۱/۹۲	۰/۴۵۳
درصد چربی	۱۹/۶۷±۱/۶۵	۱۸/۲۹±۳/۱۴	۱۹/۶۷±۵/۵۱	۰/۷۷۵

مقایسه مقادیر آنتروپومتریک آزمودنی‌ها جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلوموگروف اسمیرنف (KS).

جدول ۲: تغییرات بیان ژن BCG1 در PBMN خون زنان ورزشکار با استفاده از تی همبسته

متغیر	گروه	گروه کنترل (N=۸)	گروه RE (N=۸)	گروه AE (N=۸)	گروه
m-RNA	BCG1	۱۶/۳۱±۱۰۴/۶۵	۱۱/۲۱±۹۴/۰۶	۱۹/۵۸±۸۹/۴۱	پیش آزمون
ABC1	ژن	۱۱/۳۵±۴۱/۹۸	۲۴/۹۴±۵۴/۴۴	۱۱/۳۵±۴۱/۹۸	پس آزمون
*	*	**			

p<0.001 *** p<0.01 :*



نمودار ۱: مقایسه تغییرات بیان ژن ABCG1 در گروه‌های مختلف، قبل و بعد از اجرای پرونکل تمرينی

بحث و نتیجه گیری

انتخاب PBMN به عنوان بافت هدف در تحقیق حاضر به دلیل دسترسی آسان‌تر نسبت به سایر بافت‌ها بود همچنین اخیرا

ژن ABCA1 در بافت‌های مختلفی نظریر کبد، روده کوجک، ریه و همچنین گلبول‌های سفید خون بیان می‌شود و علت

را در شدت مشابه برای ژن ABCG1 مشاهده نمود که نشان دهنده همسو بودن افزایش سطح این دو انتقال دهنده در نتیجه تمرين و احتمال افزایش فواید قلبی عروقی این پروتکل های تمرينی می باشد.

پیشنهاد شده است که اثر تنظیمی اسیدهای چرب به وسیله (Proliferator Activated Receptors)PPARs می شود. همچنین مشخص شده که PPARها دارای retinoid (Liver X receptor)LXR و (RXR) گیرنده هایی نظیر (X receptor) در هستند که بیان ژن های کنترل کننده چربی و متابولیسم گلوکز را تنظیم می کنند. سه ایزو فرم از PPARs (α, β, γ) در بافت های متابولیک شامل قلب، کبد، عضله اسکلتی، کلیه و همچنین سلول های دیواره سرخ رگ ها Fatone نظیر مونو سیت ها و ماکروفاز ها بیان می شود(۲۱-۲۹). همکارانش گزارش کردند که تمرين ترکیبی (تمرين هوازی و همکارانش گزارش کردند که تمرين ترکیبی) با شدت ۵۵-۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی و تمرين مقاومتی با شدت ۶-۸۰ درصد حداکثر قدرت) باعث افزایش معنی داره α-PPAR پس از شش و دوازده ماه می شود و این در حالی است که γ-PPAR فقط پس از شش ماه افزایش پیدا کرد(۲۲). Butcher و همکاران تأثیر ۸ هفته تمرين با شدت کم را بر ژن LXR لکوسیت و γ-PPAR بررسی کردند. نتایج حاکی از افزایش بیان این دو ژن در نتیجه تمرين بود. همچنین آنها پیشنهاد کردند که فعال کردن لیگاند γ LXR منجر به فعال سازی اولیه در LXR خواهد شد و سرانجام هم باعث تنظیم مثبت (Up regulation) و افزایش بیان ژن دو انتقال دهنده ABCA1 و ABCG1 می شود و همه این عوامل به افزایش فرایند انتقال معکوس کلسترول می انجامد(۳).

در این مطالعه ما فقط به بررسی تاثیرات تمرين روی سلول های تک هسته ای خون پرداختیم. ممکن است این تاثیرات مشاهده شده منعکس کننده تاثیرات مشابهی در سلول هایی نظیر سلول های اندوتیلیوم، سلول های چربی، سلول های کبدی و سایر سلول هایی باشد که در متابولیسم چربی نقش دارند. مسلماً نتایج تاثیر این تمرينات بر این سلول ها باید به یافته های

گزارش شده که میزان ظاهر انتقال دهنده ABCA1 در PBMN به عنوان ریسک فاکتور مستقلی برای پیش بینی آترواسکلروزیس است(۱۸).

نتایج به طور کلی حاکی از آن است که در اثر هر دو نوع تمرين AE و RE، بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN افزایش معنی داری یافته است ولی تمرينات RE با وجود افزایش بیشتر تحریک بیان ژن ABCA1، این تفاوت بین دو گروه تجربی که تمرينات هوازی و مقاومتی داشتند، از لحاظ آماری معنی دار نبود. Hoang و همکارانش اعلام کردند که بیان ژن ABCA1 در لکوسیت با میزان فعالیت بدنی افراد رابطه مستقیم دارد(۱۶). همچنین Butcher و همکارانش گزارش کردند که هشت هفته ترین با شدت کم که شامل ۱۰۰۰۰ mRNA ژن ABCA1 راه رفتن بود، باعث افزایش ۳/۴۶ برابری mRNA ژن ABCA1 و افزایش ۳/۰۶ برابری mRNA ژن ABCG1 در لنفوسيت شد(۳). نتایج این دو تحقيق به خوبی تاثیر تمرينات کم شدت و فعالیت های بدنی روزمره را بر افزایش مقادیر این دو انتقال دهنده که در انتقال معکوس کلسترول و افزایش تولید HDL نقش اساسی ایفا می کنند و در حفظ سلامتی قلب و عروق دارای اهمیت ویژه ای می باشند را اثبات می کند. همچنین مشخص شده که افزایش بیان ژن ABCA1 و ABCG1 با افزایش مقادیر لیپوپروتئین لیپاز کبدی، پری بتا HDL و (Lecithin cholesterol acyltransferase)LCAT همراه می باشد که افزایش این مارکرها می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی نقش بسزایی داشته باشد(۱۷، ۱۲). Ghanbari-Niaki و همکارانش گزارش کردند که تمرين تک جلسه ای مقاومتی باعث افزایش بیان ژن ABCA1 در لنفوسيت خون دختران دانشگاهی می شود و این معنی داری در شدت های بالاتر تمرين (۸۰ درصد قدرت بیشینه) قوی تر بود(۱۲). اما تنها پژوهشی که نمونه های تمرين کرده را مورد بررسی قرار داده Rashidlamir و همکارانش است که در نتیجه هشت هفته تمرينات کشتی و تمرينات دایره ای می تنى بر فنون کشتی، افزایش بیان ژن ABCA1 را در لنفوسيت کشتی گیران تمرين کرده مشاهده کردن(۱۷). پژوهش حاضر رفتار مشابهی

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که تمرين‌های مقاومتی و هوازی می‌توانند با افزایش در بیان ژن ABCG1 در سلول‌های تک هسته‌ای خون زنان ورزشکار منجر به بهبود عملکرد انتقال معکوس کلسترول و در نتیجه فواید قلبی عروقی برای ورزشکاران گردد. بنابراین به ورزشکاران و به خصوص زنان ورزشکار توصیه می‌گردد که علاوه بر تمرين‌های هوازی، از تمرين‌های مقاومتی نیز در برنامه تمرينی خود استفاده نمایند(که معمولاً کمتر مورد توجه ورزشکاران و به خصوص زنان می‌باشد)، تا علاوه بر بهره بردن از فواید فیزیولوژیک تمرينات مقاومتی از فواید فلیی عروقی این تمرينات نیز بهره‌مند گردد.

سپاسگزاری

نتایج تحقیق حاضر، مستخرج از طرحی پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد که تامین هزینه‌های مالی این تحقیق را بر عهده داشتنند تقدیر و تشکر می‌گردد.

این تحقیق افزواده شود ولی جمع‌آوری این بافت‌ها نیاز به پروسه‌ای پیچیده و تهاجمی دارد. به عنوان یکی دیگر از محدودیت‌های تحقیق، باید اضافه نمود که آزمودنی‌ها در پژوهش حاضر دخترانی بوده‌اند که سابقه تمرينات ورزشی داشته‌اند و با توجه به تحقیقات قبلی می‌توان دریافت که این سابقه‌ی تمرين احتمالاً مقادیر انتقال‌دهنده ABCG1 را در بافت‌های کلیدی آن افزایش داده ولی با این وجود پس از یک دوره بی‌تمرينی کوتاه و از بین رفتن سازگاری‌ها، RNA انتقال‌دهنده ABCG1 پاسخ قابل توجهی به پروتکل‌های تمرينی پژوهش حاضر نشان داد.

على‌غم روشن شدن تاثیر تمرين بر انتقال دهنده‌های ABCA1 و ABCG1 انجام پژوهش‌هایی برای بررسی تمرين بر این دو عامل کلیدی در برداشت کلسترول از بافت‌های پیرامونی، در جوامع پر خطر نظیر افرادی که از آترواسکلروزیس رنج می‌برند و یا عمل باز قلب انجام داده‌اند ضروری به نظر می‌رسد.

References:

- 1- Gelissen IC, Harris M, Rye KA, Quinn C, Brown AJ, Kockx M, et al. *ABCA1 and ABCG1 synergize to mediate cholesterol export to apoA-I*. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006; 26(3): 534-40.
- 2- Yvan-Charvet L, Wang N, Tall AR. *Role of HDL, ABCA1, and ABCG1 transporters in cholesterol efflux and immune responses*. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010; 30(2): 139-43.
- 3- Butcher LR, Thomas A, Backx K, Roberts A, Webb R, Morris K. *Low-intensity exercise exerts beneficial effects on plasma lipids via PPAR[gamma]*. Med Sci Sports Exercise 2008; 40(7): 1263-70
- 4- Von Eckardstein A, Nofer J, Assmann G. *High density lipoproteins and arteriosclerosis: role of cholesterol efflux and reverse cholesterol transport*. Arteriosclerosis Thromb Vasc Biol 2001; 21(1): 13.
- 5- Oram JF. *Tangier disease and ABCA1*. Biochimi Biophys Acta 2000; 1529(1-3): 321-30.
- 6- Durstine J, Grandjean P, Davis P, Ferguson M, Alderson N, DuBose K. *Blood lipid and lipoprotein adaptations to exercise: a quantitative analysis*. Sports Med 2001; 31(15): 1033-62.
- 7- Singaraja R, Bocher V, James E, Cleee S, Zhang L, Leavitt B, et al. *Human ABCA1 BAC transgenic mice show increased high density lipoprotein cholesterol and ApoAI-dependent efflux stimulated by an internal promoter containing liver X receptor response elements in intron 1*. J Biol Chem 2001; 276(36): 33969.

- 8- Li AC, Glass CK. *PPAR- and LXR-dependent pathways controlling lipid metabolism and the development of atherosclerosis.* J Lipid Res 2004; 45(12): 2161-73.
- 9- Aiello R, Brees D, Francone OL. *ABCA1-deficient mice. insights into the role of monocyte lipid efflux in HDL formation and inflammation.* Arteriosclerosis Thromb Vasc biol 2003; 23(6): 927-80.
- 10- Orsó E, Broccardo C, Kaminski W, Böttcher A, Liebisch G, Drobnik W, et al. *Transport of lipids from golgi to plasma membrane is defective in tangier disease patients and Abc1-deficient mice.* Nature Genetics 2000; 24(2): 192-6.
- 11- Sviridov D, Kingwell B, Hoang A, Dart A, Nestel P. *Single session exercise stimulates formation of pre {beta} 1-HDL in leg muscle.* J Lipid Res 2003; 44(3): 522.
- 12- Ghanbari-Niaki A, Saghebjoo M, Hedayati M. *A single session of circuit-resistance exercise effects on human peripheral blood lymphocyte ABCA1 expression and plasma HDL-C level.* Regul Pept 2011; 166(1-3): 42-7.
- 13- Connolly PH, Caiozzo VJ, Zaldivar F, Nemet D, Larson J, Hung SP, et al. *Effects of exercise on gene expression in human peripheral blood mononuclear cells.* J Appl Physiol 2004; 97(4): 1461-9.
- 14- Buttner P, Mosig S, Lechtermann A, Funke H, Mooren FC. *Exercise affects the gene expression profiles of human white blood cells.* J Appl Physiol 2007; 102(1): 26-36.
- 15- Singaraja RR, Fievet C, Castro G, James ER, Hennuyer N, Clee SM, et al. *Increased ABCA1 activity protects against atherosclerosis.* J Clin Invest 2002; 110(1): 35-42.
- 16- Hoang A, Tefft C, Duffy SJ, Formosa M, Henstridge DC, Kingwell BA, et al. *ABCA1 expression in humans is associated with physical activity and alcohol consumption.* Atherosclerosis 2008; 197(1): 197-203.
- 17- Rashidlamir A, Ghanbari-Niaki A, Saadatnia A. *Effect of eight weeks wrestling and wrestling-technique based circuit training on lymphocyte ABCA1 gene expression and plasma apolipoprotein I-A.* World J Sport Sci 2011; 4(2): 144-50.
- 18- Demina E, Miroshnikova V, Rodygina T, Kurianov P, Vinogradov A, Denisenko A, et al. *ABCA1 gene expression in peripheral blood lymphocytes and macrophages in patients with atherosclerosis.* Molecular Biol 2011; 45(2): 258-62.
- 19- Wade D, Owen J. *Regulation of the cholesterol efflux gene, ABCA1.* Lancet 2001; 357(9251): 161.
- 20- Chinetti-Gbaguidi G, Rigamonti E, Helin L, Mutka A, Lepore M, Fruchart J, et al. *Peroxisome proliferator-activated receptor controls cellular cholesterol trafficking in macrophages.* J lipid Res 2005; 46(12): 2717.
- 21- Francis G, Annicotte J, Auwerx J. *PPAR-{alpha} effects on the heart and other vascular tissues.* American J Physiol Heart Circulatory Physiol 2003; 285(1): H1.
- 22- Fatone C, Guescini M, Balducci S, Battistoni S, Settequattrini A, Pippi R, et al. *Two weekly sessions of combined aerobic and resistance exercise are sufficient to provide beneficial effects in subjects with Type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome.* J Endocrinol Investigation 2010; 33(7): 489.

Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes

Rashidlamir A(PhD)

Department of Exercise Physiology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Received: 20 Jul 2011

Accepted: 26 Jan 2012

Abstract

Introduction: Atherosclerotic heart diseases are the most important causes of mortality in most countries. ABCG1 transporter is responsible for making and forming of HDL particles and therefore probably plays a crucial role in prevention of atherosclerosis. The purpose of this study was to assess the effect of two types of a single-session exercise (aerobic and resistance) on peripheral blood mononuclear cells (PBMN) ABCG1 gene expression in female athletes.

Methods: Twenty four female athletes from Khorasan were randomly selected and assigned into three groups: control (N=8), aerobic (AE) (N=8), and resistance (RE) (N=8). Blood samples of subjects were collected before and after exercise sessions. PBMN cells were separated and m-RNA purification was performed by semi-quantitative PCR. Data was analyzed by paired sample T test, one-way ANOVA and Tukey tests by SPSS software (version 16).

Results: Results showed that expression of PBMN ABCG1 m-RNA was significantly increased following a single-session exercise in RE and AE groups, but the increase in the RE group was higher than AE group ($P \leq 0.001$ vs. $P \leq 0.014$).

Conclusion: It can be concluded that either resistance or aerobic exercise increases the expression of ABCG1 gene on PBMN cells in female athletes which leads to an improvement in reverse cholesterol transfer and cardiovascular benefits.

Keywords: Resistance Exercise, Aerobic Training, ABCG1 gene, PBMN

This paper should be cited as:

Rashidlamir A. *Investigation of the effect of Aerobic and resistance exercises on peripheral blood mononuclear cells abcgl gene expression in female athletes*. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci; 20(1): 1-9.

*Corresponding author: Tel: +98 9151514174, Email: amir.rashidlamir@gmail.com