

مقاله مروری

ترکیب آنتی بیوتیک های بتالاکتمام و مهار کننده بتالاکتمامز علیه سویه های انتروباکتریاسه تولید کننده بتالاکتمامز با طیف وسیع

علی هاشمی^{۱*}

چکیده

مقدمه: در دهه های گذشته، بتالاکتمامز های با طیف وسیع در باسیل های گرم منفی به عنوان مهم ترین سازو کار مقاومت به آنتی بیوتیک ها ظهره اند. کار با پنیم ها، آنتی بیوتیک های انتخابی برای درمان بیماران آلوده به سویه های تولید کننده بتالاکتمامز با طیف وسیع هستند، اگرچه مقاومت به کار با پنیم ها در باکتری ها در حال افزایش است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر ترکیب آنتی بیوتیک های بتالاکتمام و مهار کننده بتالاکتمامز علیه سویه های انتروباکتریاسه تولید کننده بتالاکتمامز با طیف وسیع است.

روش بورسی: این مقاله به صورت مروری و با استفاده از ۹۱ مقاله مرتبطی که با واژگان کلیدی نظریه ترکیب مهار کننده بتالاکتمامز و بتالاکتمام، بتالاکتمامز با طیف وسیع، کار با پنیم، انتروباکتریاسه، کلبسیلا پنومونیه، اشريشیاکلی و ژن های بتالاکتمامزی در فاصله بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در پایگاه های اطلاعاتی شامل PubMed، Google scholar، اینترنت معرفی شده است. بررسی یافته های مرتبط در این زمینه پرداخت

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از مهار کننده بتالاکتمامز در ترکیب با آنتی بیوتیک های بتالاکتمام، به عنوان روشی موفق برای عفونت های ایجاد شده توسط سویه های تولید کننده بتالاکتمامز با طیف وسیع مطرح است.

واژه های کلیدی: ترکیب مهار کننده بتالاکتمامز و بتالاکتمام، بتالاکتمامز با طیف وسیع، انتروباکتریاسه، کار با پنیم

۱- استاد باریکتری شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۷۴۳۹، پست الکترونیکی: hashemi1388@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۴

مقدمه

ادراری در جنوب هند، ۹۶ درصد دارای بتالاکتاماز با طیف وسیع بودند که ۵۰ درصد نمونه‌های به دست آمده از اجتماع بود. سویه‌های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع در قاره اروپا و آمریکا در حال افزایش هستند(۱۳-۱۵). طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها ۱۹ درصد سویه‌های انتروباکتریاسه جدا شده از مراکز درمانی، تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع بودند. در ایالات متحده آمریکا هر ساله ۲۶ هزار مورد عفونت و ۱۷۰۰ مورد مرگ رخ می‌دهد که ۲۳ درصد ناشی از گونه‌های کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع و ۱۴ درصد ناشی از اشريشیاکولی تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع می‌باشند.

در آمریکای لاتین ۱۱ تا ۲۵ درصد از سویه‌های اشريشیاکلی و ۴۵ تا ۵۲ درصد از سویه‌های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به سفالسپورین‌های نسل سوم بودند. در بعضی کشورهای اروپایی از قبیل سوئد، ۴/۴ درصد و در بلغارستان ۳۸/۱ درصد سویه‌ها مقاوم به سفالسپورین‌های نسل سوم هستند(۱۳). با افزایش بتالاکتامازهای با طیف وسیع، مصرف کاربپنیم‌ها افزایش یافته که این امر باعث مقاومت سویه‌ها به کاربپنیم‌ها می‌شود(۱۶، ۱۶). با توجه به شیوع بسیار بالای مقاومت، توسعه داروهای جدید ضد باکتری ضروری است و نقش مهارکننده‌های بتالاکتاماز در این زمینه بسیار مهم ارزیابی می‌گردد. ترکیب مهارکننده بتالاکتاماز و آنتی بیوتیک بتالاکتام اثر بهتری دارند، چرا که علی‌رغم وجود بتالاکتاماز، آنتی بیوتیک بتالاکتام فعالیت خود را حفظ می‌کند(۱۷). اگرچه نقش مهارکننده‌های بتالاکتامازی از قبیل آموکسی- کلاولانات، تیکارسیلین- کلاولانات و پیپراسیلین/ تازوپاکتام در درمان سویه‌های تولید کننده بتالاکتاماز با طیف وسیع ناشناخته است. بتالاکتامازهای با طیف وسیع در محیط آزمایشگاه توسط کلاولانات مهار می‌شوند. اما این نگرانی وجود دارد که ممکن است سویه در محیط آزمایشگاه به کلاولانات حساس باشد،

اثرات باکتریوسیدال آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام، ناشی از مهار آنزیم‌هایی است که در ساخت دیواره باکتری نقش دارند(۱). مهم‌ترین سازوکار غیر فعال‌سازی آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام، بتالاکتامازها می‌باشند. بتالاکتامازهای با طیف وسیع در باکتری‌های گرم منفی به عنوان یک مشکل مهم بهداشت عمومی در دهه‌های گذشته مطرح شده‌اند(۲). اولین سویه‌های مقاوم به آنتی بیوتیک در عفونت‌های کسب شده از بیمارستان دیده شد، اما امروزه سویه‌های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع در اجتماع هم دیده می‌شوند(۳). در بسیاری از شهرهای ایران به ویژه تهران انواع بتالاکتامازهای با طیف وسیع همانند bla_{TEM}, bla_{SHV}, bla_{CTX-M} دیده شده‌اند(۴-۸). بتالاکتامازهای با طیف وسیع به بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها از جمله سفالسپورین‌های نسل سوم مقاوم هستند. در قاره اروپا، شیوع عفونت‌های خونی ایجاد شده توسط سویه‌های مقاوم به سفالسپورین‌های نسل سوم بیش از سویه‌های استافیلوکوک مقاوم به متی‌سیلین (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) است(۹). بعضی ژن‌های بتالاکتاماز با طیف وسیع همانند bla_{CTX-M-15} در سرتاسر جهان دیده شده‌اند(۱۰). این ژن در سراسر ایران گسترش یافته است(۱۱، ۱۲). این ژن‌ها توسط پلاسمید کد شده و به راحتی انتشار پیدا می‌کنند که بیشتر ناشی از سویه اپیدمیک اشريشیاکلی تیپ ۱۳۱ می‌باشند(۱۰). سازمان بهداشت جهانی، اخیراً نشان داده سویه‌های کلبسیلا پنومونیه و اشريشیاکلی مقاوم به سفالسپورین‌ها گسترش یافته‌اند(۱۳). بررسی باکتری‌های گرم منفی در ۲۸ کشور جهان نشان داده که ۳۹ درصد سویه‌های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع در قاره آسیا (به جز کشور هند) و کمترین میزان در قاره اروپا (۴/۴ درصد) شیوع دارند و میانگین جهانی این سویه‌ها ۱۶/۳ درصد است. در عفونت‌های درون شکمی در هند، ۶۷ تا ۷۹ درصد و در چین ۵۵ تا ۶۵ درصد سویه‌ها، تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع بودند. از ۲۲۵ جدایه کلبسیلا پنومونیه از نمونه‌های

سفالسپورین‌های نسل سوم و مونوباکتم‌ها مقاوم و به کلاؤلانات حساس می‌باشند، اما قادر به هیدرولیز کاربایپن‌ها و سفامایسین‌ها نیستند(۲۷). استراتژی‌های درمانی برای مقابله با ظهور و ارزیابی بتالاکتمازها بر توسعه بتالاکتمازهای مقاوم به هیدرولیز و همچنین استفاده از مهارکننده‌های بتالاکتمازی که گرایش زیادی به بتالاکتمازها دارند و قادر به حفاظت از فعالیت آنزیم هستند، متتمرکز شده است. تمام این داروها به طور مؤثر، فعالیت بتالاکتمازها به ویژه بتالاکتمازهای با طیف وسیع را مهار می‌کنند، اگرچه آنزیم‌های مقاوم به مهارکننده‌ها مشاهده شده‌اند(۲۸). کلید اصلی شناسایی بتالاکتمازهای با طیف وسیع، مقاومت به سفالسپورین‌های نسل سوم است، اگرچه سایر بتالاکتمازها از قبیل AmpC نیز به سفالسپورین‌های نسل سوم مقاوم هستند. آنزیم AmpC به وسیله ژن‌هایی کد می‌شود که بر روی کروموزوم قرار دارند، اما می‌توانند درون پلاسمیدها هم قرار بگیرند و به دیگر باکتری‌ها نیز منتقل شوند(۲۹). در ایران نیز ژن‌های AmpC مشاهده شده است(۳۰). مقاومت پلاسمیدی AmpC در حال افزایش است و این آنزیم‌ها توسط کلاؤلانات و تازوبراکتم مهار نمی‌شود. روش‌های جدیدی برای تشخیص سریع بتالاکتمازهای با طیف وسیع از کشت خون توسعه یافته که می‌توانند گزینه‌های درمانی مناسبی را مطرح کنند.

مطالعات آزمایشگاهی

سویه‌های تولیدکننده بتالاکتماز با طیف وسیع ممکن است در محیط آزمایشگاه به ترکیب مهارکننده بتالاکتماز و آنتی‌بیوتیک بتالاکتم حساس باشند. اگرچه پزشکان ممکن است در استفاده از این داروها به ویژه برای عفونت‌های جدی از قبیل باکتریمی یا پنومونی محتاط عمل کنند که در این مورد، کاربایپن‌ها به عنوان داروی انتخابی مورد استفاده قرار می‌گیرند(۳۱).

یک نگرانی مهم در استفاده از مهارکننده بتالاکتماز و آنتی‌بیوتیک بتالاکتم برای عفونت‌های ایجاد شده به وسیله تولیدکننده‌های بتالاکتماز با طیف وسیع، کاهش کارایی در حضور میزان بالای باکتری است(۳۲). مطالعات نشان داده که آنتی‌بیوتیک پیپراسیلین/تازوبراکتم، ۹۹ درصد از

اما در محیط زنده این‌گونه نباشد(۱۳). مطالعات آزمایشگاهی و درمانگاهی نشان داده است که کاربایپن‌ها اثرات بهتری نسبت به مهارکننده و آنتی‌بیوتیک دارند، چرا که کاربایپن‌ها علیه طیف وسیعی از بتالاکتمازها فعال هستند(۱۸). از این‌رو کاربایپن‌ها اولین دارویی می‌باشد که علیه عفونت‌های ایجاد شده توسط سویه‌های تولیدکننده بتالاکتماز با طیف وسیع پیشنهاد می‌شوند.

این مقاله به صورت مروری و با استفاده از واژگان کلیدی نظریه ترکیب مهارکننده بتالاکتماز و بتالاکتم، بتالاکتماز با طیف وسیع، کاربایپن، انتروبراکتریاسه، کلبسیلا پنومونیه، اشريشیاکلی و ژن‌های بتالاکتمازی در فاصله بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل PubMed، google scholar بررسی و در مجموع از ۹۱ مقاله معتبر به عنوان منبع تحقیقاتی خود استفاده کردیم.

بتالاکتمازهای با طیف وسیع

خانواده‌ای از پروتئین‌ها می‌باشد که بتالاکتمازها را غیرفعال می‌کنند. بتالاکتمازهای با طیف وسیع، اصلی‌ترین مکانیسم غیرفعال کردن بتالاکتمازها توسط باکتری‌های گرم منفی می‌باشند(۲۳، ۱۶، ۴، ۱۶) ژن‌های کدکننده این آنزیم‌ها روی کروموزوم و عناصر ژنتیکی متحرك از قبیل پلاسمیدها قرار دارند(۲۴). از لحاظ تاریخی بیشتر بتالاکتمازها تنها طیف محدودی از بتالاکتمازها را غیرفعال می‌کنند(از قبیل پنی‌سیلین). اولین بتالاکتماز با طیف وسیع کشف شده، Sulphydryl Variable (SHV) بود که در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه مشاهده شد و باعث غیر فعال شدن سفالسپورین‌های نسل سوم و مونوباكتمها می‌شوند(۲۵). از سال ۲۰۰۰، افزایش شیوع سویه‌های اشريشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتماز CTX-M مشاهده می‌شود(۲۶). چندین طبقه‌بندی برای بتالاکتمازها وجود دارد، اما دو طبقه‌بندی اهمیت بیشتری دارند: طبقه‌بندی Bush-Jacoby-Medeiros که بر اساس ساختار است و بتالاکتمازهای وسیع‌الطیف در این طبقه‌بندی در گروه 2be قرار دارند و طبقه‌بندی مولکولی Ambler که بتالاکتمازهای با طیف وسیع در کلاس A قرار دارند(۱۶). این آنزیم‌ها به

بر سویه‌های تولیدکننده ESBL و سویه‌های منفی ESBL دارند. از این رو نیاز به مقدار کافی از آنتی بیوتیک به منظور حفظ اثرات ضد میکروبی در زمان مواجهه با جمعیت باکتری است.

ژن‌های بتالاکتامازی

ژن‌های بتالاکتامازی بر روی عناصر اکتسابی از قبیل پلاسمید قرار دارند و ممکن است این پلاسمیدها حاوی سایر ژن‌های بتالاکتامازی نیز باشند^(۱۰). برخی بتالاکتامازها ممکن است به وسیله کلاؤلانات یا تازو باکتم (مانند ژن‌های پلاسمیدی AmpC) مهار نشوند. برای مثال، سویه‌های اشرشیاکلی در بعضی کشورها مقاوم به آموکسی سیلین-کلاؤلانات هستند. این سویه‌ها دارای ژن‌های OXA-1 و CTX-M بر روی پلاسمید مشابه می‌باشند، به ویژه CTX-M-15 را حمل می‌کنند^(۳۵). به دلیل وجود انواع ژن‌های CTX-M، حداقل غلظت ممانعت‌کننده از رشد ترکیب مهارکننده بتالاکتاماز و آنتی بیوتیک بتالاکتام متفاوت است^(۳۶). بعضی بتالاکتامازهای دیگر از قبیل TEM-1 به مهارکننده‌ها مقاوم هستند. در ایران، بسیاری از ژن‌های بتالاکتاماز با طیف وسیع شناسایی شده است (جدول ۱).

کشنندگی باکتریال علیه 1×10^7 CFU در هر میلی لیتر را بعد از ۸ ساعت از دست می‌دهد و بعد از این زمان رشد باکتری مجددآ شروع می‌شود، در حالی که کارباپنم‌ها قادرند، ۹۹/۹ درصد از کشنندگی را به مدت ۲۴ ساعت حفظ کنند^(۳۳). علی‌رغم MIC مشابه، فعالیت پیپراسیلین/تازو باکتم علیه سویه‌های کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع و سویه‌های فاقد بتالاکتاماز با طیف وسیع یکسان نیست. بر خلاف پیپراسیلین/تازو باکتم، آنتی بیوتیک آموکسی سیلین/کلاؤلانات به مدت ۲۴ ساعت قادر به حفظ فعالیت علیه سویه‌های اشرشیاکلی می‌باشد. ایمی‌بنم و آموکسی سیلین-کلاؤلانات علیه سویه‌های اشرشیاکلی مؤثرتر از پیپراسیلین/تازو باکتم می‌باشند^(۳۴). دوز ناکافی از دیگر عواملی است که باعث عدم تاثیر دارو می‌شود.

مشکلی که در درمان باکتری‌های تولیدکننده ESBL وجود دارد احتمال کاهش کارایی دارو در حضور تعداد بالای باکتری است که در این حالت کارایی مهارکننده‌های بتالاکتاماز نیز کاهش می‌یابد. در بررسی میزان اثر دارو نسبت به زمان، کارباپنم‌ها نسبت به پیپراسیلین-تازو باکتم در مدت طولانی‌تری اثرات خود را حفظ می‌کنند. پیپراسیلین-تازو باکتم علیرغم MIC یکسان، اثرات متفاوتی

جدول ۱: انتشار ژن‌های بتالاکتماز با طیف وسیع در ایران (نمایه شده در PubMed)

نام میکرووارگانیسم	شهر	سال شناسایی	نوع بتالاکتماز با طیف وسیع	مرجع
اسینتوباکتر بامانی	همدان	۲۰۱۵	TEM,SHV,CTX-M	(۳۷)
اشریشیاکلی	تهران	۲۰۰۸ و ۲۰۱۵	TEM,SHV,CTX-M	(۳۹, ۳۸)
سودوموناس آئروژینوزا	تهران	۲۰۱۴	TEM,SHV,CTX-M, PER, GES, VEB	(۴۳-۴۰)
کلبسیلا پنومونیه	تهران	۲۰۱۴-۲۰۱۰	TEM,SHV,CTX-M	(۴۹-۴۴)
شیگلا	تهران	۲۰۱۳	TEM,CTX-M-15	(۵۰)
سالمونلا انتریتیکا	تهران	۲۰۰۹	CTX-M-15	(۵۱)
اسینتوباکتر بامانی	تهران	۲۰۱۴	CTX-M-15, PER, VEB	(۵۲, ۱۹)
کلبسیلا پنومونیه - اشریشیاکلی	زاهدان	۲۰۱۵	CTX-M-8, CTX-M-15	(۵۴, ۵۳)
سودوموناس آئروژینوزا	زاهدان	۲۰۱۵	VEB, TEM, SHV, CTX-M, PER	(۵۵)
سودوموناس آئروژینوزا	کرمان	۲۰۱۴	CTX-M	(۲۲)
اشریشیاکلی	کرمان	۲۰۱۵	PER, VEB, OXA-1	(۵۶)
کلبسیلا پنومونیه - اشریشیاکلی	مشهد	۲۰۱۴	TEM, SHV, CTX-M	(۵۸, ۵۷)
کلبسیلا پنومونیه	کاشان	۲۰۱۵	CTX-M	(۵۹)
اشریشیاکلی	زنجان	۲۰۱۴	TEM-CTX-M	(۶۰)
سودوموناس آئروژینوزا	اهواز	۲۰۱۴	OXA-10, PER, CTX-M	(۶۱)
انتروباکتر کلوآکه	قزوین	۲۰۱۴	TEM, SHV, CTX-M	(۶۲)
کلبسیلا پنومونیه	شیراز	۲۰۱۳	TEM, SHV, CTX-M	(۶۳)
اشرشیاکلی	شیراز	۲۰۱۵	TEM, SHV, CTX-M	(۶۴)
کلبسیلا پنومونیه	ایلام	۲۰۱۲	TEM, SHV, CTX-M	(۶۵)
اشریشیاکلی	ساری	۲۰۱۵	TEM, SHV, CTX-M, VEB, GES	(۶۶)
کلبسیلا پنومونیه	شهرکرد	۲۰۱۵	TEM, SHV	(۶۷)
کلبسیلا پنومونیه - اشریشیاکلی	اصفهان	۲۰۱۴	TEM, SHV	(۶۸)
کلبسیلا - انتروباکتر - پروتتوس -	جهرم	۲۰۱۴	TEM, SHV	(۶۹)
سودوموناس - سیتروباکتر	تبریز	۲۰۱۳	PER, VEB	(۷۰)
اسینتوباکتر بامانی	تبریز	۲۰۱۲	PER-1	(۷۱)
سودوموناس آئروژینوزا				

حساس بودند (۷۲%). در مطالعه‌ای دیگر ذکر شده آموکسیسیلین-کلاولات، تیکارسیلین/اسولباکتم/ کلاولات، آموکسیسیلین/سولباکتم و پیپراسیلین/تازووباکتم علیه بعضی آنزیم‌ها فاقد فعالیت هستند (۷۳). شناسایی الگوهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی و اپیدمیولوژی مولکولی آنزیم‌ها، می‌تواند در درمان تجربی، کمک کننده باشد.

آنٹی‌بیوتیک مناسب برای درمان بیماران آموکسیسیلین/تازووباکتم در درمان بیماران مبتلا به عفونت ادراری با سویه‌های اشرشیاکلی حامل ژن CTX-M-15 و CTX-M-14

مقاومت آنتی‌بیوتیکی حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ترکیب مهارکننده و بتالاکتم ممکن است بسته به نوع بتالاکتماز با طیف وسیع، نفوذپذیری غشا و مقدار بتالاکتماز تولید شده، متفاوت باشد (۱۳, ۱۷). مطالعه انجام شده روی جدایه‌های انتروباکتریاسه در ۷۲ بیمارستان ایالات متحده نشان داد ۶۷/۲ درصد جدایه‌های حامل ژن CTX-M-15، ۹۲/۹ درصد سویه‌های حامل ژن CTX-M-14، ۸۱/۵ درصد سویه‌های حامل ژن CMY و ۴۵/۸ درصد سویه‌های حامل ژن SHV به پیپراسیلین/تازووباکتم

کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز CTX-M-15 مؤثر است(۸۳). ترکیب آزترونام-اویباکتم علیه بیماری‌ Zahای گرم منفی مقاوم به چند داروی تولیدکننده متالوبتاکتماز از قبیل سویه‌های تولیدکننده NDM-1 مؤثر است(۸۴). سفتولوزان(Ceftolozane) سفالسپورین جدیدی است که علیه سویه‌های تولیدکننده C AmpC و در ترکیب با تازوباکتمام بر سویه‌های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع مؤثر می‌باشد(۸۵). سفتولوزان یک مهارکننده PBP3 می‌باشد و نسبت به دیگر آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام گرایش زیادی به Ceftolozane/tazobactam، ترکیب مهارکننده بتالاکتاماز و آنتی بیوتیک بتالاکتام است که علیه سویه‌های پسودوموناس موثر است و اخیراً توسط سازمان غذا و دارو آمریکا برای عفونت‌های درون شکمی و ادراری تائید شده است. این آنتی بیوتیک از بیوسنتر دیواره سلولی PBPs (Penicillin binding protein) باکتری ممانعت می‌کند(۸۶). دیگر ترکیبات مهارکننده بتالاکتاماز و آنتی بیوتیک بتالاکتام از قبیل Relebactam، RPX7009 هستند که برای بیماران آلوده شده با ارگانیسم‌های مقاوم به چندین دارو گزینه‌های با ارزشی محسوب می‌شوند(۷۳).

چه آنتی بیوتیکی برای سویه‌های تولیدکننده متالوبتاکتماز مناسب است؟

مهارکننده‌ای برای سویه‌های تولیدکننده متالوبتاکتماز وجود ندارد. در بسیاری از شهرهای ایران، از جمله تهران، اهواز، کردستان، شیراز، زاهدان، مشهد و تبریز، متالوبتاکتمازها دیده شده‌اند. در ایران ژن‌های متالوبتاکتمازی bla_{IMP} و bla_{VIM} در سویه‌های اسینیتوباکتر بامانی و سودوموناس آروزیننزا شایع‌تر از سایرین هستند(۸۷،۵۲،۳۰،۲۰،۵۵). این سویه‌ها به بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها از جمله کارباپن‌ها مقاوم شده‌اند و امروزه از آنتی بیوتیک کلیستین برای بیماران بیماران استفاده می‌شود که خود، عوارض زیادی برای بیماران دارد. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۱ در مجله Lancet به چاپ رسید اشاره شده برای این باکتری‌ها می‌توان از ترکیب مروپنام و آمینوگلیکوزید یا کلیستین استفاده نمود(۸۸). با توجه به

پیپراسیلین/تازوباکتمام در درمان بیماران آلوده به سویه‌های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع با $\text{MIC} \leq 16\text{ }\mu\text{g/ml}$ مؤثر بود هرچند مواردی از مقاومت آنتی بیوتیکی نیز گزارش شده است. در برخی مناطق، کارباپن‌ها تا حد زیادی مؤثرتر از مهارکننده بتالاکتاماز و آنتی بیوتیک بتالاکتام بودند. کارباپن‌ها در درمان سویه‌های کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع نسبت به سفالسپورین‌های نسل سوم، پیپراسیلین/تازوباکتمام یا تیکاراسیلین/تازوباکتمام مقدم هستند(۷۴) اما در برخی مطالعات، تفاوتی بین کارایی کارباپن‌ها با ترکیب مهارکننده بتالاکتاماز و بتالاکتام مشاهده نشد(۷۵). در مطالعات مختلف نشان داده شده که استفاده از پیپراسیلین/تازوباکتمام به جای کارباپن‌ها باعث کاهش مقاومت به کارباپن‌ها می‌شود(۷۶).

ترکیبات جدید مهارکننده بتالاکتاماز و آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام

سفپیم/تازوباکتمام و سفتریاکسون/سولباکتمام در هند مورد استفاده قرار می‌گیرند(۷۷). اویباکتمام (Avibactam) مهارکننده بتالاکتاماز جدیدی است که علیه بتالاکتمازهای کلاس A,C و Ambler از بتالاکتمازهای کلاس D طبقه بندی مؤثر هستند. همچنین در مطالعه‌ای نشان داده شده که اویباکتمام قادر به مهار بتالاکتمازها در مایکوباتریوم آبسسوس(Mycobacterium abscessus) است. ترکیب اویباکتمام و سفتازیدیم، تاثیراتی مشابه کارباپن‌ها در درمان عفونت‌های ادراری و شکمی دارد(۷۸-۸۰). در *in vitro* ترکیب اویباکتمام و سفتازیدیم علیه بسیاری از باکتری‌های گرم منفی از قبیل سویه‌های اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع، انتروباکتر کلواکه مقاوم به سفتازیدیم و کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده کارباپن‌ماز مؤثر هستند(۷۸). سفتارولین-اویباکتمام (Ceftaroline-avibactam) بر بسیاری از باکتری‌ها از قبیل انتروباكتریا سه تولیدکننده KPC، CTX-M و AmpC مؤثر است(۸۱،۸۲). اویباکتمام در ترکیب با ایمی‌پن، سفتازیدیم یا سفپیم علیه سویه کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده OXA-48 مقاوم به کارباپن و اشرشیاکلی یا

سال‌های اخیر بسیاری از سویه‌های جدا شده دارای بتالاکتاماز با طیف وسیع می‌باشند.

برای درمان مناسب بیماران آلوده به باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها نیاز به شناسایی مکانیسم‌های مقاومت با استفاده از روش‌های دقیق است. پزشکان، کارشناسان آزمایشگاه و پرستاران باید در مورد مکانیسم‌های مقاومت و روش‌های شناسایی آنها آگاهی کافی را داشته باشند. باکتری‌های شناسایی آنها تولیدکننده بتالاکتاماز به بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم می‌باشند. در این میان، ترکیب آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام و مهارکننده بتالاکتاماز می‌توانند در مواردی که سایر آنتی‌بیوتیک‌ها کاربرد ندارند، برای درمان عفونت‌های ناشی از سویه‌های دارای بتالاکتاماز با طیف وسیع مورد استفاده قرار گیرند، اما زمانی که سویه‌ها هم‌زمان دارای بتالاکتاماز با طیف وسیع و متالوبتاکتاماز باشند، کارایی لازم را نخواهد داشت. با توجه به اینکه ژن‌های تولیدکننده بتالاکتامازها بیشتر بر روی عناصر الحقیقی از قبیل پلاسمید قرار دارند به راحتی قادر به انتقال به دیگر باکتری‌ها می‌باشند از این‌رو تشخیص مناسب این سویه‌ها توسط کارشناسان آزمایشگاه می‌تواند در تجویز آنتی‌بیوتیک‌های مناسب توسط پزشکان کمک‌کننده باشد.

افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها نیاز به جایگزین کردن موادی از قبیل مواد موثره گیاهی برای مقابله با این باکتری‌ها ضروری است. بسیاری از گیاهان موجود در ایران خاصیت ضدмیکروبی دارند و می‌توانند با بررسی‌های بیشتر برای درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرند. مطالعات انجام شده، نشان می‌دهد بعضی از گیاهان اثر نسبتاً خوبی بر سویه‌های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع و متالوبتاکتاماز دارند(۸۹-۹۱).

نتیجه‌گیری

مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها و شیوع ژن‌های بتالاکتاماز با طیف وسیع و متالوبتاکتاماز در باکتری‌های گرم منفی در سراسر جهان نگران‌کننده است و نیاز به اقدامات کنترل عفونت از جمله مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و شناسایی سریع جدایه‌های تولیدکننده بتالاکتاماز دارد. تشخیص سریع و دقیق این سویه‌ها می‌تواند به پزشکان در تجویز آنتی‌بیوتیک کمک‌کننده باشد و از هزینه‌های زیاد و بستری طولانی مدت بیماران در بیمارستان جلوگیری کند. در سال‌های گذشته بسیاری از سویه‌های جدا شده از اجتماع حساس به آنتی‌بیوتیک و فاقد بتالاکتاماز با طیف وسیع بودند اما در

Reference:

- 1- Drawz SM, Bonomo RA. *Three decades of β -lactamase inhibitors*. Clinic Microbio Rev 2010; 23(1): 160-201.
- 2- Pitout JD, Laupland KB. *Extended-spectrum β -lactamase-producing Enterobacteriaceae: an emerging public-health concern*. The Lancet infectious diseases 2008; 8(3): 159-66.
- 3- Medeiros AA. *Nosocomial outbreaks of multiresistant bacteria: extended-spectrum beta-lactamases have arrived in North America*. Ann Inter Med 1993; 119(5): 428-30.
- 4- Roodsari MR, Fallah F, Taherpour A, Vala MH, Hashemi A. *Carbapenem-resistant bacteria and laboratory detection methods*. Archives of Pediatric Infec Dis 2014; 2(1): 188-91.

- 5- Fallah F, Hakemi Vala M, Goudarzi H, Hashemi A, Taherpour A, Bigdeli Shamloo K. *Identification of extended-spectrum-beta lactamases (ESBLs), metallo-beta-lactamases (MBLs), Amp-C and KPC β-lactamases among Klebsiella pneumoniae isolated from adults and pediatric patients in Iran.* African J Microbiol Res 2013; 7(25): 3254-61. [Persian]
- 6- Hashemi A, Fallah F, Taherpour A, Goudarzi H, Erfanianesh S, Taki E. *Evaluation of Genetic Pattern and Determination of oqxA Gene Expression Levels among Clinical Isolates of Klebsiella Pneumoniae Strains.* J Mazandaran Univ Med Sci (JMUMS) 2014; 24(119): 54-67.
- 7- Amraei S, Eslami G, Taherpour A, Goudarzi H, Hashemi A. *Detection of FOX, MOX, and ACT Genes in ESBL-producing Klebsiella pneumoniae Strains.* J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(118): 11-20.
- 8- Hashemi A, Fallah F, Erfanianesh S, Hamedani P, Alimehr S, Goudarzi H. *Detection of beta - Lactamases and Outer Membrane Porins among Klebsiella pneumoniae Strains Isolated in Iran.* Scientifica (Cairo) 2014; 726179.
- 9- De Kraker ME, Davey PG, Grundmann H, BURDEN Study Group. *Mortality and hospital stay associated with resistant Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteraemia: estimating the burden of antibiotic resistance in Europe.* PLoS Med 2011; 8(10): e1001104.
- 10- Coque TM, Novais Â, Carattoli A, Poirel L, Pitout J, Peixe L, et al. *Dissemination of clonally related Escherichia coli strains expressing extended-spectrum β-lactamase CTX-M-15.* Emerging Infect Dis 2008; 14(2): 195-200.
- 11- Goudarzi H, Aghamohammad S, Hashemi A, Nikmanesh B, Noori M. *Distribution of bla TEM, bla SHV and bla CTX-M genes among Escherichia coli isolates causing urinary tract infection in children.* Archives Clinic Infec Dis 2013; 8(3).
- 12- Goudarzi M, Sabzehali F, Tayebi Z, Azad M, Boromandi S, Hashemi A, et al. *Prevalence of blaCTX-M gene in multi-resistant Escherichia coli isolated from Urinary Tract Infections, Tehran, Iran.* Novelty in Biomedicine 2014; 2(4): 107-13. [Persian]
- 13- Harris PN, Tambyah PA, Paterson DL. *beta-lactam and beta-lactamase inhibitor combinations in the treatment of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae: time for a reappraisal in the era of few antibiotic options?* Lancet Infect Dis 2015; 15(4): 475-85.
- 14- Chen Y-H, Hsueh PR, Badal RE, Hawser SP, Hoban DJ, Bouchillon SK, et al. *Antimicrobial susceptibility profiles of aerobic and facultative Gram-negative bacilli isolated from patients with intra-abdominal infections in the Asia-Pacific region according to currently established susceptibility interpretive criteria.* J Infect 2011; 62(4): 280-91.
- 15- Doi Y, Adams-Haduch JM, Endimiani A, Sidjabat HE, Gaddad SM, Paterson DL. *High prevalence of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae among inpatients and outpatients with urinary tract infection in Southern India.* J antimicrobial chemotherapy 2008; 61(6): 1393-94.

- 16-** Fallah F, Taherpour A, Vala MH, Hashemi A. *Global Spread of New Delhi mettallo-beta-lactamase-1 (NDM-1)*. Archives of Clinic Infect Dis 2012; 6(4): 171-77. [Persian]
- 17-** Lee JH, Lee JJ, Park KS, Lee SH. *Urgent need for beta-lactam-beta-lactamase inhibitors*. Lancet Infect Dis 2015; 15(8): 876-77.
- 18-** Nicolau DP. *Carbapenems: a potent class of antibiotics*. Expert opinion on pharmacotherapy 2008; 9(1): 23-37.
- 19-** Fallah F, Noori M, Hashemi A, Goudarzi H, Karimi A, Erfanianesh S, et al. *Prevalence of bla NDM, bla PER, bla VEB, bla IMP, and bla VIM Genes among Acinetobacter baumannii Isolated from Two Hospitals of Tehran, Iran. Scientifica (Cairo)*. Sci 2014; 245162. [Persian]
- 20-** Hakemi Vala M, Hallajzadeh M, Hashemi A, Goudarzi H, Tarhani M, Sattarzadeh Tabrizi M, et al. *Detection of Ambler class A, B and D β-lactamases among Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii clinical isolates from burn patients*. Ann burns fire disasters 2014; 27(1): 8-13. [Persian]
- 21-** Vala MH, Hallajzadeh M, Fallah F, Hashemi A, Goudarzi H. *Characterization of the Extended-Spectrum beta-Lactamase Producers among Non-Fermenting Gram-Negative Bacteria Isolated from Burnt Patients*. Archives Hygiene Sci 2013; 2(1). [Persian]
- 22-** Mansouri S, Neyestanaki DK, Shokoohi M, Halimi S, Beigverdi R, Rezagholerezadeh F, et al. *Characterization of AmpC, CTX-M and MBLs types of β-lactamases in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli producing Extended Spectrum β-lactamases in Kerman, Iran*. Jundishapur J Microbio 2014; 7(2). [Persian]
- 23-** Hashemi A, Fallah F, Taherpour A, Goudarzi H, Tarashi S, Erfanianesh S, et al. *Detection of Metallo-beta-Lactamases, Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBLs), Outer Membrane Porins among Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated from Hospitalized Patients in Tehran*. ZUMS J 2015; 23(98): 89-102. [Persian]
- 24-** Jacoby GA, Munoz-Price LS. *The new β-lactamases*. New England J Med 2005; 352(4): 380-91.
- 25-** Kliebe C, Nies BA, Meyer JF, Tolxdorff-Neutzling RM, Wiedemann B. *Evolution of plasmid-coded resistance to broad-spectrum cephalosporins*. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1985; 28(2): 302-07.
- 26-** Livermore DM. *Current epidemiology and growing resistance of gram-negative pathogens*. Korean J Inter Med 2012; 27(2): 128-42.
- 27-** Lee JH, Bae IK, Hee Lee S. *New definitions of extended-spectrum β-lactamase conferring worldwide emerging antibiotic resistance*. Med Res Rev 2012; 32(1): 216-32.
- 28-** Cantón R, Morosini MI, Martin O, De La Maza S, De La Pedrosa EGG. *IRT and CMT β-lactamases and inhibitor resistance*. Clinic Microbio Infec 2008; 14(s1): 53-62.
- 29-** Alvarez M, Tran JH, Chow N, Jacoby GA. *Epidemiology of conjugative plasmid-mediated AmpC β-lactamases in the United States*. Antimicrobial agents chemotherapy 2004; 48(2): 533-37.

- 30- Jafari M, Fallah F, Borhan RS, Navidinia M, Karimi A, Tabatabaei SR, et al. *The First Report of CMY, aac (6')-Ib and 16S rRNA Methylase Genes Among Pseudomonas aeruginosa Isolates From Iran*. Archives Pediatric Infect Dis 2013; 1(3): 109-12. [Persian]
- 31- Paterson DL, Bonomo RA. *Extended-spectrum β-lactamases: a clinical update*. Clinic Microbio Rev 2005; 18(4): 657-86.
- 32- Thomson KS, Moland ES. *Cefepime, piperacillin-tazobactam, and the inoculum effect in tests with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae*. Antimicrobial agents and chemotherapy 2001; 45(12): 3548-54.
- 33- Burgess DS, Hall RG. *In vitro killing of parenteral beta-lactams against standard and high inocula of extended-spectrum beta-lactamase and non-ESBL producing Klebsiella pneumoniae*. Diagnostic Microbio Infect Dis 2004; 49(1): 41-6.
- 34- López-Cerero L, Picon E, Morillo C, Hernández JR, Docobo F, Pachón J, et al. *Comparative assessment of inoculum effects on the antimicrobial activity of amoxycillin-clavulanate and piperacillin-tazobactam with extended-spectrum β-lactamase-producing and extended-spectrum β-lactamase-non-producing Escherichia coli isolates*. Clinic Microbio Infect 2010; 16(2): 132-36.
- 35- Woodford N, Carattoli A, Karisik E, Underwood A, Ellington MJ, Livermore DM. *Complete nucleotide sequences of plasmids pEK204, pEK499, and pEK516, encoding CTX-M enzymes in three major Escherichia coli lineages from the United Kingdom, all belonging to the international O25: H4-ST131 clone*. Antimicrobial agents and chemotherapy 2009; 53(10): 4472-82.
- 36- Akhan SC, Coskunkan F, Tansel O, Vahaboglu H. *Conjugative resistance to tazobactam plus piperacillin among extended-spectrum beta-lactamase-producing nosocomial Klebsiella pneumoniae*. Scandinavian J Infect Dis 2001; 33(7): 512-15.
- 37- Safari M, Nejad ASM, Bahador A, Jafari R, Alikhani MY. *Prevalence of ESBL and MBL encoding genes in Acinetobacter baumannii strains isolated from patients of intensive care units (ICU)*. Saudi J Biologic Sci 2015; 22(4): 424-29. [Persian]
- 38- Memariani M, Peerayeh SN, Salehi TZ, Mostafavi SKS. *Occurrence of SHV, TEM and CTX-M β-Lactamase Genes Among Enteropathogenic Escherichia coli Strains Isolated From Children With Diarrhea*. Jundishapur J Microbio 2015; 8(4). [Persian]
- 39- Mehrgan H, Rahbar M. *Prevalence of extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli in a tertiary care hospital in Tehran, Iran*. Inter J antimicrobial agents 2008; 31(2): 147-51.
- 40- Fazeli N, Momtaz H. *Virulence Gene Profiles of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolated From Iranian Hospital Infections*. Iranian Red Crescent Med J 2014; 16(10). [Persian]

- 41-** Rafiee R, Eftekhar F, Tabatabaei SA, Tehrani DM. *Prevalence of Extended-Spectrum and Metallo β -Lactamase Production in AmpC β -Lactamase Producing Pseudomonas aeruginosa Isolates From Burns.* Jundishapur J Microbio 2014; 7(9). [Persian]
- 42-** Peerayeh SN, Mahabadi RP, Toupkanlou SP, Siadat SD. *Diversity of β -lactamases produced by imipenem resistant, Pseudomonas aeruginosa isolates from the bloodstream.* Burns 2014; 40(7): 1360-64. [Persian]
- 43-** Shahcheraghi F, Nikbin V-S, Feizabadi MM. *Prevalence of ESBLs genes among multidrug-resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa isolated from patients in Tehran.* Microbial Drug Resistance 2009; 15(1): 37-9. [Persian]
- 44-** Taherpour A, Hashemi A. *Detection of OqxAB efflux pumps, OmpK35 and OmpK36 porins in extended-spectrum- β -lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates from Iran.* Hippokratia 2013; 17(4): 355-58. [Persian]
- 45-** Ashayeri-Panah M, Feizabadi MM, Eftekhar F. *Correlation of multi-drug resistance, integron and blaESBL gene carriage with genetic fingerprints of extended-spectrum β -lactamase producing Klebsiella pneumoniae.* Jundishapur J Microbio 2014; 7(2). [Persian]
- 46-** Peerayeh SN, Rostami E, Siadat SD, Derakhshan S. *High Rate of Aminoglycoside Resistance in CTX-M-15 Producing Klebsiella pneumoniae Isolates in Tehran, Iran.* Lab Med 2014; 45(3): 231-37. [Persian]
- 47-** Eftekhar F, Rastegar M, Golalipoor M, Mansoursamaei N. *Detection of Extended Spectrum B-Lactamases in Urinary Isolates of Klebsiella pneumoniae in relation to blaSHV, blaTEM and blaCTX-M gene carriage.* Iranian J Public Health 2012; 41(3): 127. [Persian]
- 48-** Shoeib N, Fereshteh S, Mehdi FM, Sadat NV, Leila N. *Molecular characterization of CTX-M β -lactamases among Klebsiella pneumoniae isolated from patients at Tehran hospitals.* Indian J Med Microbio 2011; 29(3): 254. [Persian]
- 49-** Feizabadi MM, Mahamadi-Yeganeh S, Mirsalehian A, Mirafshar SM, Mahboobi M, Nili F, et al. *Genetic characterization of ESBL producing strains of Klebsiella pneumoniae from Tehran hospitals.* J Infect Develop Countries 2010; 4(10): 609-15. [Persian]
- 50-** Ranjbar R, Ghazi FM, Farshad S, Giannanco GM, Aleo A, Owlia P, et al. *The occurrence of extended-spectrum β -lactamase producing Shigella spp in Tehran, Iran.* Iranian J Microbio 2013; 5(2): 108-12. [Persian]
- 51-** Hamidian M, Tajbakhsh M, Walther-Rasmussen J, Zali MR. *Emergence of extended-spectrum beta-lactamases in clinical isolates of Salmonella enterica in Tehran, Iran.* Jpn J Infect Dis 2009; 62(5): 368-71. [Persian]
- 52-** Hakemi Vala M, Hallajzadeh M, Hashemi A, Goudarzi H, Tarhani M, Sattarzadeh Tabrizi M, et al. *Detection of Ambler class A, B and D ss-lactamases among Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii clinical isolates from burn patients.* Ann Burns Fire Disasters 2014; 27(1): 8-13. [Persian]

- 53- Shahraki-Zahedani S, Moghadampour M, Bokaeian M, Ansari-Moghaddam A. *Prevalence of CTX-M-8 and CTX-M-15 type extended-spectrum beta-lactamases between Klebsiella pneumoniae spp. isolated from Zahedan, Southeast Iran.* J chemotherapy (Florence, Italy) 2015; 1973947815Y0000000008. [Persian]
- 54- Saeidi S, Boroujeni NA, Ahmadi H, Hassanshahian M. *Antibacterial Activity of Some Plant Extracts Against Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Isolates.* Jundishapur J Microbio 2015; 8(2). [Persian]
- 55- Bokaeian M, Zahedani SS, Bajgiran MS, Moghaddam AA. *Frequency of PER, VEB, SHV, TEM and CTX-M Genes in Resistant Strains of Pseudomonas aeruginosa Producing Extended Spectrum β-Lactamases.* Jundishapur J Microbio 2015; 8(1). [Persian]
- 56- Alizade H, Fallah F, Ghanbarpour RR, Aflatoonian M, Taherpour A, Sharifi H, et al. *Genotyping of ESBL Producing Uropathogenic and Diarrheagenic Escherichia coli in Southeast of Iran.* Infect Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Infectious Disorders) 2015; 15(2): 118-24. [Persian]
- 57- Moghaddam MN, Beidokhti MH, Jamehdar SA, Ghahraman M. *Genetic properties of blaCTX-M and blaPER β-lactamase genes in clinical isolates of Enterobacteriaceae by polymerase chain reaction.* Iranian J basic Med Sci 2014; 17(5): 378. [Persian]
- 58- Nakhaei MM, Forghanifard MM, Moshrefi S. *Prevalence and Molecular Characterization of Plasmid-mediated Extended-Spectrum β-Lactamase Genes (blaTEM, blaCTX and blaSHV) Among Urinary Escherichia coli Clinical Isolates in Mashhad, Iran.* Iranian J Basic Med Sci 2012; 15(3): 833-39. [Persian]
- 59- Afzali H, Firoozeh F, Amiri A, Moniri R, Zibaei M. *Characterization of CTX-M-Type Extend-Spectrum beta-Lactamase Producing Klebsiella spp. in Kashan, Iran.* Jundishapur J Microbio 2015; 8(10). [Persian]
- 60- Khoshvaght H, Hagh F, Zeighami H. *Extended spectrum betalactamase producing Enteroaggregative Escherichia coli from young children in Iran.* Gastroenterology and Hepatobed to bench 2014; 7(2): 131. [Persian]
- 61- Farshadzadeh Z, Khosravi AD, Alavi SM, Parhizgari N, Hoveizavi H. *Spread of extended-spectrum β-lactamase genes of bla OXA-10, bla PER-1 and bla CTX-M in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients.* Burns 2014; 40(8): 1575-80. [Persian]
- 62- Peymani A, Farivar TN, Sanikhani R, Javadi A, Najafipour R. *Emergence of TEM, SHV, and CTX-M-extended spectrum β-lactamases and Class 1 integron among Enterobacter cloacae isolates collected from hospitals of Tehran and Qazvin, Iran.* Microbial Drug Resistance 2014; 20(5): 424-30. [Persian]
- 63- Ghasemi Y, Archin T, Kargar M, Mohkam M. *A simple multiplex PCR for assessing prevalence of extended-spectrum β-lactamases producing Klebsiella pneumoniae in Intensive Care Units of a referral hospital in Shiraz, Iran.* Asian Pacific J Tropical Med 2013; 6(9): 703-08. [Persian]

- 64-** Ghorbani-Dalini S, Kargar M, Doosti A, Abbasi P, Sarshar M. *Molecular Epidemiology of ESBL Genes and Multi-Drug Resistance in Diarrheagenic Escherichia Coli Strains Isolated from Adults in Iran*. Iranian J pharmaceutical Res IJPR 2015; 14(4): 1257-62. [Persian]
- 65-** Ghafourian S, Sekawi Z, Neela V, Khosravi A, Rahbar M, Sadeghifard N. *Incidence of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in patients with urinary tract infection*. Sao Paulo Med J 2012; 130(1): 37-43. [Persian]
- 66-** Rezai MS, Salehifar E, Rafiei A, Langae T, Rafati M, Shafahi K, et al. *Characterization of Multidrug Resistant Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Escherichia coli among Uropathogens of Pediatrics in North of Iran*. Bio Med Res Inter 2015. [Persian]
- 67-** Doosti A, Pourabbas M, Arshi A, Chehelgerdi M, Kabiri H. *TEM and SHV Genes in Klebsiella pneumoniae Isolated from Cockroaches and Their Antimicrobial Resistance Pattern*. Osong public health and Res Perspectives 2015; 6(1): 3-8. [Persian]
- 68-** Gholipour A, Soleimani N, Shokri D, Mobasherizadeh S, Kardi M, Baradaran A. *Phenotypic and Molecular Characterization of Extended-Spectrum β-Lactamase Produced by Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae Isolates in an Educational Hospital*. Jundishapur J Microbio 2014; 7(10). [Persian]
- 69-** Kargar M, Kargar M, Jahromi MZ, Najafi A, Ghorbani-Dalini S. *Molecular detection of ESBLs production and antibiotic resistance patterns in Gram negative bacilli isolated from urinary tract infections*. Indian J Patho Microbio 2014; 57(2): 244. [Persian]
- 70-** Farajnia S, Azhari F, Alikhani MY, Hosseini MK, Peymani A, Sohrabi N. *Prevalence of PER and VEB type extended spectrum betalactamases among multidrug resistant Acinetobacter baumannii isolates in North-West of Iran*. Iranian J Basic Med Sci 2013; 16(6): 751-55. [Persian]
- 71-** Akhi MT, Khalili Y, Ghottaslou R, Aghazadeh M. *Prevalence of PER-1-type Extended-Spectrum Beta-Lactamaes in Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Tabriz, Iran*. Iranian J Basic Med Sci 2012; 15(1): 678. [Persian]
- 72-** Castanheira M, Farrell SE, Krause KM, Jones RN, Sader HS. *Contemporary diversity of β-lactamases among Enterobacteriaceae in the nine United States census regions and ceftazidime-avibactam activity tested against isolates producing the most prevalent β-lactamase groups*. Antimicrobial agents and chemotherapy 2013; AAC. 01896-13.
- 73-** Toussaint KA, Gallagher JC. *β-Lactam/β-Lactamase Inhibitor Combinations From Then to Now*. Ann Pharmacotherapy 2014; 1060028014556652.
- 74-** Gavin PJ, Suseno MT, Thomson RB, Gaydos JM, Pierson CL, Halstead DC, et al. *Clinical correlation of the CLSI susceptibility breakpoint for piperacillin-tazobactam against extended-spectrum-β-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella species*. Antimicrobial agents and chemotherapy 2006; 50(6): 2244-47.

- 75- Shiber S, Yahav D, Avni T, Leibovici L, Paul M. *β -Lactam/ β -lactamase inhibitors versus carbapenems for the treatment of sepsis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.* J Antimicrobial Chemotherapy 2015; 70(1): 41-7.
- 76- McLaughlin M, Advincula MR, Malczynski M, Qi C, Bolon M, Scheetz MH. *Correlations of antibiotic use and carbapenem resistance in enterobacteriaceae.* Antimicrobial agents and chemotherapy 2013; 57(10): 5131-33.
- 77- Livermore DM, Hope R, Mushtaq S, Warner M. *Orthodox and unorthodox clavulanate combinations against extended-spectrum β -lactamase producers.* Clinic Microbio Infect 2008; 14(s1): 189-93.
- 78- Sheng WH, Badal RE, Hseuh PR. *Distribution of Extended-spectrum β -lactamases (ESBLs), AmpC β -lactamases, and Carbapenemases among Enterobacteriaceae Isolates Causing Intra-abdominal Infections in Asia-Pacific: the Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART).* Antimicrobial agents and chemotherapy 2013; AAC. 00971-12.
- 79- Papp-Wallace KM, Winkler ML, Gatta JA, Taracila MA, Chilakala S, Xu Y, et al. *Reclaiming the Efficacy of β -Lactam- β -Lactamase Inhibitor Combinations: Avibactam Restores the Susceptibility of CMY-2-Producing Escherichia coli to Ceftazidime.* Antimicrobial agents and chemotherapy 2014; 58(8): 4290-97.
- 80- Dubée V, Bernut A, Cortes M, Lesne T, Dorchene D, Lefebvre A-L, et al. *β -Lactamase inhibition by avibactam in Mycobacterium abscessus.* J Antimicrobial Chemotherapy 2015; 70(4): 1051-58.
- 81- Castanheira M, Sader HS, Farrell DJ, Mendes RE, Jones RN. *Activity of ceftaroline-avibactam tested against Gram-negative organism populations, including strains expressing one or more β -lactamases and methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying various SCCmec types.* Antimicrobial agents and chemotherapy 2012; AAC 00817-12.
- 82- Zasowski EJ, Rybak JM, Rybak MJ. *The β -Lactams Strike Back: Ceftazidime-Avibactam.* Pharmacotherapy: J Human Pharmaco Drug Therapy 2015; 35(8): 755-70.
- 83- Aktaş Z, Kayacan C, Oncul O. *In vitro activity of avibactam (NXL104) in combination with β -lactams against Gram-negative bacteria, including OXA-48 β -lactamase-producing Klebsiella pneumoniae.* Inter J antimicrobial agents 2012; 39(1): 86-9.
- 84- Singh R, Kim A, Tanudra MA, Harris JJ, McLaughlin RE, Patey S, et al. *Pharmacokinetics/pharmacodynamics of a β -lactam and β -lactamase inhibitor combination: a novel approach for aztreonam/avibactam.* J Antimicrobial Chemotherapy 2015; 70(9): 2618-26.
- 85- Lucasti C, Hershberger E, Miller B, Yankelev S, Steenbergen J, Friedland I, et al. *Multicenter, double-blind, randomized, phase II trial to assess the safety and efficacy of ceftolozane-tazobactam plus metronidazole compared with meropenem in adult patients with complicated intra-abdominal infections.* Antimicrobial agents and chemotherapy 2014; 58(9): 5350-57.

- 86- Cho JC, Fiorenza MA, Estrada SJ. *Ceftolozane/Tazobactam: A Novel Cephalosporin/β-Lactamase Inhibitor Combination*. Pharmacotherapy: J Human Pharmaco Drug Therapy 2015; 35(7): 701-15.
- 87- Gholipourmalekabadi M, Bandehpour M, Mozafari M, Hashemi A, Ghanbarian H, Sameni M, et al. *Decellularized human amniotic membrane: more is needed for an efficient dressing for protection of burns against antibiotic-resistant bacteria isolated from burn patients*. Burns: J Inter Soc Burn Injuries 2015; 41(7): 1488-97. [Persian]
- 88- Cornaglia G, Giambellou H, Rossolini GM. *Metallo-beta-lactamases: a last frontier for beta-lactams?* Lancet Infect Dis 2011; 11(5): 381-93.
- 89- Hashemi A, Shams S, Barati M, Samedani A. *Antibacterial effects of methanolic extracts of Zataria multiflora, Myrtus communis and Peganum harmala on Pseudomonas aeruginosa producing ESBL*. Arak Med Univ J 2011; 14(4): 104-12. [Persian]
- 90- Fallah F, Taherpour A, Borhan RS, Hashemi A, Habibi M, Nia RS. *Evaluation of Zataria MultiFlora Boiss and Carum copticum antibacterial activity on IMP-type metallo-beta-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa*. Ann burns and fire disasters 2013; 26(4): 193-98. [Persian]
- 91- Hashemi A, Shams S, Kalantar D, Taherpour A, Barati M. *Antibacterial effect of Methanolic extract of Camellia Sinensis L. on Pseudomonas aeruginosa strains producing β-lactamases*. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14(1): 136-42. [Persian]

REVIEW ARTICLE

***β-Lactam-β-lactamase Inhibitor Combination against
ESBL-Producing Enterobacteriaceae***

Ali Hashemi (PhD)^{*1}

¹ Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Received: 25 Dec 2015

Accepted: 28 Apr 2016

Abstract

In the last decades, Extended-Spectrum- β -Lactamases (ESBLs) in gram negative bacilli have appeared as a significant mechanism of resistance to antibiotics. Although resistance to carbapenems is increasing among bacteria, they are still the treatment of choice for serious infections caused by ESBL producers. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effect of β -lactam- β -lactamase inhibitor combination against ESBL-producing Enterobacteriaceae.

This is a review study. The PubMed and google scholar databases were searched using the following keywords: β -lactams and beta-lactamase inhibitors, Extended-Spectrum- β -Lactamases, Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and beta-lactamase genes in the time interval from 2008 to 2015. Overall, Ninety one papers were found and included in this study.

The results of the study revealed that the use of beta-lactamase inhibitors in combination with beta-lactam antibiotics is currently the most successful strategy for infections caused by extended-spectrum β -lactamase producers.

Keywords: β -Lactam- β -Lactamase Inhibitor; Extended-Spectrum β -Lactamase; Enterobacteriaceae; Carbapenem

This paper should be cited as:

Ali Hashemi. *β -lactam- β -lactamase inhibitor combination against esbl-producing enterobacteriaceae.* J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2016; 24(2): 185-200.

***Corresponding author:** Tel: 09122947439, email: hashemi1388@yahoo.com