

# بررسی اثر انار و ترکیبات آن بر سرطان سینه: مقاله مروری

زهراء اسماعیلی نژاد<sup>۱</sup>، رضا براتی بلداجی<sup>۲\*</sup>

## مقاله مروری

مقدمه: میوه انار منبع غنی از فیتوکمیکال‌ها با اثرات آنتی‌اکسیدانی بسیار بالاست، که دارای اثرات درمانی گسترده در طب سنتی و مدرن است و در پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، چاقی، بیماری‌های التهابی، بیماری‌های عفونی و میکروبی، اختلالات عصبی و ایمنی موثر است. امروزه نقش انار در مراحل مختلف سرطان نیز اثبات شده است و از آنجایی که سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها بین خانم‌ها می‌باشد، در این مطالعه به بررسی اثر انار در سرطان سینه می‌پردازیم. مطالب استفاده شده از پایگاه اطلاع داده PubMed به صورت گزینشی با استفاده از کلید واژه‌های "Punica grantum" یا "Pomegranate" و "breast cancer" استخراج شده‌اند. مطالعات بررسی شده نشان داده‌اند که ترکیبات موجود در انار می‌توانند از مسیرهای متفاوت بر مراحل مختلف سرطان اثر بگذارند از جمله: مهار آروماتازها و مهار آنزیم‌های سیکلواکسیژناز، اثر بر پروتئین‌های شوک حرارتی، فاکتور رونویسی زیپ پایه لوسین و فاکتورهای رونویسی از پروتئین‌های خاص و چرخه سلولی. همچنین در برخی مطالعات نشان داده شده است که ترکیبات انار می‌توانند از طریق فعالیت ضداستروژنی و استروژنی، تاثیر بر ۲۷-هیدروکسی کلسترون، تغییر در گیرنده‌های استروژن<sup>۱</sup> و <sup>۲</sup>، مسیر پیام‌رسانی Wnt /  $\beta$ -catenin، چسبندگی و مهاجرت سلول‌های سرطانی، اثر بر سیتوکروم p450، مسیر آبشار کاسپاز، آپوپتوز و مسیرهای دیگر بر مراحل مختلف سرطان اثر بگذارند.

واژه‌های کلیدی: نئوپلاسم، یونیکا، متاستاز، آپوپتوز

ارجاع: اسماعیلی نژاد زهرا، براتی رضا. بررسی اثر انار و ترکیبات آن بر سرطان سینه: مقاله مروری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید

صدوقی یزد ۱۳۹۸؛ ۲۵(۸): ۲۷-۴۱۸.

۱- کارشناس، پژوهشی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

۲- کارشناس، پژوهشی، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

\*(نویسنده مسئول): تلفن: ۰۹۱۳۲۸۰۷۸۵۰، پست الکترونیکی: reza93barati@gmail.com کد پستی: ۷۱۹۳۶۳۵۸۹۹

## مقدمه

### سرطان سینه

سرطان سینه و سایر انواع سرطان می‌شود و همچنین تخمین زده شده است که بیش از ۲۰٪ سرطان‌ها با مصرف میوه و سبزی از بین می‌روند، این مطلب نشان می‌دهد که فیتوکمیکال‌های میوه‌ها و سبزیجات باعث جلوگیری از شروع و پیشرفت سرطان با تاثیر بر راه‌های بیوشیمیایی و مولکولی می‌شوند. از ویژگی‌های مثبت فیتوکمیکال‌ها می‌توان به دسترسی آسان، قیمت ارزان و عدم وجود اثرات سمی در آن‌ها اشاره کرد (۱۰).

### انار

انار میوه بومی مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در خاورمیانه و هند می‌باشد، و از لحاظ تجربی، برای قرن‌ها کاربرد دارویی داشته است (۱۱) و دارای کاربردهای گسترده‌ای در طب سنتی و مدرن است (۱۲). فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا از قسمت‌های مختلف انار مانند آب، پوست و دانه‌ها مشخص شده‌اند. این فعالیت آنتی‌اکسیدانی به مقدار زیاد ترکیبات فنلی مرتبط است شامل: آنتوسیانیدین‌ها (۳-گلوكوزاید و ۵-۳ دی‌گلوكوزاید از دلفینیدین، سیانیدین، پلارگونیدین)، الاجیک‌اسید، پونیکالین، پونیکالاجین، پدانکولاجین و فلاونول‌های متفاوت (۱۴). آب انار منبع خوبی از فروکتوز، ساکارز و گلوكز است. همچنین بعضی از اسیدهای ارگانیک ساده مثل اسیداسکوربیک، سیتریک‌اسید، فوماریک‌اسید و مالیک‌اسید را دارد. علاوه بر این شامل مقدار کمی آمینواسید به ویژه پرولین، متیونین و والین می‌باشد (۱۵). انار به دلیل وجود این ترکیبات در پیشگیری یا درمان بسیاری از بیماری‌ها مثل سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، چاقی، بیماری‌های التهابی، بیماری‌های عفونی و میکروبی، اختلالات عصبی و ایمنی، التهاب، زخم و آرتریت نقش دارد. بر اساس مطالعات پیشین و بالینی که توسط آزمایشگاه‌های مختلف در سراسر جهان انجام شده است، نمونه‌های مشتق شده از انار از قبیل آب، عصاره‌ها و فیتوکمیکال‌ها اثرات پیشگیرانه و درمانی بر روی سرطان کولون، کبد، ریه، پروستات و پوست را نشان داده‌اند (۱۶، ۱۷).

تحقیقات نشان داده‌اند که اثرات درمانی انار در سرطان سینه،

بر طبق معیارهای WHO شیوع جهانی سرطان در حال رشد، سریع و هشداردهنده می‌باشد (۱). ولی اتیولوژی کامل سرطان هنوز ناشناخته باقی مانده است. سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران استو یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها بین زنان، سرطان سینه می‌باشد (۲، ۳). شیوع سرطان سینه در بین خانم‌ها در ایران ۳۲٪ و در آمریکا ۱۲/۵٪ گزارش شده است (۴). عوامل خطر سرطان سینه عبارتند از: سن، سابقه خانوادگی و اختلالات ژنتیکی، مانند جهش در ژن‌های سرکوب کننده تومور. سایر عوامل خطر مرتبط با هورمون‌ها می‌باشد، از جمله سن ابتلا به مnarک، شروع زودرس پائسگی، زایمان زودرس، ناباروری و استفاده از داروهای ضدبارداری خوراکی و هورمونی می‌باشد. علاوه بر این، عوامل مرتبط با سبک زندگی مانند مصرف الکل، چاقی و شرایط بیماری (مانند دیابت) نیز به بروز سرطان کمک می‌کنند (۵). به‌طور کلی قرار گرفتن در معرض میزان بالای استروژن درون‌زا یا خارجی، به عنوان مهم‌ترین عامل خطر در توسعه سرطان سینه پذیرفته شده است (۶). مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهند که افزایش سطح سرمی E1 و E2 پس از پائسگی به‌طور قابل توجهی باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه می‌شود (۷).

عوامل شیمی‌درمانی، تاموکسیفن و رالوکسیفن خطر ابتلا به سرطان سینه با گیرنده مثبت استروژن را در ۵۰ درصد زنان پر خطر کاهش می‌دهند، اما مatasفانه استفاده از آن‌ها با عوارض جانی عمده همراه است، از جمله این‌که بر اندومتر رحم اثر می‌گذارند و ممکن است باعث سرطان اندومتر نیز بشوند. علاوه بر این، از سرطان سینه با گیرنده منفی استروژن جلوگیری نمی‌کنند. در طول دهه گذشته، استفاده از محصولات طبیعی مشتق شده از گیاهان برای پیشگیری و درمان سرطان در ایالات متحده افزایش یافته است (۸، ۹). رژیم غنی از میوه‌ها و سبزیجات باعث کاهش ریسک ابتلا به

داده شده است که آمینوگلوتیمید (یک مهارکننده آروماتاز شناخته شده) با دوز ۱۰۰ میلیمول در لیتر تقریباً ۶۵٪ فعالیت آروماتازرا مهار می‌کند، در حالی که داده‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که آب انار تخمیر شده و پلی فنول‌های آن به ترتیب ۶۰ و ۸۰ درصد قدرت مهارکننگی آروماتاز را دارند (۲۰). همچنین نشان داده شده فلاونوئیدهای موجود در انار (مانند لوئولین، کومسترول، کومپفرل) به طور رقابتی باعث مهار آروماتاز در یک سیستم کشت سلولیانسانی می‌شوند (۲۱). ترکیبات مشتق شده از الاجیتانین شامل: UB-UBS ، MUB methylated-UBurolithin B MUA و UA urolithin AsulfateAUB acetylated-UB acetylated-MUA فعالیت ضد آروماتاز قابل توجهی را نشان داده‌اند که در این بین، یوروولايتین B بیشترین فعالیت آنتیآروماتازی را از خود نشان داده است که ممکن است به دلیل جذب بهتر آن در سلول باشد. البته واضح است که ترکیب مجموع این ترکیبات اثر بهتری نسبت به استفاده از یک ترکیب منفرد دارد (۱۹).

#### مهار سیکلواکسیژنаз

خانواده آنزیم‌های COX Cyclooxygenase در سنتز پروستاگلاندین‌ها (PG) از جمله PGE<sub>n</sub> نقش دارند و دارای دو خانواده COX-1 و COX-2 می‌باشند. COX-1 در اکثر سلول‌ها بیان می‌شود، در حالی که بیان COX-2 از طریق محرك‌های مختلف، از جمله استرس، سیتوکین‌ها، فاکتورهای رشد و انکوژن‌ها به وجود می‌آید. پروستاگلاندین‌های تولید شده توسط COX-2 در مراحل مختلف ایجاد سرطان، از جمله تکثیر، موتاژن، فرار از آپوپتوز، سرکوب ایمنی، آنژیوژن و تهاجم نقش دارند. بنابراین مهار COX-2 باعث کاهش ترومای سلولی تومور سینه می‌شود (۱۶). پونیکیک اسید و الاجیک اسید که از اجزاء انار هستند، در تنظیم فعالیت آنزیم COX2 دخیل هستند. الاجیک اسید باعث مهار آپوپتوز، فعال‌سازی مسیرهای التهابی و آنژیوژن می‌شود. علاوه بر این نشان داده شده است که، پرودلفینیدین prodelphinidin جدا شده از توت سیاه، مانع از تولید COX و پروستاگلاندین می‌شود، بنابراین با توجه به این که

در مقایسه با تاموکسیفین و استرادیول قبل‌ملاحظه است (۱۷). مطالعات نشان داده‌اند که عصاره انار و اجزای آن، به صورت جداگانه و یا به صورت ترکیبی، می‌تواند پروتئین‌ها و ژن‌های کلیدی در سرطان سینه را تنظیم و هدف‌گذاری کند و باعث کاهش تکثیر در سرطان سینه شود (۱۸). عصاره میوه انار می‌تواند با جایگزین شدن و یا اضافه شدن به تنظیم‌کننده (SERM Selective estrogen receptor modulator) که برای جلوگیری از سرطان سینه می‌باشد، از سرطان پیشگیری کند (۹، ۸). الاجیتانین که از اجزاء انار است، در دستگاه گوارش هیدرولیز می‌شود و ترکیبات مختلف از جمله الاجیک اسید را به وجود می‌آورد که hydroxy-6H-benzopyran-6-one و یوروولايتین (UA) A تبدیل می‌شود. این دو ترکیب باعث مهار رشد سلول‌های سرطان سینه و پروستات می‌شوند. مطالعات اخیر نیز نشان داده‌اند که یوروولايتین A و B دارای اثرات استروژنی و ضد استروژنی در سلول‌های سرطانی سینه انسان هستند و بنابراین ممکن است دارای ویژگی‌های شبیه SERM باشند (۱۹).

#### روش بررسی

مطلوب استفاده شده برگرفته از مقاله ای هستند که به شرح مکانیسم اثر انار در سرطان سینه پرداخته‌اند. مطالعه در پایگاه اطلاع داده PubMed با استفاده از کلید واژه‌های "breast cancer" و "Punica grantum" یا "pomegranate" و "breast neoplasm" ۱۷ مقاله به صورت گزینشی انتخاب شدند. مقالات استفاده شده، از مقالات منتشر شده بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ می‌باشد و سعی شده که از مقالات جدیدتر بهره‌گیری شود.

#### بحث

نقش اجزاء مختلف انار در درمان و پیشگیری از سرطان سینه:

#### مهار آروماتازها

کیم و همکاران گزارش دادند که آب انار تخمیر شده و پلی‌فنلهای تخمیر نشده که از پوست انار استخراج می‌شوند، به صورت قابل توجهی فعالیت آروماتاز رامهار می‌کنند. نشان

مستقیم در تسریع روند تکثیر سلول‌های تومور دخالت دارند. همچنین ثابت شده است که HSP90 باعث تنظیم بیان و عملکرد انواع عوامل تولیدکننده پاتوکارسینوژن می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مهار HSP یک رویکرد مناسب است که احتمالاً منجر به کاهش بالقوه در استرس التهابی می‌شود و بنابراین یک روش ایده آل برای کاهش بروز سرطان است. درمان با امولسیون انار بهمنظور سرکوب پروتئین‌های بیش تنظیم شده HSP70 و HSP90، کاهش قابل ملاحظه‌ای از وضعیت استرس‌زاوی مبتنی بر التهاب را نشان داده است.<sup>(۲۵)</sup>

#### تأثیر بر سایر مسیرهای التهابی

فاکتور رونویسی زیپ پایه لوسین (Nrf2)، نقش مهمی در محافظت از سلول‌های سینه در برابر آسیب‌های ناشی از التهاب و استرس اکسیداتیو دارد. تحت شرایط نرمال سلولی، Kelch-like ECH-associated protein Nrf2 در ارتباط با Keap1 است. پس از استرس سلولی، Nrf2 از Keap1 می‌شود، به هسته وارد می‌شود، و به عنوان یک عنصر پاسخ دهنده آنتی‌اکسیدانی شناخته می‌شود و رونویسی ژن‌های فراوانی را تسهیل می‌کند که آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و سمزدایی را رمزگذاری می‌کنند. مسیر پیام‌رانی Nrf2 عمیقاً در تنظیم التهاب و سرطان‌زاوی مرتبط با التهاب دخیل است و بر این اساس این مسیر حاوی هدف مهم پیشگیری از سرطان مربوط به التهاب است. نشان داده شده است که درمان با امولسیون انادر تقویت بیان و همچنین انتقال هسته‌ای Nrf2 مؤثر است که به نوبه خود باعث کاهش فعالیت التهابی ناشی از NF-κB می‌شود و در نهایت منجر به پیشگیری از سرطان سینه می‌شود. با این حال، توجه به جنبه دیگری از القاء Nrf2 قابل توجه است که بیان پایدار Nrf2 موجب افزایش مقاومت سلول‌های سرطانی به عوامل شیمی‌درمانی، از جمله سیسپلاتین Cisplatin و دوکسوروبیسین Doxorubicin می‌شود. افزایش Nrf2 ناشی از درمان با امولسیون انار، می‌تواند برای جلوگیری از التهاب ناشی از سرطان مفید باشد، اما می‌تواند نتیجه درمانی بیماران

دلفینیدین delphinidin در انار نیز وجود دارد ممکن است پاسخ‌های التهابی را مهار کند (۲۲، ۲۳). تعدادی دیگر از اجزای انار، مانند اسیدگالیک و پونیکالاجین A و B، باعث مهار تولید PGE2 ناشی از لیپوپلی ساکارید، اکسیدنیتریک و اینترولوکین-۱۶ می‌شوند (۱۶). Shukla و همکاران گزارش کردند که در خرگوش‌ها پس از خوردن عصاره میوه انار فعالیت آنزیم‌های COX-1 و COX-2 مهار شده نشان می‌دهد، پس از مصرف انار متابولیت‌های انار موجود در خون، اثرات فیزیولوژیک قابل اندازه‌گیری دارند (۲۴).

#### تأثیر بر پروتئین‌های شوک حرارتی

پروتئین‌های شوک حرارت (HSP)، پروتئین‌های قابل تحمل در برابر استرس هستند که نقش مهمی در پاسخ استرس سلولی دارند. چند خانواده اصلی HSP در انسان وجود دارد، مانند HSP40، HSP70، HSP90، HSP60/HSP10، HSP110. بر اساس گزارش‌های علمی، HSP90 می‌تواند رویدادهای التهابی را از طریق تنظیم سیتوکین‌های مختلف و مسیرهای پیام‌رانی سلول تنظیم کند. در حال حاضر بررسی اثربخشی مهارکننده‌های مختلف HSP90 در درمان بسیاری از بیماری‌های انکولوژیک، از جمله سرطان سینه در حال انجام است. در تحقیقات انجام گرفته بیان بالایی از HSP90 در بخش‌های تومور نشان داده شده و مشخص شده که سرطان ممکن است به دلیل شرایط التهابی باعث القا پروتئین‌های شوک حرارتی شود و منجر به تکثیر نامنظم و فرار از آپوپتوز HSP90 شود. نتایج یک مطالعه، کاهش قابل توجهی را در بیان در گروه دریافت‌کننده‌ها امولسیون انار نشان داد، که نشان دهنده خاصیت انار برای از بین بردن رشد سلول‌های تومور سینه از طریق کاهش HSP90 است که ممکن است با مقدار کمتر استرس التهابی نیز مرتبط باشد (۱۶). مطالعات متعدد نشان داده اند که HSP‌ها در طول پیشرفت در مدولاسیون عملکرد p53، پیشرفت چرخه سلولی و آپوپتوز سرطان نقش دارند. دو عامل مهم در توسعه و پیشرفت تومور، HSP70 و HSP90 هستند. نشان داده شده است که سلول‌های بدخیم در سرطان کبد بیش از حد HSP70 را منتشر می‌کنند و به طور

تاثیر بر ۲۷-هیدروکسی کلسترول و تغییر در Era و ERb اخیراً با شناسایی یکی از مشتقات کلسترول به نام ۲۷ هیدروکسی کلسترول که یک تنظیم‌کننده انتخابی گیرنده استروژن (SERM) اندوژنیک است و می‌تواند از طریق مکانسیم حد واسطه گیرنده استروژن فعالیت کند، ارتباط بین پاقی و سرطان سینه مشخص شده است. ۲۷-هیدروکسی کلسترول می‌تواند منجر به تغییر در گیرنده استروژن  $\alpha$  و  $\beta$  شود و آن را از E217- $\beta$ -estradiol و دیگر تنظیم‌کننده‌های انتخابی گیرنده استروژن متایز کند و باعث فعالیت تکثیری در سلول‌های سرطان سینه شود. به علاوه ۲۷ هیدروکسی کلسترول باعث رشد بیش از حد وابسته به گیرنده استروژن و متاستاز در موش‌های مبتلا به سرطان سینه می‌شود. گزارش شده است که این تنظیم‌کننده‌های انتخابی گیرنده استروژن درون‌زا، اثرات مخرب شامل مهار اثر محافظتی از استرادیول در بیماری‌های قلبی عروقی، ترویج آترواسکلروز، تنظیم منفی هموستانز استخوان و همچنین القاء و ترویج سرطان سینه دارد. مطالعات نشان دادند که عصاره انار می‌تواند به عنوان تنظیم‌کننده‌های انتخابی گیرنده استروژن عمل کند، به گیرنده استروژن باند شود و کملپکس لیگاند-گیرنده را به عناصر پاسخ‌دهنده به گیرنده استروژن جابه‌جا کند و باعث تنظیم کاهشی فاکتورهای رونویسی حد واسطه گیرنده استروژن در سرطان سینه شود. همچنین عصاره انار می‌تواند مانع تکثیر ۲۷ هیدروکسی کلسترول شود و بیان ژن‌های افزاینده ۲۷-هیدروکسی کلسترول را کاهش دهد. طبق نتایج مطالعات واضح است که انار و ۲۷ هیدروکسی کلسترول بر سر باند شدن به گیرنده استروژن  $\alpha$  با استرادیول رقابت می‌کنند. بنابراین عصاره انار با رقابت با ۲۷ هیدروکسی کلسترول می‌تواند باعث کاهش اثرات تکثیری ۲۷ هیدروکسی کلسترول در رده سلولی سلول‌های سرطان سینه شود. پس می‌تواند باعث مهار تکثیر سلولی و کاهش اثرات تکثیری استرادیول شود. به طور کلی یافته‌های این مطالعه نشان داد که که عصاره انار به گیرنده استروژن متصل می‌شود و باعث تنظیم کاهشی فاکتورهای حد واسطه رونویسی عنصر پاسخ‌دهنده به استروژن در

درمان شده با داروهای شیمی‌درمانی را به خطر بیندازد (۱۶). فاکتورهای رونویسی از پروتئین‌های خاص (Sp, specificity protein transcription factors) رونویسی هستند که به طور گستردگی در تومورها به میزان بیش از حد بیان می‌شوند و ژن‌های مورد نیاز برای تکثیر سلولی، بقا و آنتی‌بیوتیک را تنظیم می‌کنند. در یک مطالعه نشان داده شد که عصاره انار باعث کاهش رونویسی از ژن‌های Sp1 و Sp3 و Sp4 و همچنین باعث کاهش ژن‌های کنترل شده با Sp در گیرنده استروژن می‌شوند. در یک مطالعه VEGF، bcl2 B-cell lymphoma 2, cyclin D1، Vascular endothelial growth factor (VEGFR-1) و NF- $\kappa$ B می‌شود. در سلول‌های سرطانی miR-27a می‌باشد. انار می‌تواند به طور قابل توجه در سلول‌های سرطانی سینه کاهش دهد و باعث تنظیم افزایشی ژن ZBTB10 (پروتئینی سرکوب کننده Sp) در سلول‌های سرطانی شود که در نهایت باعث تنظیم غلاظت NF- $\kappa$ B و ژن‌های دخیل در آنتی‌بیوتیک می‌شود (۲۶).

### فعالیت ضداستروژنی و استروژنی

یک مطالعه با هدف بررسی اثر مصرف آب انار بر سطح استرادیول، استرون، تستوسترون، اندروستن‌دیون و گلوبولین متصل شونده به هورمون‌های جنسی در زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه انجام شد. در این کارآزمایی بالینی افراد براي مدت ۳ هفته، به صورت روزانه ۸ اونس آب انار دریافت می‌کردند در حالی که افراد در گروه کنترل آب سیب دریافت می‌کردند. بعد از ۳ هفته مداخله هیچ کاهش قابل توجهی در گلوبولین متصل شونده به هورمون‌های جنسی در گروه مداخله نسبت به کنترل مشاهده نشد. ولی کاهش قابل توجه استرون و تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (۲۷). همچنین نشان داده شده که بیورولیتین به عنوان یک مولکول بیواکتیو موجود در انار، می‌تواند به گیرنده استروژن باند شود و فعالیت استروژنی و ضداستروژنی در سلول‌های سرطان سینه داشته باشد (۲۸).

در انتقال پیام، چسبندگی سلولی و تنظیم بیان ژن سلول دارد. در غیاب پیام Wnt،  $\beta$ -catenin به یک کمپلکس چند adenomatous پروتئین متصل می‌شود که شامل Axin، polyposis coli، کارزین کیناز-1-a و گلیکوزن سینتاز کیناز است که فسفوریلاسیون، یوبیکوئینه شدن و تخریب آن‌ها را با پروتئازوم تسهیل می‌کند. در حضور پیام Wnt، تخریب این مجموعه، غیرفعال شده، که منجر به ثبت و تجمع  $\beta$ -catenin در سیتوپلاسم می‌شود. در نتیجه،  $\beta$ -catenin به هسته انتقال می‌یابد و به فاکتور سلول‌های T/فاکتور T-cell factor/lymphoid-enhancer ارتقاده‌نده لنفوییدها متصل می‌شود و در نتیجه آن منجر به فعال شدن cyclin D1، c-myc، RONویسی از ژن‌های مختلف هدف مانند matrixmetalloproteinase 7 و فاکتور رشد اندوتیال عروقی  $\beta$ -catenin در هسته و یا سیتوپلاسم در نمونه‌های سرطان انسانی مشاهده شده است و به نظر می‌رسد با پیش‌آگهی ضعیف همراه باشد. جالب توجه است که در نمونه‌های انسانی سرطان سینه تنظیمات هسته‌ای و یا سیتوپلاسمی  $\beta$ -catenin با بیان ژن هدف خود یعنی cyclinD1 هم بسته است. فعال شدن مسیر Wnt/ $\beta$ -catenin ممکن است یک رویداد زودهنگام در سرطان سینه در انسان باشد. نتایج یک مطالعه نشان داد که درمان با امولسیون انار باعث لغو پیام‌سانی Wnt  $\beta$ -catenin / می‌شود که نشان دهنده کاهش بیان هسته‌ای و سیتوزولی است. به نظر می‌رسد مکانیسم احتمالی امولسیون انار در مهار تکثیر سلولی و تشديد آپوپتوز در تومور سینه در موش‌های صحرایی سرکوب پیام‌سانی  $\beta$ -catenin باشد. میزان پروتئین cyclin D1 در بیش از ۵۰ درصد سرطان‌های سینه افزایش یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ممکن است cyclin D1 به عنوان یک هدف بالقوه برای ترکیبات فعال انار در جهت پیشگیری از سرطان سینه باشد. از آنجایی که cyclin D1 یک ژن تنظیم شده با  $\beta$ -catenin می‌باشد و امولسیون انار به همان شیوه  $\beta$ -catenin باعث تنظیم کاهشی Cyclin D1 می‌شود، مطالعات تداخل پیام

سلول‌های سرطانی سینه، بدون اثرات آگوئنیستی در آندومتر رحم می‌شود و همچنین بر بیماری قلبی عروقی اثرات قابل مقایسه‌ای نسبت به ۱۷- بتا استرادیول دارد. این یافته‌ها نشان دهنده توانایی عصاره انار در جلوگیری از فعالیت ۲۷- هیدروکسی کلسترون است. به عبارتی عصاره انار می‌تواند با ۲۷- هیدروکسی کلسترون برای گیرنده استروژن  $\alpha$  رقابت کند و از تکثیر ایجاد شده توسط ۲۷- هیدروکسی کلسترون جلوگیری کند (۱۷). استروژن اثر خود را در بافت هدف از طریق تعامل با دو عضو مختلف از خانواده گیرنده هسته‌ای از عوامل رونویسی تنظیم شده توسط هورمون، به نام گیرنده استروژن  $\alpha$  و گیرنده استروژن  $\beta$  انجام می‌دهد. پس از اتصال هورمون به این گیرنده‌ها، کمپلکس گیرنده- هورمون با سلول‌های خاصی در DNA به نام عناصر پاسخ دهنده به استروژن و یا با سایر عوامل رونویسی واکنش می‌دهد که برای تنظیم رونویسی ژن هدف به کار می‌رود. تنظیم کننده‌های انتخابی گیرنده استروژن به گیرنده استروژن باند می‌شوند و عمل آگوئنیست استروژن را در بعضی از بافت‌های هدف و عمل آن‌آگوئنیستی استروژن را در سایر بافت‌ها اعمال می‌کنند. ژن‌هایی که توسط تنظیم کننده‌های انتخابی گیرنده استروژن با گیرنده استروژن  $\alpha$  تنظیم می‌شوند، متفاوت از آن‌هایی است که با گیرنده استروژن  $\beta$  تنظیم می‌شوند.

گیرنده استروژن  $\alpha$  باعث افزایش تکثیر در سلول‌های سلطان سینه و گیرنده استروژن  $\beta$  باعث سرکوب تومور می‌شود. نشان داده شده است که عصاره انار فعالیت رونویسی وابسته به استروژن گیرنده استروژن  $\alpha$  را به صورت وابسته به دوز مهار می‌کند. عصاره انار به گیرنده استروژن متصل می‌شود، کمپلکس گیرنده لیگاند را به هسته منتقل می‌کند و رونویسی عناصر پاسخ دهنده به استروژن را در سلول‌های سلطانی سینه بدون اثر بر اندومتر رحم کاهش می‌دهد و دارای اثر محافظتی، قلب دار مقابله با E2 است (۹).

### مسیر پیام رسانی Wnt/β-catenin

مسیر پیامرسانی Wnt/β-catenin یا Wnt نقش مهمی در توسعه ژن سرطان سینه و همچنین تومورزایی بهدلیل دخالت

Wnt/β-catenin توسط امولوسیون انار را در حین سرطان در موش صحرابی تأیید می‌کنند (۶).

### چسبندگی و مهاجرت سلول‌های سرطانی

از دست دادن چسبندگی، افزایش مهاجرت و کمotaکسیک به عنوان ویژگی عمدۀ متاستاز شناخته می‌شود. مطالعه‌ای با هدف بررسی اثر آب انار بر متاستاز در سرطان سینه انجام شد که نتایج آن نشان داد آب انار یا مجموعه ترکیبات آن (الاجیک‌اسید، پونیکیک‌اسید و لوئولین) علاوه بر مهار رشد سلول‌های سرطان سینه، باعث افزایش چسبندگی سلول‌های سرطان سینه و کاهش مهاجرت آن‌ها می‌شود اما بر سلول‌های سالم اثری ندارد. همچنین این درمان باعث مهار کمotaکسیک‌های سرطان می‌شود. در این مطالعه این فرضیه شکل گرفت که احتمالاً آب انار و ترکیبات گفته شده باعث افزایش بیان ژن چسبندگی سلول‌های سرطانی و مهار ژن‌های تحریک کننده مهاجرت و مهار کمotaکسیک می‌شود.

آب انار باعث تحریک ICAM-1 intercellular adhesion molecule-1 (فاکتور دخیل در چسبندگی سلول‌ها) و MARCKS myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate (پروتئین اتصال دهنده مرتبط با غشای پلاسمایی که در چسبندگی دخیل است) می‌شود. همچنین باعث افزایش Hyaluronan-mediated motility بیان (پروتئین محلول که باعث تغییر رفتارهای مهاجرتی سلول می‌شود). این گیرنده به هیالورونان باند می‌شود و باعث فعال شدن مسیر انتقال پیام ROCK RhoA activated protein kinase (یک فاکتور کلیدی در تنظیم مهاجرت سلول‌ها)، می‌شود. آب انار همچنین باعث تنظیم کاهشی nexillin anillin (پروتئین‌های اتصال دهنده اکتین که در تنظیم ساختار اسکلت سلولی دخیل هستند)، می‌شود. به علاوه باعث تنظیم کاهشی N-chimearin GTPase که باعث افزایش مهاجرت می‌شود، و همچنین تنظیم کاهشی TWIST فاکتور رونویسی که باعث کاهش چسبندگی و افزایش تحرک سلول می‌شود (۳).

### اثر بر سیتوکروم p450

آنژیم‌های سیتوکروم p450 در متابولیسم داروها و زنوبیوتیک‌ها دخیل هستند. در یک مطالعه با هدف بررسی اثر آب انار بر بیان و فعالیت سیتوکروم‌ها در موش، به مدت ۴ هفته به موش‌ها آب انارداده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف آب انار به مدت ۴ هفته باعث کاهش محتوای CYP3A Cytochrome CYP1A2 و بیان P450, family 3, subfamily A شد که آب انار از طریق فعالیت بازدارنده‌ی پروکارسینوژن‌ها (مهار فعالیت و بیان سیتوکروم‌ها بر شروع، پیشرفت و گسترش سرطان) موثر است. مطالعات دیگر هم نشان داده‌اند که به طور مثال یورولیتین باعث کاهش فعالیت و بیان سیتوکروم p450 ویژه تومور، در فعال‌سازی تعدادی از عوامل سرطانزا و در متابولیسم هورمون‌های استروئیدی نقش دارد. این پروتئین باعث تشکیل 4-هیدروکسی‌استرادیول که ماده‌ای سرطانزا بوده و فعالیت استروژنی چشمگیری دارد می‌شود CYP1B1 در سلول‌های 22Rv1 سرطانی پروسسات می‌شود (۲۹-۳۱).

### مسیر آبشار کاسپاز

فعال‌سازی اعضای خانواده پروآپوپتوزی Bax، Bcl2، مانند Bad، آپوپتوز را با ایجاد حفره‌های غشایی میتوکندری تحریک می‌کند و موجب انتشار سیتوکرومC می‌شود که به فاکتور فعال‌کننده پروتئاز ۱ و سپس به پروکاسپاز ۹ متصل می‌شود تا یک پروتئین پیچیده به نام آپوپتوزوم ایجاد کند. آپوپتوزوم، پروکاسپاز ۹ را به شکل فعال آن یعنی کاسپاز ۹ تبدیل می‌کند که به نوبه خود کاسپاز-۳ را فعال می‌کند. کاسپاز ۷ یکی دیگر از اپراتورهای پایین‌دست است که توسط هر دو مسیر گیرنده مرگ (بیرونی) و مسیرهای واسطه میتوکندری (ذاتی) فعال می‌شود. فعال‌شدن کاسپاز ۳ و کاسپاز ۷ در نهایت منجر به آپوپتوز می‌شوند. بیان بیش از حد Bcl2 از طریق سرکوب آپوپتوز باعث افزایش بقای سلول می‌شود، در حالی که افزایش بیان Bax باعث افزایش سرعت آپوپتوز می‌شود. افزایش نسبت Bax/Bcl2 به عنوان یک شاخص قابل اطمینان از میل کلی سلولی به انجام آپوپتوز در

نوترکیب می‌شود و سلول‌ها را به شکست دو رشته DNA، مهار رشد و آپوپتوز حساس می‌کند. از آن جایی که همولوگ نوترکیب نشان‌دهنده یک هدف جدید برای درمان سرطان است، تنظیم کاهشی همولوگ نوترکیب با عصاره انار می‌تواند برای حساسیت تومورها به داروهای ضد سرطان مورد استفاده قرار گیرد (۳۲).

### نتیجه‌گیری

به طور کلی نتایج مطالعات بررسی شده نشان داده‌اند که ترکیبات مختلف موجود در انار می‌تواند از طریق مهار آروماتازها، اثر بر مراحل مختلف چرخه سلولی، فعالیت ضداستروژنی و استروژنی، تاثیر بر ۲۷-هیدروکسی‌کلسترول و Wnt تغییر در گیرنده‌های استروژن  $\alpha$  و  $\beta$ ، مسیر پیامرسانی  $\beta$ -catenin، چسبندگی و مهاجرت سلول‌های سرطانی، اثر بر سیتوکروم p450، القا آپوپتوز از طریق مسیر آبشار کاسپاز و مهار التهاب از طریق اثر بر آنزیم‌های مسیر سیکل و اکسیژن از، پروتئین‌های شوک حرارتی، فاکتور رونویسی زیپ پایه لوسین، فاکتورهای رونویسی از پروتئین‌های خاص و مسیرهای دیگر می‌تواند باعث جلوگیری از سرطان سینه شود یا پیشرفت آن را در مراحل مختلف از جله رشد، تکثیر، تمایز و متاستاز کاهش دهد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده به طور گستردگر به بررسی مکانیسم‌های انار در سرطان سینه و اهمیت هر مکانیسم پرداخته شود

### سپاس‌گزاری

تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند.  
تعارض در منافع: وجود ندارد.

نظر گرفته می‌شود. نشان داده شده که درمان با عصاره انار باعث افزایش بیان Bax و کاهش بیان Bcl2 در تومورهای سینه با تغییر نسبت Bax/Bcl2 می‌شود. همچنان تنظیم افزایشی Bad، سیتوکروم C، کاسپاز ۳ و ۷ و ۹ نشان داده شده است. بنابراین انار می‌تواند سبب ایجاد آپوپتوز در تومورهای سینه از طریق تنظیم افزایشی ژن پروآپوتوتیک، تنظیم کاهشی ژن‌های ضد آپوتوتیک و مسیر آبشار کاسپاز شود (۵).

### سایر مکانیسم‌های اثر انار دخیل در سرطان

نشان داده شد که عصاره انار باعث توقف چرخه سلولی در مرحله G2/M و القا آپوپتوز و در نتیجه اثرات مهاری بر رشد سلول می‌شود. همچنان نشان داده شده است که اثرات مهاری عصاره انار بر رشد سلولی تنها به خاطر اثرات آنتی‌اکسیدانی انار نمی‌باشد. آنالیزها نشان داده‌اند که درمان با عصاره انار می‌تواند حدود ۹۰۰ ژن را تحت تاثیر قرار دهد و می‌تواند بر روی تنظیم کاهشی ژن‌های پایدار مرتبط با میتوز، سازمان کروموزوم، پردازش RNA، تکثیر DNA و تعمیر DNA، و ژن‌های کنترل شده در تنظیم آپوپتوز و تکثیر سلولی اثرگذار باشد. همچنان آنالیزها نشان دادند که عصاره انار باعث تنظیم کاهشی ژن‌های مهم دخیل در شکست دو رشته DNA با استفاده از هومولوگ نوترکیب (HR)، مانند BRCA2، BRCA1، RAD51، NBS1، RAD50، MRE11 و BRCC3 می‌شود. تنظیم کاهشی ژن‌های هومولوگ نوترکیب با افزایش سطوح میکرو RNAهای پیش‌بینی شده (RAD50) و miR-183 (miRNAs) (هدف پیش‌بینی شده RAD50) و miR-24 (هدف پیش‌بینی شده BRCA1) ارتباط دارد. این نشان می‌دهد که عصاره انار می‌تواند miRNAهای موجود در فرایندهای تعمیر DNA را تنظیم کند. این داده‌ها نشان می‌دهد که عصاره انار باعث تنظیم کاهشی هومولوگ

## References:

- 1-Elidrissi Errahhali M, Elidrissi Errahhali M, Abda N, Bellaoui M. *Exploring Geographic Variability in Cancer Prevalence in Eastern Morocco: A Retrospective Study over Eight Years.* Plos One 2016; 11(3): e0151987.
- 2-Masoompour SM, Lankarani KB, Honarvar B, Tabatabaei SH ,Moghadami M, Khosravizadegan Z. *Changing Epidemiology of Common Cancers in Southern Iran, 2007-2010: A Cross Sectional Study.* Plos One 2016; 11(5): e0155669.
- 3-Rocha A, Wang L, Penichet M, Martins-Green M. *Pomegranate Juice and Specific Components Inhibitcell and Molecular Processes Critical for Metastasis of Breast Cancer.* Breast Cancer Resand Treat 2012; 136(3): 647-58.
- 4-Ataollahi MR, Sharifi J, Paknahad MR, Paknahad A. *Breast Cancer and Associated Factors: A Review.* J Med Life 2015; 8(Spec Iss 4): 6-11.
- 5-Bishayee A, Mandal A, Bhattacharyya P, Bhatia D. *Pomegranate Exerts Chemoprevention of Experimentally Induced Mammary Tumorigenesis by Suppression of Cell Proliferation and Induction Of Apoptosis.* Nutr cancer 2016; 68(1): 120-30.
- 6-Mandal A, Bishayee A. *Mechanism of Breast Cancer Preventive Action of Pomegranate: Disruption of Estrogen Receptor and Wnt/B-Catenin Signaling Pathways.* Molecules 2015; 20(12): 22315-28.
- 7-Thomas HV, Reeves GK, Key TJ. *Endogenous Estrogen and Postmenopausal Breast Cancer: A Quantitative Review.* Cancer Causes Control 1997; 8(6): 922-8.
- 8-Khan GN, Gorin MA, Rosenthal D, Pan Q, Bao LW, Wu ZF, et al. *Pomegranate Fruit Extract Impairs Invasion and Motility in Human Breast Cancer.* Integr cancer ther 2009; 8(3): 242-53.
- 9-Sreeja S, Santhosh Kumar TR, Lakshmi BS, Sreeja S. *Pomegranate Extract Demonstrate a Selective Estrogen Receptor Modulator Profile in Human Tumor Cell Lines and in Vivo Models of Estrogen Deprivation.* J Nutr Biochem 2012; 23(7): 725-32.
- 10- Dai Z, Nair V, Khan M, Ciolino HP. *Pomegranate Extract Inhibits the Proliferation And Viability of MMTV-Wnt-1 Mouse Mammary Cancer Stem Cells in Vitro.* Oncol Rep 2010; 24(4): 1087-91.
- 11- Costantini S, Rusolo F, De Vito V, Moccia S, Picariello G, Capone F, et al. *Potential Anti-Inflammatory Effects of the Hydrophilic Fraction of Pomegranate (Punica Granatum L.) Seed Oil on Breast Cancer Cell Lines.* Molecules 2014; 19(6): 8644-60.
- 12- Asgary S, Keshvari M, Sahebkar A, Hashemi M, Rafieian-Kopaei M. *Clinical Investigation of the Acute Effects of Pomegranate Juice on Blood Pressure and Endothelial Function in Hypertensive Individuals.* ARYA Atheroscler 2013; 9(6): 326-31.
- 13- Bazargani-Gilani B, Tajik H, Aliakbarlu J. *Physicochemical and Antioxidative Characteristics of Iranian Pomegranate (Punica Granatum L. Cv. Rabbab-E-Neyriz) Juice and Comparison of Its Antioxidative Activity with Zataria Multiflora Boiss Essential Oil.* Vet Res Forum 2014; 5(4): 313-8.
- 14- Esmaeilinezhad Z, Babajafari S, Sohrabi Z, Eskandari MH, Amooee S, Barati-Boldaji R. *Effect*

- of Synbiotic Pomegranate Juice on Glycemic, Sex Hormone Profile and Anthropometric Indices in PCOS: A Randomized, Triple Blind, Controlled Trial.* Nutr Metab Cardiovasc Dis 2019; 29(2): 201-208.
- 15- Saravani M, Kazemi Mehrjerdi H, Mirshahi A, Afkhami Goli A. *Protective Effects of Pomegranate Seed Oil on Ovariectomized Rats as a Model of Postmenopausal Osteoporosis: A Multi-Detector Computed Tomography Evaluation.* Vet Res Forum 2014; 5(4): 263-8.
- 16- Mandal A, Bhatia D, Bishayee A. *Anti-Inflammatory Mechanism Involved in Pomegranate-Mediated Prevention of Breast Cancer: The Role of NF-Kb And Nrf2 Signaling Pathways.* Nutrients 2017; 9(5): E436.
- 17- Vini R, Juberiya Am, Sreeja S. *Evidence of Pomegranate Methanolic Extract in Antagonizing the Endogenous SERM, 27-Hydroxycholesterol.* IUBMB Life 2016; 68(2): 116-21.
- 18- Vini R, Sreeja S. *Punica Granatum And Its Therapeutic Implications on Breast Carcinogenesis: A Review.* Biofactors 2015; 1(2): 78-89.
- 19- Adams LS, Zhang Y, Seeram NP, Heber D, Chen S. *Pomegranate Ellagitannin-Derived Compounds Exhibit Antiproliferative And Antiaromatase Activity Inbreast Cancer Cells in Vitro.* Cancer Prev Res 2010; 3(1): 108-13.
- 20- Kim ND, Mehta R, Yu W, Neeman I, Livney T, Amichay A, et al. *Chemopreventive and Adjuvant Therapeutic Potential of Pomegranate (Punica Granatum) for Human Breast Cancer.* Breast Cancer Res Treat 2002;71(3): 203-17.
- 21- Wang C, Mäkelä T, Hase T, Adlercreutz H, Kurzer MS. *Lignans and Flavonoids Inhibit Aromatase Enzyme in Human Preadipocytes.* J Steroid Biochem Mol Biol 1994; 50(3-4): 205-12.
- 22- Aggarwal BB, Shishodia S. *Molecular Targets of Dietary Agents for Prevention and Therapy of Cancer.* Biochem Pharmacol 2006; 71(10): 1397-421.
- 23- Garbacki N, Angenot L, Bassleer C, Damas J, Tits M. *Effects of Prodelphinidins Isolated from Ribes Nigrum on Chondrocyte Metabolism and COX Activity.* Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 2002; 365(6): 434-41.
- 24- Shukla M, Gupta K, Rasheed Z, Khan KA, Haqqi TM. *Bioavailable Constituents/Metabolites of Pomegranate (Punica Granatum L) Preferentially Inhibit COX2 Activity Ex Vivo and IL-1beta-Induced PGE 2 Production in Human Chondrocytes In Vitro.* J Inflamm 2008; 5(1): 9.
- 25- Bishayee A, Thoppil RJ, Darvesh AS, Ohanyan V, Meszaros JG, Bhatia D. *Pomegranate Phytoconstituents Blunt The Inflammatory Cascade in a Chemically Induced Rodent Model of Hepatocellular Carcinogenesis.* J Nutr Biochem 2013; 24(1): 178-87.
- 26- Banerjee N, Talcott S, Safe S, Mertens-Talcott SU. *Cytotoxicity of Pomegranate Polyphenolics in Breast Cancer Cells in Vitro And Vivo: Potential Role of MiRNA-27a and MiRNA-155 In Cell Survival and Inflammation.* Breast Cancer Res Treat 2012; 136(1): 21-34.
- 27- Kapoor R, Ronnenberg A, Puleo E, Chatterton RT Jr, Dorgan JF, Seeram NP, et al. *Effects of*

- Pomegranate Juice on Hormonal Biomarkers of Breast Cancer Risk.** Nutr Cancer 2015; 67(7): 1113-9.
- 28- González-Sarrías A, Giménez-Bastida JA, García-Conesa MT, Gómez-Sánchez MB, García-Talavera NV, Gil-Izquierdo A, et al. **Occurrence of Urolithins, Gut Microbiota Ellagic Acid Metabolites and Proliferation Markers Expression Response in The Human Prostate Gland Upon Consumption of Walnuts and Pomegranate Juice.** Mol Nutr Food Res 2010; 54(3): 311-22.
- 29- Faria A, Monteiro R, Azevedo I, Calhau C. **Pomegranate Juice Effects on Cytochrome P450S Expression: in Vivo Studies.** J Med Food 2007; 10(4): 643-9.
- 30- Vicinanza R, Zhang Y, Henning SM, Heber D. **Pomegranate Juice Metabolites, Ellagic Acid and Urolithin A Synergistically Inhibit Androgen-Independent Prostate Cancer Cell Growth Via Distinct Effects on Cell Cycle Control and Apoptosis.** Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013: 247504.
- 31- Wang L, Martins-Green M. **Pomegranate and Its Components as Alternative Treatment for Prostate Cancer.** Int J Mol Sci 2014; 15(9): 14949-66.
- 32- Shirode AB, Kovvuru P, Chittur SV, Henning SM, Heber D, Reliene R. **Antiproliferative Effects of Pomegranate Extract In MCF-7 Breast Cancer Cells are Associated with Reduced DNA Repair Gene Expression and Induction of Double Strand Breaks.** Mol Carcinog 2014; 53(6): 458-70.

## The Effect of Pomegranate and Its Compounds on Breast Cancer: Review Article

Zahra Esmaeilnezhad<sup>1</sup>, Reza Barati Boldaji<sup>\*2</sup>

### Review Article

**Introduction:** Pomegranate is a rich source of phytochemicals with high antioxidant effects, which has therapeutic effects in traditional and modern medicine. Pomegranate is effective in the prevention and treatment of cardiovascular diseases, diabetes, obesity, inflammatory diseases, infectious and microbial diseases, neurological disorders and immunity. Today the role of pomegranate in various stages of cancer has also been proven. Since breast cancer is one of the most common cancers among women, this study examined the effect of pomegranate in breast cancer. The articles used from the PubMed database were selected selectively using the words "pomegranate" or "Punica grantum" and "breast cancer". The results of studies have shown that pomegranate compounds can affect different stages of cancer in different ways, including: inhibiting aromatases, inhibiting cyclooxygenase enzymes effects on heat shock proteins, transcriptional leukocyte zipper transcription factor, transcription factors of specific proteins, cell cycle. Also, it has been shown in some studies that pomegranate compounds can affect different stages of cancer through anti-estrogenic activity, effect on 27-hydroxycholesterol, changes in  $\alpha$  and  $\beta$  estrogen receptors, Wnt /  $\beta$ -catenin signaling pathway, cancer cell adhesion and migration, effects on cytochrome p450, Caspase cascade, apoptosis and other pathways.

**Keywords:** Cancer, Punicaceae, Metastasis, Apoptosis

**Citation:** Barati R, Esmaeili nezhad Z. **The effect of pomegranate and its compounds on breast cancer: Review article.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2019; 27(8): 1814-25.

<sup>1</sup>Nutrition Research Center - Shiraz University of medical sciences, Shiraz, Iran.

<sup>2</sup>Nutrition Research Center - Shiraz University of medical sciences, Shiraz, Iran.

\*Corresponding author: Tel: 09132807850 email: reza93barati@gmail.com