

ارزیابی نتایج حاصل از کاربرد میدازولام داخل بینی به عنوان پیش داروی بیهوشی در کودکان پیش دبستانی

دکتر ویدا آیت‌اللهی^{1*}، دکتر شکوفه بهداد²

چکیده

مقدمه: روحی روانی بیمار قبل از عمل یکی از اهداف عمده بیهوشی بوده که می‌توان با تجویز داروهایی تحت عنوان پیش دارو (پرمدیکاسیون) بیمار به این هدف نایل شد. کودکان به علت وابستگی به والدین و ترس و اضطراب و عواقب ناشی از آن حتماً باید قبل از قرار گرفتن روی تخت عمل پیش دارو دریافت کنند. تاکنون داروهای مختلفی به این منظور تجویز شده‌اند با توجه به حساسیت این گروه سنی جا دارد کم‌عارضه‌ترین و خوشایندترین داروی مؤثر به کار برده شود. میدازولام یک بنزودیازپین محلول در آب و اثر و کوتاه اثر می‌باشد که می‌تواند به عنوان پیش دارویی مناسب از راه های وریدی، عضلانی، خوراکی، داخل بینی و رکتال مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این تحقیق ارزیابی نتایج حاصله از کاربرد 0/2 میلی گرم بر کیلو گرم میدازولام نازال به عنوان پیش داروی قبل از بیهوشی در کودکان 2-6 ساله بوده تا استفاده از حداقل دوز در فرصت کافی جهت رسیدن به اوج اثر دارو در مقایسه با سایر مطالعات مورد بررسی قرار گیرد.

روش بررسی: مطالعه به صورت آینده‌نگر و تصادفی بوده که در طی آن 100 کودک 2-6 ساله در کلاس ASA-I که کاندید عمل جراحی بوده‌اند به صورت دوسوکور و راندوم به دو گروه 50 نفره تقسیم شده‌اند. گروه اول چند قطره نرمال سالین و گروه دوم 0/2 mg/kg (5 میلی گرم در سی سی) میدازولام 20 دقیقه قبل از ورود به اتاق عمل از طریق بینی دریافت کردند. **نتایج:** 20 دقیقه پس از تجویز قطره در هنگام جدایی از والدین گروه اول 14 درصد و گروه دوم 68 درصد آرام و هوشیار بودند (pv=0.0001) در هنگام القا بیهوشی پذیرش ماسک بیهوشی توسط بیماران گروه دوم راحت‌تر از گروه اول بود. 72 درصد در مقابل 14 درصد (pv=0.0001) مدت زمان ریکاوری بیماران گروه دوم طولانی‌تر ولی رابطه معنی‌دار نبود. سایر عوارض (مشکلات تنفسی، تهوع، استفراغ و تغییرات واضح ریت و ریتم قلب و فشار خون) در هیچ گروه مشاهده نشد. **نتیجه‌گیری:** میدازولام نازال به دلیل خاصیت ضد اضطراب و آرام بخشی مؤثر بی‌خطر از نظر عوارض تنفسی و قلبی - عروقی دارویی مفید، مؤثر و بدون عارضه در کودکان است که در مقایسه با داروهای تزریقی برای کودکان نیز خوشایندتر می‌باشد و می‌توان با دادن کمی فرصت بیشتر برای اثر بهتر دارو از حداقل دوز آن بهره کافی برد.

واژه‌های کلیدی: میدازولام داخل بینی، پیش داروی بیهوشی

مقدمه

اضطراب جدایی اطفال از والدین، ترس از محیط بیمارستان و اتاق عمل، عدم درک ضرورت جراحی توسط کودکان همگی کودکان را در معرض عوارض روحی، روانی

بسیار قرار داده و می‌تواند خاطرات بدی در ذهن کودک به جا بگذارد^(1,2,3) جهت کاهش این اضطراب و نگرانی در اتاق عمل از روش‌های مختلف از جمله دیدار و صحبت با کودک قبل از بیهوشی، اطمینان دادن و طرح دوستی با او و تجویز داروهای آرامبخش استفاده می‌شود^(1,2,3). در کودکان احتیاج به پیش دارویی است که سریع اثر کرده، مدت طول اثرش کوتاه بوده و روش تجویز آن نیز حتی المقدور آزار دهنده

* نویسنده مسئول: استادیار گروه بیهوشی

تلفن: 0913 152 0724 Email: Ayativida@yahoo.com

2- استادیار گروه بیهوشی

و 1- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد

تاریخ دریافت: 82/12/19 تاریخ پذیرش: 84/2/22

(2,3) نباشد.

از عمل آرام بخش دریافت نکرده بودند تمامی کودکان اولین تجربه ورود به اتاق عمل را داشتند. بیماران به صورت دوسوگور و راندم به دو گروه شاهد و مورد به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. 20 دقیقه قبل از عمل 1 تا 1/5 سی سی قطره نرمال سالین توسط سرنگ 2 سی سی در بینی گروه شاهد و 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم میدازولام (5 میلی گرم در سی سی) در بینی گروه مورد چکانده می شد. 20 دقیقه کودک در کنار والدین تحت مراقبت بود. تعداد ضربان قلب و تنفس بیمار قبل از دادن دارو و 20 دقیقه پس از چکاندن قطره ثبت شده و پس از 20 دقیقه کودک از والدین جدا شده به اتاق عمل برده می شد. در اتاق عمل هم قبل از شروع بیهوشی مجدداً تعداد ضربان قلب و تنفس بیمار ثبت می شد. نمره آرامش کودک در هنگام ورود به اتاق عمل به شرح زیر به بیمار داده می شد (در کلیه مراحل کودک تحت نظارت بود).

نمره 1 بیمارانی که هوشیار، اما بیقرار بوده و گریه می کنند.

نمره 2 بیمارانی که هوشیار بوده و آرامش دارند.

نمره 3 بیمارانی که خواب آلود و آرام هستند.

نمره 4 بیمارانی که خواب هستند.

القای بیهوشی با ماسک با گازهای اکسیژن، نیترو اکسید و هالوتان شروع شده و سپس مخدر وریدی و آتروپین، تیوپنتال سدیم و شل کننده عضلانی با دو ز یکسان به کودکان تجویز می شد. به تمامی کودکان 10 سی سی بر کیلوگرم مایع داده می شد. میزان همکاری و پذیرش ماسک توسط کودک در شروع بیهوشی ثبت شد. پس از اتمام جراحی زمان بیداری کامل کودک از لحظه قطع داروهای بیهوشی تا برگشت کامل رفلکس بلع و باز کردن چشم به دنبال صدا زدن ثبت شد.

عوارض شامل: تهوع، استفراغ، لارنگواسپاسم و دپرسیون تنفسی و رتگی واضح ضربان قلب و فشار خون تا خروج بیمار از ریکاوری اتاق عمل یادداشت شد. در نهایت نتایج به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS - v 13 با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و آنالیز واریانس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

نتایج

میانگین سن کودکان در گروه شاهد $4/41 \pm 1/6$ و در

میدازولام یک بنزودیازپین حلال در آب بوده که سریع اثر کرده، طول اثر کوتاه داشته و علاوه بر ایجاد آرامش در کودک باعث ایجاد یک آمنزی (فراموشی) وقت در فرد شده و در نتیجه وقایع و صحنه های اتاق عمل از ذهن کودک پاک می شود. آرامش کودک موجب آرامش پدر و مادر و پرسنل اتاق عمل شده، القای بیهوشی راحت تر انجام می گیرد و نیاز به داروهای بیهوشی هم کم می شود (1,2,3,4).

میدازولام از طرق مختلف شامل داخل وریدی، داخل عضلانی، داخل قاعد و خوراکی استفاده می شود (1). راه داخل بینی نیز مدتی است که توجه متخصصین بیهوشی و سایر رشته ها را به خود جلب نموده است (9-1). روش رکتال و تزریقی برای کودک ناخوشایند است. در روش خوراکی زمان رسیدن به اوج اثر طولانی (یک ساعت) برگشت اثر دارو هم طولانی بوده (تا 4 ساعت) و عمق سدیشن هم متغیر است (1,2). به همین دلایل روش نازال که در عرض ده دقیقه به اوج اثر دارو رسیده و زمان برگشت اثر نیز بیش از یک ساعت نمی باشد مقبول تر است (1,2). از راه داخل بینی دوزهای مختلف 0/2 تا 0/5 میلی گرم بر کیلوگرم قابل استفاده است (1,2). در مطالعات مختلف که در بحث به آنها اشاره شده است از دوزهای مختلف در فرصت های 5 الی 10 دقیقه ای استفاده شده است و اکثراً هم از دوزهای بالاتر از 0/2 استفاده کرده اند.

در مقایسه با مطالعات مشابه در این مطالعه ما نتایج حاصل از کاربرد حداقل دوز میدازولام نازال و دادن حداکثر فرصت جهت رسیدن به اوج اثر را در کودکان با گروه شاهد مقایسه کرده (0/2 میلی گرم بر کیلوگرم و 20 دقیقه فرصت زمانی) و میزان آرام بخشی، میزان همکاری و پذیرش ماسک بیهوشی توسط کودک، طول زمان ریکاوری و عوارض تنفسی دو گروه را با هم مقایسه کرده ایم.

روش بررسی

این مطالعه تحلیلی و به روش Clinical trial بر روی 100 کودک 2-6 ساله کاندید عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی یا تونسیلکتومی انجام گرفته است. کودکان در کلاس ASA-I بوده تحت درمان با هیچ دارویی نبوده و قبل از آمدن به اتاق قبل

همکاری کودکان در هنگام چکاندن قطره در بینی در گروه میدازولام 16% خوب، 60% متوسط و 24% بد بود و در گروه نرمال سالین 12% خوب، 76% متوسط و 12% بد بود که این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبوده و نمایانگر عدم تفاوت همکاری دو گروه در زمان تجویز دارو می باشد. طولانی شدن زمان ریکاوری بیش از یک ربع در گروه شاهد 8% و در گروه میدازولام 18% بود که از نظر آماری معنی دار نمی باشد. سایر عوارض نیز (تهوع، استفراغ، اسپاسم و مشکل تنفسی) در هیچ گروه مشاهده نشد (جدول 3).

جدول 3: مقایسه عوارض دارو در دو گروه مورد بررسی

نوع دارو	عارضه دارو	
	تعداد	درصد
میدازولام	9	18
نرمال سالین	4	8
کل	13	13

میانگین تعداد تنفس و ضربان قلب هم در دو گروه قبل و 20 دقیقه بعد از تجویز دارو افزایش یا کاهش قابل ملاحظه ای از نظر کلینیکی نداشتند که این نشانگر بی خطر بودن میدازولام از نظر قلبی، عروقی و تنفسی می باشد.

بحث

اضطراب و ترس کودک می تواند اختلال روحی و رفتاری را در آینده برای وی ایجاد نماید و استفاده از پیش داروی بیهوشی قبل از عمل در کاهش اضطراب و آرام نمودن کودک نقش مؤثری دارد. علاوه بر آن آرامش کودک سهولت کار متخصص بیهوشی، جراح و آرامش والدین و اتاق عمل را به دنبال دارد (2,3,5,6,7).

این مطالعه برای بررسی اثرات آرام بخش حداقل دوز میدازولام داخل بینی با دادن فرصت کافی، در هنگام جدایی کودکان 2-6 ساله از والدین و هنگام القای بیهوشی (میزان پذیرش ماسک توسط کودک) انجام شد.

در مطالعه Otsuka⁽⁵⁾، 93% کودکان پس از 10 دقیقه از تجویز 0/3 میلی گرم بر کیلوگرم میدازولام نازال آرام و راحت از والدین جدا شدند و در مطالعه ما 68% کودکان پس از 20 دقیقه از تجویز 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم با آرامش از

گروه مورد 44/61±1/45ه و اختلاف معنی دار آماری ندارد. جنس دو گروه نیز مشابه بوده و اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت.

وضعیت آرامش کودکان هنگام جدایی از والدین در گروه دریافت کننده میدازولام بدین صورت بود که 30% کودکان مضطرب و گریان، 68% آرام و هوشیار و 2% خواب آلود بوده اند. گروهی که نرمال سالین دریافت کرده بودند 86% مضطرب و گریان، 14% آرام و هوشیار و هیچکدام خواب آلود نبودند. این اختلاف چشمگیر بین دو گروه نشان دهنده آرامبخشی مؤثر میدازولام به صورت جذب مخاطی از راه بینی می باشد (p=0.0001) جدول (1).

جدول 1: وضعیت آرامش بیمار هنگام جدایی از والدین در دو گروه مورد بررسی

نوع دارو	درجه آرامش هوشیار و بیقرار				درجه آرامش خواب آلود				کل
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
میدازولام	15	30	34	68	1	2	50	100	
نرمال سالین	43	86	7	14	0	0	50	100	
کل	58	58	41	41	1	1	100	100	

وضعیت پذیرش ماسک و آرامش کودکان هنگام القای بیهوشی در گروهی که میدازولام دریافت کردند 24% بی قرار و گریان، 72% هوشیار و آرام و 4% خواب آلود بودند. در گروه نرمال سالین 86% بی قرار و گریان و 14% آرام و هوشیار بودند (p=0.0001). این اختلاف معنی دار آماری نیز نشان دهنده تعیین مؤثر این دارو در آرامش کودک و بالطبع اطرافیان می شود و در نهایت القای بیهوشی در کودک آرام راحت تر انجام می شود (جدول 2).

جدول 2: وضعیت آرامش بیمار هنگام القای بیهوشی در دو گروه مورد بررسی

نوع دارو	درجه آرامش هوشیار و بیقرار				درجه آرامش خواب آلود				کل
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
میدازولام	12	24	36	72	2	4	50	100	
نرمال سالین	43	86	7	14	0	0	50	100	
کل	55	55	43	43	2	2	100	100	

میلی گرم بر کیلوگرم خوراکی یا رکتال مورد بررسی قرار گرفت میزان سدیشن و ضد اضطراب در 4 گروه یکسان بوده و با گذشت زمان این اثر افزایش می یافت و در گروه نازال در عرض 20 دقیقه و در گروه خوراکی و زیرزبانی در عرض 30 دقیقه به بالاترین حد خود رسیده بود و 75% بچه ها ماسک را به راحتی قبول کردند. (مطالعه ما 72% بود) با وجود اثر سریعتر دارو از راه بینی، تحریک بینی توسط دو گروه قابل اهمیت بود و 77% بچه ها گریه کرده بودند. در این مطالعه طولانی تر بودن اثر راه خوراکی به اثبات رسیده است. در مطالعه ما دوز کمتر هم توانسته بود در همان زمان اثر مشابه داشته باشد. در مطالعه Weber و همکارانش⁽⁹⁾، اثر و خطرات مصرف کتامین و میدازولام نازال در 3 گروه: کتامین 1 میلی گرم بر کیلوگرم، کتامین 2 میلی گرم بر کیلوگرم و میدازولام 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم از طریق داخل بینی مورد بررسی قرار گرفت. جدایی از والدین در گروه ها مشابه بود و به راحتی انجام گرفت. عوارض جانبی در گروه ها در محدوده ی نرمال و بی خطر بود و همانند مطالعه ما عارضه تنفسی یا قلبی - عروقی خاصی پیش نیامد. حتی مشاهده می شود که در این مطالعه با زمان 5 دقیقه از تجویز میدازولام نازال هم با حداقل دوز میدازولام نتیجه مطلوب گرفته شده است. (در مقابل گذشت 20 دقیقه در مطالعه ما).

نتیجه گیری میدازولام نازال به دلیل خاصیت آرام بخشی مؤثر و بی خطر بودن از نظر عوارض تنفسی و قلبی عروقی یک داروی مفید، مؤثر و بدون عارضه در کودکان می باشد. با توجه به خوشایندتر بودن برای کودک نسبت به روش تزریقی یا رکتال مقبول بوده و با توجه به زمان اوج اثر کوتاه تر و برگشت سریعتر اثر دارو نسبت به نوع خوراکی برای آمادگی قبل از عمل مناسب تر است.

References

1. Miller Ronald: *Anesthesia*, 6th ed, Chap 60, 2005, 2376- Chap 68, 2005, 2596.
2. Miller Ronald: *Anesthesia*, 6th ed, Chap 10, 2005, 334 – 342.
3. Bruno Bissonnette –Bernard –Dalen S: *Pediatric*

والدین جدا شدند. این اختلاف آماری می تواند به علت مصرف دوز کمتر توسط ما باشد. همچنین عدم وجود اطاق اسباب بازی قبل از اتاق عمل در بیمارستان مورد مطالعه ما (در مقایسه با بیمارستانهای خارج کشور) سرو صدا و رفت و آمد زیاد به خصوص حمل و نقل بیماران عمل شده مقابل دیدگان کودک همگی می توانند در کاهش اثر سداتیو میدازولام نسبت به مطالعه مشابه نقش به سزایی داشته باشد.

در مطالعه Fishbein⁽⁶⁾، یک گروه قبل از عمل آندوسکوپی دستگاه گوارش نرمال سالین نازال و پس از 10 دقیقه میدازولام و ریدی 0/05 میلی گرم بر کیلوگرم و گروه دوم میدازولام 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم و پس از 10 دقیقه نرمال سالین و ریدی دریافت کردند و نتیجه گرفتند میدازولام نازال در آرام بخشی و جدایی از والدین نقش مؤثری دارد (همانند ویدی) که این اثر تا هنگام پروسه آندوسکوپی هم ادامه داشت اما آنها نتیجه گرفتند که اثر تحریکی و سوزش ناخوشایند مخاط بینی توسط دارو می تواند این اثر مفید را تحت تأثیر منفی قرار دهد. این اثر منفی میدازولام در مطالعه ما هم قابل توجه بود و حتی موجب گریه بعضی از کودکان می شد. اما پس از مدت کوتاهی کودک آرام می شد و این اثر ناخوشایند گذرا بود.

Vivarelli⁽⁷⁾ در تحقیقی که روی 248 کودک 6-2 ساله انجام داد دریافت که تجویز 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم میدازولام از طریق بینی در تمامی گروه های سنی اثر آرام بخشی بهتر و سریعتری نسبت به تجویز 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم دیاپام خوراکی دارد که تاییدی بر دوز مصرفی ما می باشد. در این مطالعه از زمان ذکر نشده است.

در تحقیق Kogan و همکارانش⁽⁸⁾ در 4 گروه مختلف دوزهای 0/3 میلی گرم بر کیلوگرم زیرزبانی یا داخل بینی و 0/5

anesthesia- principle & practice, Chap 22, 2002:

405-406.

4. Goodman, Gillman, *Hypnotic & Sedative*, 1996:

362- 372.

5. Otsuka Y, Yusa T, Higa M. *Intranasal midazolam*

- sedation before anesthesia in pediatric patients masula* , 1994 Jan, 43 (1): 106-110.
6. Fishbein M, Lugo RA, Woodly, *Evaluation of intranasal midazolam in children undergoing esophagogastroduodenoscopy.* J Pediatre Gastroentral Nutr, 1997 sep ,25(3): 261-266.
 7. Vivarelli R, Zanotti F, Battaglia D. *premedication with intranasal midazolam children of various ages* Minerua –Anesthesio ,1998 Nov,6 (11): 499-505.
 8. Kogan A, Katz J, Efrat R, Eidolman LA. *premedation with midazolam in young children :a comparison of administration* Paediatr Anesth, 2002 Oct , 12(8): 685-689.
 9. Weber F, Wulf H, El Sicial G. *premedication with nasal s-ketamine & midazolam provides good conditions for induction of anesthesia preschool children* Can J Anaesth ,2003 May, 50 (5): 470-475.