

تأثیر آموزش در زمینه اهمیت معاینات کلینیکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان به مرکز درمانی تعیین شده جهت انجام معاینه

ژیلا میرلشادی^۱، سکینه محمدعلیزاده^۲، منصوره عزیززاده فروزنی^۳

چکیده

مقدمه: پیشگیری ثانویه در سرطان پستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا سبب می‌شود تا توده پستانی در هنگام درمان اندازه‌ای کوچکتر داشته باشد. معاینه دقیق پستان‌ها توسط پزشک یا یکی از اعضای گروه بهداشتی یکی از راههای پیشگیری ثانویه از سرطان پستان است.

روش بورسی: این مطالعه از نوع تجربی و به منظور تعیین تأثیر آموزش بر مراجعه معلمین جهت معاینات کلینیکی پستان صورت گرفت، در این مطالعه ۵۰ نفر از معلمین مدارس دخترانه شرکت نمودند. مدارس از طریق روش چند مرحله‌ای و به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. یک جزوی آموزشی در اختیار آزمودنی‌های گروه تجربی قرار گرفت و طی اطلاع‌یابی، آدرس کلینیک و زمان مراجعه، به اطلاع دو گروه رسانده شد. پس از دو ماه آزمودنی‌ها به سوالات پرسشنامه‌ای پژوهشگر - ساخته پاسخ دادند.

نتایج: نتایج نشان داد به جز متغیرهای تأهل و سطح تحصیلات از جهت سایر متغیرهایی که احتمالاً می‌توانستند بر مراجعه مؤثر باشند بین دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی‌دار آماری وجود نداشت. میزان مراجعه جهت معاینات کلینیکی پستانی در گروه تجربی (۱۷/۳٪) بیش از گروه شاهد (۶٪) و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ($P < 0.001$)، در مورد ارتباط میزان مراجعه با ویژگی‌های فردی و متغیرهای مرتبط با سرطان پستان فقط در گروه تجربی ارتباط معنی‌داری با سابقه سرطان پستان در خانواده مشاهده گردید (۰/۰۵٪)، به طوری که افراد دارای سابقه سرطان در خانواده، بیشتر مراجعه کرده بودند.

نتیجه گیری: گرچه میزان مراجعه در هر دو گروه راضی کننده نمی‌باشد اما در عین حال استفاده از جزوی آموزشی که روشی کم خرج و ساده و بی نیاز از حضور مستقیم آموزش دهنده است موجب گردیده تا میزان مراجعه در گروه تجربی حدود سه برابر گروه شاهد افزایش یابد که حاکی از مؤثر بودن نسبی این روش آموزش می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، معاینه کلینیکی پستان، آموزش.

مقدمه

۲۰۰ نوع مختلف بیماری است. یافته‌ها نشان می‌دهد، که در کشور انگلستان حداقل از هر ۳ نفر یک مورد در طول زندگی خود به سرطان مبتلا می‌شود^(۱). براساس مطالعات انجام شده پیشگیری از سرطان و تشخیص زودرس آن از جمله فاکتورهای حیاتی در کنترل بیماری است. بنابراین با پیشگیری و استفاده از غربالگری،

سرطان در واقع یک نوع بیماری نبوده بلکه مشتمل بر

- ۱- مری، گروه پرستاری
- ۲- مری، گروه پرستاری کودکان
- ۳- مری، گروه پرستاری داخلی - جراحی
- ۴- دانشگاه آزاد اسلامی تهران
- ۵- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کرمان

تشخیص توده‌های قابل لمس توسط معاینات کلینیکی می‌تواند منجر به تشخیص و درمان زودتر و سریع‌تر گردد^(۱۴). لازم به ذکر است که انجام خود آزمایی پستان به تنها یی، به علت احتمال درست نبودن روش انجام آن، کمترین دقت را دارد^(۱۵). ضمناً با وجود دقت بالا در انجام ماموگرافی، در بسیاری موارد توده‌هایی وجود دارند که به‌وسیله ماموگرافی کشف نشده، ولی به‌وسیله CBE پیدا شده‌اند^(۱۵,۱۶,۱۷) ماموگرافی منظم و روئین قبل از ۴۰ سالگی مگر در موارد خاص از جمله سابقه سرطان پستان در افراد درجه یک خانواده و یا ابراز ناراحتی و گزارش توده توسط خود فرد، توصیه نشده است ولی بعد از ۴۰ سالگی باید سالیانه انجام گردد^(۱۸). از طرفی امکان انجام ماموگرافی در حد وسیع در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینه بالا، وجود ندارد. بنابراین معاینه کلینیکی پستان، به خصوص در این جوامع می‌تواند از ارزش زیادی برخوردار باشد، به طوری که در این کشورها سیاست‌های بهداشتی بر انجام CBE تأکید بسیار دارد^(۱۹). در مقایسه بین کسانی که CBE را به طور سالیانه انجام داده و آنها که انجام نداده‌اند، در گروه اول میزان مرگ و میر ناشی از سرطان ۲۰/۵ درصد کاهش نشان داده است^(۱۹). البته تاثیر آن وابسته به دقت و صحت انجام روش است^(۲۰). لازم به ذکر است که مؤثرترین روش، ترکیبی از روش‌های مختلف می‌باشد^(۲۱) به طوری که حتی در کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا نیز CBE به طور گسترشده‌ای توصیه و انجام می‌شود^(۱۴). ضمناً انجام دقیق معاینات کلینیکی پستان توسط پرستاران آموزش دیده هم می‌تواند برای غربالگری سرطان پستان بسیار مؤثر باشد^(۲۱).

در ارتباط با اهمیت شرکت در این آزمایشات، لازم است اطلاعات به صورت نوشتاری و کلامی در اختیار زنان قرار گیرد^(۸,۹,۲۱) البته در این رابطه نتایج متفاوتی نیز به دست آمده است. طی تحقیقی که در شمال هایفا انجام گرفته و هدف آن بررسی اثر آموزش بر روی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری‌ها و سرطان، از جمله انجام BSE بوده، معلوم گردید که مداخله آموزشی منجر به تغییر در رفتار، نگرش و دانش گروه نشده است^(۲۲). مسلم است که آموزش بهداشت در شرایطی مؤثر است

میزان ابتلاء و مرگ و میر کاهش خواهد یافت^(۳,۲) سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در بین زنان است. به طوری که از هر ۸ نفر زن آمریکایی، یک نفر در طول زندگی خود به آن مبتلا می‌شود^(۴) از آنجا که میزان متوسط عمر افراد مبتلا، ارتباط با زمان تشخیص و شروع درمان دارد، لازم است مرکز توجه، بر تشخیص زودرس و شروع درمان دارد^(۵) آموزش به بیماران و جامعه در زمینه اهمیت پیشگیری از بیماری و تشخیص زودرس در حد وسیع از نقش‌های مهم پرستاران است^(۶). پرستاران نباید تنها در برنامه درمان بیماران نقش داشته باشند، بلکه پیشگیری از سرطان نیز جزء وظایف اصلی آنهاست^(۷) براساس مطالعات، زنانی که راجع به سرطان پستان، اطلاعات بیشتری دارند، تمایل بیشتری برای شرکت در آزمایشات غربالگری نشان می‌دهند^(۱,۸) به عنوان مثال مطالعات نشان داده است که علی‌رغم شیوع بیشتر سرطان در زنان سفید پوست آمریکایی، میزان مرگ و میر در زنان سیاه پوست بیشتر گزارش می‌شود. یکی از دلایل آن می‌تواند تشخیص دیررس بیماری در این گروه باشد. زیرا مشخص شده است که اطلاعات زنان سیاه پوست در مورد روش‌های غربالگری سرطان پستان و اهمیت شرکت در آن کمتر از سفید پوستان بوده و این در حالی است که دیده شده اگر زنان سیاه پوست مورد آموزش قرار بگیرند و اطلاعات کافی در مورد اهمیت و تاثیر شرکت در روش‌های غربالگری به آنها داده شود، میزان شرکت آنها حتی بالاتر از سفید پوستان خواهد بود^(۹). در ارتباط با سرطان پستان، پیشگیری ثانویه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و منجر به تشخیص بیماری در مراحل اولیه شده و در ارتباط با جلوگیری از پیشرفت بیماری است. شرکت در آزمایشات غربالگری جزو این طبقه از پیشگیری قرار دارد^(۱). طبق توصیه انجمن سرطان آمریکا، خود آزمایی پستان (BSE)، Breast Self Examination) (BSE) (Clinical Breast Examination) CBE ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان^(۱۰) (Examination) سه روش موثر در پیشگیری ثانویه برای سرطان پستان است^(۱۱,۱۰) انجام معاینات کلینیکی پستان از ۲۰ سالگی به صورت روئین توصیه شده است. به این ترتیب که از ۲۰ تا ۴۰ سال هر سه سال یکبار و از ۴۰ سالگی به بعد باید هر ساله انجام شود^(۱۰,۱۱) بنابراین برای زنان کمتر از ۴۰ سال،

گروه (به جز مراجعه کنندگان به کلینیک) قرار گرفت، که ۲۵۵ نفر در گروه تجربی (٪/۸۵) و ۲۴۶ نفر در گروه شاهد (٪/۸۲) آن را تکمیل نمودند که در مجموع میزان پاسخ ٪/۸۳/۵ بود. افراد مراجعه کننده به کلینیک جهت CBE در زمان مراجعه به کلینیک پرسشنامه را تکمیل می کردند. معلمینی که سابقه ای از سرطان پستان داشتند در این مطالعه شرکت داده نشدند. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های پراکندگی، مرکزی و آزمون های آماری پارامتریک α و β زوج وغیرپارامتریک، مجدور کای و مک نمار صورت گرفت. ملاک مراجعه قبل از آموزش، براساس پاسخ به یک سوال در پرسشنامه و بعد از آموزش مراجعه به مرکز تعیین شده و تقاضای انجام CBE و تکمیل پرسشنامه بود.

نتایج

نتایج مربوط به ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها نشان داد که متوسط سنی افراد مورد مطالعه ۴۰/۷۶ سال بود. بیشترین گروه سنی در گروه تجربی (٪/۵۴/۵) و در گروه شاهد (٪/۴۶/۷) مربوط به گروه سنی ۳۶-۴۵ سال و بعد از آن در هر دو گروه، بیشترین فراوانی به ترتیب متعلق به گروه های بالای ۴۵ سال و زیر ۳۶ سال بود. آزمون مجدور کای اختلاف معنی داری را از نظر گروه های سنی در دو گروه تجربی و شاهد نشان نداد. از نظر وضعیت تأهل بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت ($P<0.001$). در گروه تجربی ٪/۹۲/۴ افراد در زمان جمع آوری داده ها متأهل بودند در حالی که این درصد در گروه کنترل ٪/۸۳/۸ بود. از نظر متغیر تحصیلات نیز دو گروه همگن نبودند ($P<0.05$ ، به این ترتیب که در گروه تجربی افراد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر، فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر به ترتیب ٪/۴۱ و ٪/۳۵/۳ و ٪/۲۳/۷ و در گروه شاهد به ترتیب: ٪/۳۱ و ٪/۳۴/۹ بودند. سابقه ماموگرافی، مقطع تحصیلی تدریس، وجود مشکل بهداشتی در پستان و سابقه سرطان پستان در خانواده، نسبت آزمودنی با وابسته به سرطان پستان و داشتن وابسته ای در حرفة های بهداشتی در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد.

که در چهار چوب و زمینه ای انجام گردد که برای آن شرایط مناسب باشد^(۲۳). زبان، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی افراد، در استفاده آنها از سرویس های بهداشتی تأثیر دارد^(۲۴) به همین دلیل در این مطالعه تأثیر اطلاع رسانی از طریق جزو اموزش آموزشی، بر انجام CBE در معلمین مدارس دخترانه کرمان بررسی شد تا در صورت مؤثر بودن این نوع آموزش که روشهای کم هزینه و در دسترس است، از آن در سطح وسیع و عمومی استفاده شود. بدیهی است در کار آموزش، آمادگی پژوهشکاران و افراد آموزش دیده تیم بهداشتی و همچنین وجود کلینیک های مخصوص معاینه ضرورت دارد.

روش بررسی

این پژوهش از نوع تجربی است که در آن تأثیر آموزش بر مراجعه معلمان مدارس دخترانه (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) جهت CBE در سال ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه $\beta=0/15$ و $\alpha=0/15$ با در نظر گرفتن $pmin=0/15$ و $pmax=0/25$ و با توجه به روش نمونه گیری و احتمال افت نمونه، ۳۰۰ نفر در هر گروه تعیین گردید که به روش چند مرحله ای انتخاب شدند. آموزش و پرورش کرمان دارای دو ناحیه است که هر یک به عنوان یک خوش بزرگ محسوب گردید و به روش تصادفی ناحیه ۱ به عنوان گروه کنترل و ناحیه ۲ به عنوان گروه تجربی در نظر گرفته شد. به طور متوسط در هر مدرسه

۲۰ نفر معلم مشغول به کار بودند با توجه به حجم نمونه در هر گروه (۳۰۰ نفر) از هر ناحیه ۱۵ مدرسه (دبستان، ۵ مدرسه راهنمایی، ۵ دبیرستان) به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. سپس جزو آموزشی در ارتباط با اهمیت شرکت در غربالگری و انجام CBE برای پیشگیری از سرطان پستان در اختیار گروه تجربی قرار گرفت. از طریق اطلاعیه ای زمان و مکان معاینات کلینیکی به اطلاع تمام افراد هر دو گروه رسانیده شد. پس از گذشت دو ماه، پرسشنامه ای پژوهشگر - ساخته حاوی سوالاتی در مورد ویژگی های فردی و مراجعه قبلی و همچنین مراجعه فعلی و زمان و مکان آن در اختیار کل افراد دو

$$X^2=14.07 \quad df=1 \quad P<0.001$$

بحث

قبل از پرداختن به بیان نتایج و مقایسه آن با یافته‌های سایر پژوهش‌ها لازم است این نکته یادآوری شود که معمولاً رفتار افراد در هر جامعه تأثیر گرفته از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است. بنابراین در مقایسه یافته‌های این مطالعه با سایر تحقیقات که در مکان‌ها و شرایط متفاوتی انجام گرفته‌اند باید دقت شود. مطالعه فعلی نشان داد که میزان مراجعه افراد در گروه تجربی پس از آموزش $\frac{1}{3}$ % و در گروه کنترل $\frac{6}{22}$ % بوده است. یعنی به دنبال آموزش درصد مراجعه گروه تجربی تقریباً سه برابر گروه کنترل بوده است. در مطالعه Kernohan درصد مشارکت زنان در آزمایشات غربالگری پستان قبل از آموزش $\frac{22}{59}$ % بود، اما پس از آموزش به $\frac{59}{59}$ % افزایش یافت^(۲۴). Roberson نیز در مطالعه خود پس از آموزش و در اختیار گذاشتن امکانات رایگان به صورت سیار، در نقاط مختلف جامعه، توانسته بود $\frac{75}{75}$ % از زنان مورد مطالعه را تشویق به انجام CBE نماید^(۲۵). هاریس در تحقیق خود نتیجه می‌گیرد کسانی که در غربالگری شرکت نمی‌کنند بیشتر جزء افرادی هستند که در مورد فواید و اهمیت این اقدام اطلاعات کمتری دارند^(۹).

Ferris تأثیر آموزش را از طریق اطلاعات نوشتاری، بر روی عملکرد زنان مثبت ارزیابی کرد^(۷). علت مشارکت کمتر زنان در پژوهش حاضر، علاوه بر تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اول این که زمان اختصاص داده شده برای مراجعه در این مطالعه فقط ۲ ماه بود، که کمتر از زمان در نظر گرفته شده در اکثر مطالعات دیگر است. دیگر اینکه در غالب پژوهش‌های دیگر، از روش‌های مختلفی برای آموزش استفاده شده، در صورتی که در این مطالعه فقط از جزوای آموزشی بهره گرفته شده است. نهایتاً در این تحقیق به علت محدودیت امکانات در کل شهر تنها یک مرکز جهت مراجعه در نظر گرفته شد، در صورتی که در سایر مطالعات کلینیک‌های مختلف و حتی به صورت سیار در سطح جامعه بدین منظور اختصاص داده شده است. اگر این محدودیت‌ها برای پژوهش

سابقه انجام CBE در گروه تجربی و شاهد به ترتیب $\frac{19}{16}$ % و $\frac{4}{3}$ % که تفاوت معنی دار آماری نداشتند. تفاوت مراجعه جهت CBE در گروه تجربی قبل و بعد از آموزش با استفاده از آزمون مک نمار، اختلاف معنی داری را نشان نداد اما در گروه شاهد این تفاوت معنی دار بود. ($P<0.001$ ، به طوری که $\frac{4}{5}$ % از $\frac{11}{11}$ نفر) از گروه شاهد که قبل از انجام CBE مراجعه نکرده بودند بعد از نصب اطلاعیه در طول مدت دو ماه جهت معاينه مراجعه کرده بودند، در حالیکه $\frac{14}{16}$ % که مراجعه قبلی داشتند در طول مدت مطالعه جهت CBE مراجعه نکرده بودند(جدول ۱). در مقایسه مراجعه معلمین گروه شاهد و تجربی ۲ ماه بعد از توزیع جزوای آموزشی به ترتیب $\frac{6}{3}$ % و $\frac{17}{17}$ % از افراد دو گروه جهت معاينه به کلینیک تعیین شده مراجعه کردند. آزمون مجدد کای اختلاف معنی داری را از نظر مراجعه نشان داد ($P<0.001$). در گروه کنترل بین متغیرهای سن، تحصیلات، ساقه سرطان پستان در خانواده با میزان مراجعه رابطه‌ای وجود نداشت. در حالی که در گروه تجربی فقط بین مراجعه و ساقه سرطان پستان در خانواده رابطه معنی داری وجود داشت ($P<0.05$). به طوری که مراجعه در افرادی که ساقه سرطان پستان در خانواده داشتند ($\frac{32}{44}$) بیش از کسانی بود که این ساقه را نداشتند ($\frac{7}{14}$).

جدول ۱- مقایسه میزان مراجعه معلمین گروههای تجربی و کنترل قبل و بعد از آموزش

نتیجه آزمون مک نمار	مراجعه فعلی		
	مراجعه قبلی	بله	خیر
$P>0.05$	۳۰	۱۸	گروه تجربی بله
	۱۷۹	۲۵	خیر
$P<0.001$	۳۶	۴	گروه کنترل بله
	۱۹۵	۱۱	خیر

جدول ۲- مقایسه میزان مراجعه معلمین گروههای تجربی و کنترل جهت انجام CBE بعد از آموزش

جمع	تجربی			کنترل		گروه مراجه
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
۱۲	۵۹	۱۷/۳	۴۴	۶	۱۵	داشته
۸۸	۴۴۱	۸۲/۷	۲۱۰	۹۴	۲۳۱	نداشته
۱۰۰	۵۰۰	۱۰۰	۲۵۴	۱۰۰	۲۴۶	جمع

و تمايل بيشتر در زنان دارای تحصيلات پاين تر برای شرکت در معاینات^(۲۵،۱۸) وجود دارد. احتمالاً تفاوت های فرهنگی اين جوامع و کافی نبودن عامل تحصيلات به عنوان پيش ييني کننده رفتار می تواند دليل اين گونه مغایرتها در نتيجات مطالعات مختلف باشد. بين متغير سن با مراجعه براساس تحصيلات، ارتباط معنی داری یافت نشد. گرچه چند پژوهشگر ديگر نيز به همین نتيجه دست یافته^(۱۸،۳۵،۳۰،۲۸) اما بعضی مطالعات به شرکت بيشتر زنان مسن تر در برنامه های غربالگری اشاره کرده اند. از طرفی بارتون در مطالعه خود اشاره می کند چون بافت پستان زنان مسن تر از حالت متراكم خارج شده و ميزان چربی آن افزایش یافته، تشخيص توده تو سط CBE نسبت به زنان جوان راحت تر است ضمن آن که اشاره می کند زنان سالمند نسبت به افراد جوان پذيرش كمتری نسبت به ماموگرافی داشته و CBE را راحت تر قبول می کنند^(۵). احتمالاً متفاوت بودن ميانگين سنی و شركت دادن زنان سنين خاص در مطالعات قبلی می تواند دليل به دست آوردن نتایج مغایر باشد. در اين پژوهش در گروه تجريبي بين متغير سابقه سرطان پستان در خانواده و مراجعه رابطه معنی داری وجود داشت. بنابراین همراه با دریافت اطلاعات، وجود فرد مبتلا در خانواده بر شركت بيشتر معلمان اين گروه در CBE مؤثر بوده است. نتایج بعضی از مطالعات نيز نشان می دهد زنانی که در خانواده فرد مبتلا به سرطان پستان را دارند تمايل بيشتری برای شركت در غربالگری ها، نشان می دهند^(۳۷،۳۱).

نتیجه گیری

گرچه ميزان مراجعته در هر دو گروه راضی کننده نمی باشد، اما در عین حال با در نظر گرفتن محدودیت زمانی در نظر گرفته شده، استفاده از جزو اموزشی که روشی کم خرج و ساده است، بدون حضور مستقیم آموزش دهنده توانسته در ترغیب افراد برای شركت در غربالگری مؤثر باشد. مراجعه در گروه تجربی حدود سه برابر گروه شاهد بود که نشان دهنده تأثیر نسبی این شیوه اموزش بر مراجعته می باشد.

References

حاضر وجود نداشت احتمالاً ميزان مراجعته جهت CBE از اين مقدار نيز بيشتر می شد.

گرچه انتظار رفت مراجعته در گروه تجريبي بعد از آموزش به طور معنی داری افزایش يابد، اما چنین نتيجه ای به دست نیامد. در مورد علت احتمالي اين موضوع می توان به محدود بودن مهلت مقرر جهت مراجعته نسبت به قبل از آن که محدودیت زمانی مطرح نبوده و توصیه به انجام CBE در روزهای ۵-۷ قاعده گی اشاره کرد. علاوه بر اين زمان انجام CBE قبل از آموزش به گونه ای بوده که با توجه به دستور العمل اريه شده در جزو آموزشی، در طی دو ماہ نيازی به اقدام مجدد نبوده است.

Sutton و همکاران نيز در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافته، زنانی که طی ۱۲ ماہ قبل از مطالعه برای غربالگری اقدام کرده بودند در مطالعه آنها کمتر جهت غربالگری مراجعته کرده بودند^(۸). تفاوت معنی دار مراجعته در گروه شاهد قبل از نصب اطلاعیه و دو ماه بعد از آن که مراجعته کمتری را بعد از دو ماه نسبت به قبل از آن نشان داد، می تواند ناشی از کوتاه بودن مهلت جهت مراجعته نسبت به قبل از آن، کم بودن فاصله زمانی بين مراجعته قبلی و مهلت تعیین شده و مهمتر از همه عدم ایجاد انگیزه کافی از طریق نصب اطلاعیه باشد.

در گروه کنترل بین متغيرهای سن، تحصيلات، سابقه بیماری در خانواده و مراجعته معلمان جهت CBE رابطه معنی داری وجود نداشت. همین طور بین متغيرهای سن و تحصيلات و مراجعته معلمان گروه تجربی نيز رابطه معنی داری یافت نشد. در صورتی که بین متغير سابقه سرطان پستان در خانواده و مراجعته معلمان، در اين گروه رابطه معنی داری وجود داشت ($P < 0.05$) عدم ارتباط بین مراجعته با تحصيلات در هر دو گروه احتمالاً مربوط به نبودن تفاوت چشمگير بین تحصيلات نمونه مورد مطالعه می باشد، به طوری که تحصيلات اكثراً آزمودنی ها از ديليم تا ليسانس بود. در مطالعات قبلی در اين زمينه نتایج متفاوتی از قبيل عدم رابطه بین انجام معاینه و تحصيلات^(۸)، تمايل بيشتر در زنان دارای تحصيلات بالاتر به شركت در غربالگری سرطان^(۳۳،۳۲،۳۱،۳۰،۰۲۹)

- 1- David jill. *Cancer prevention treatment and palliation* london: Chapman and Hall 1995 : 2-16-26-51.
- 2- Ali Nagia. S khalil, Hodaz. *Cancer preventive and early detection among Egyptiant*, Cancer Nursing, vol:19, No:2/996,:8190 .
- 3- Mc Donald, Sharon and et al. *performance and reporting of Clinical breast examination*:A review of the literature, ca:a Cancer Jurnal for Clinicians, New York: Nov/Dec,2004,Vol:54, ISS 6:345.
- 4- Rose Deniel. *Breast cancer*, Led, New York: Churchill Livingstone. 1999 :4-13-39-59-153- 478-289-385-418-625-780.
- 5- Nivchols. Bs, Misra R, Alexy B. *Cancer detection: How effective is Public education?* Cancer Nursing. Vol:19,No:2 , 1996: 98-103.
- 6- Stoll Basill H: *Reducing breast cancer Risk in woman*. Bled, Boston: klawer, Academic Publishers 1995: 7-158-187.
- 7- Stetz KM, Haberman MR, Holcombe J, jones LS. 1994 Oncology Nursing society research priorities survery:Ong,vol:22,No:5,1995:785-9.
- 8- Lipman, Marc, *Diagnosis and management of Cancer*: Phigadelphia: WB Sunders company, 1988 :10,488.
- 9- Harris Dawne M, Jane E, Miller, Diane M. Davis: *Racial differences in breast cancer screening, knaowledge and compliance*, Journal of the National Medical Association, Aug 2003,VOL: 95.ISS8, 693
10. Phillips Jance M and wilbur, joellen, *Adherance to Breast cancer screening guiddelines among African American woman of differing employment status*, Cancer Nursing, Vol: 18, No:4, 1995: 258- 269
- 11- Lawrence. *Halc. History, physical examination and Education in Breast self Examination* . Clinical Obstetrics and Gynecology , vol:73 No:4 , 1994: 884-886
- 12- Beisecker, Analee E, Hayes Jeanne, Ashworth. Janet and Reese, Pennyl. *Providing information about Breast cancer via public* Cancer detection and prevention. 1997: Vol:21, No:7 370-379 .
- 13- Baron, Roberta H and walsh .*9 facts Every one should know About Breast cancer* . Agn, Vol:95, No:7, 1995:570 .
- 14- saslow Debbie and Judy Hannan, janet O Such, *Clinical Breast examination: Parctical recommendations for optimizing Performance and reporting*, ca: a cancer Journal for Clinicians, 2004, Vol:ISS: 6, 327-344.
- 15- Wolf.John N. *Breast cancer screening*. A brief historical review. Breast Cancer Research and Treartment. Vol:18 ,No:1 ,1991: 589-590.
- 16- Medical Devices and surgical Technology week, *Breast Cancer screening*; Clinical Breast Examination is an important Part of screening, Atlanta: Sep 14,2003: 280.
- 17- Baines, Cornelia and Mary b barton, Lamar Mc. Ginnis. *How to perform an effective Clinical Breast exam patient care*, Mississauga: Nov, 2002, vol:13, 1ss:17: 66 .
- 18- Scott, James R, Ronold S. Gibbs, Beth Y. Karlan, Arthur F. Haney, Don forth's *Obstetrics and Gynecology*, 9th ed, Lippincott. Williams and wilkins, Philadelphia,2003: 893- 894.
- 19- Breast Cancer : *Modeling breast-screening study data shows mamography breast exams benefits, obesity*, fitness and wellness weaker, Atlanta: Aug . 28, 2004: 127.
- 20- Barton, Mary B, Russell Harris, Suzanne W Fletcher, *Dose this patient have breast cancer?* , JAMA, Oct 6, 1999, vol:282, 1ss:13: 1210, 11 .
- 21- Haerris, Russel and kinsinger, Linda s, *Routinely teaching breast self examination is dead*, what dose this mean Journal of the National

- Cancer Institue ,Oct 2, 2002, Vol:94, 1ss:19, 3:1420
- 22- Biger C, Epstein L, Hagoel. L, Robinson E. *An evaluation of an education program for prevention and early diagnosis on israel*, European-j, Cancer preven ,vol:3, No:4, 1996:305-12 .
- 23- Pitts Marina :*The psychology of preventive Health*, Led.Londin :Routledge. 1996: 1-32 .
- 24- Yi Jenny K. *Acculturation and pap smear screening practices among college-aged vietnamese women in the united states*. Cancer Nursing .Vol:21.No:5.1998: 336-340
- 25- kernohan.EEM. *Evaluation of a pilot study for Breast and cervical cancer screening with Brodfrds minority etnic women*: a community development approach, 1991.93 Br. J. of Cancer. Vol:74,1996: S 42-s 46 .
- 26- Roberson, Noma I, *Breast cancer screening in older black women*. Cancer supplement. Vol:74, No:7, 1994: 2034-2041.
- 27- Ferris, Neville H. Gordon,L. Jeannine petry,arks.Litaker, Marcia Nackenson and Lisa D. wood ward. *Effectiveness of Breast self examination prompts on oral contraceptive pakagin*. The Journal of Family Practice. Vol:42, No:1, 1996: 43-48
- 28- Sutton, stephen Bickler G, Sancgo, Aldridge. *Prospective study of predictors of attendance for breast screening inner london*. Journal of Epidemiologvan Community Health. Vol:48, 1994: 66-73
- 29- Vernon, Victor G. Vogel, Susan Halabi, ilehristv L. Jackson, Ray O.Lundy and Georg W. Peters. *Breast cancer screening behavior and Attitudes in three Racial*. Ethinc Groups, Cancer, Jun.1, 1992, vol:69, No:1, 1991: 165-174.
- 30- Spradley Barbara walton: *Comunaity health Nursing concepts and practice*. 3ed. Llinois scott: Brawn higher Education. 1990: 67.32)lerman
- Caryn and et al, Factors Associated with Adherence 10 Breast cancer screening, preventive Medicine . vol:19,1990: 280
- 31- Rimer.Joellen M Schildkraut, Caryn lerman, Ting Hsiang. *Participation in a womans Breast cancer risk conselling Trial*.Who Participantes? Who Declines?American Cancer society. Vol:77, No:11, 1996: 2348-2355.
- 32- Lerman. Caryn Barbara Rimer, Bruce trock, Andrew balshem and Paul F.Engstrom. *Factors Associated with Repeat Adherence to Breast Cancer screening*, Preventive Medicine. Vol:19,1990:279-290.
- 33- Bostick, Reberd M,J.Michael sprafka, Beth A. Viring and John D.Potter. *Predictors of cancer prevention Attitudes and participation in cancer screening Examination*, Preventive Medicine, vol:23, 1994:816-826.
- 34- Rodriguez, carmen. Mtoni Plasencia and Drik G. Schroeder. *Predictive Factors of enroilment and adherence in a breast cancer screening program in Barcelon* (SPAINO, Research), vol:40, No:8, 1995: 1155-1160
- 35- Cockburn Jill, Marg Sutherland, Marco Cappiello and Mary Hevern. *Predictors of attendance at a relocatable Mamography service for rural Woman Australian And New zeland* Journal of Public Health.Vol: 21, No:7, 1997:739-742.
- 36- Sensiba, Marg Elizabeth and stewart Dorothys, *Relationship of Percived Barriers to Breast self- Examination in women of varying Ages and Levels of Education*.ONF.Vol:22, No:8, 1995:1267-68.
- 37- Baines, Corn .lia and To Teresa, *Changes in Breast self Examination Behavior Achived by 89.835 participants in canadian Nationalsal Breast screening study*, Cancer, vol:6, No:3,1990: 270-276.

