

## مقاله خود آموزی

بر اساس تصویب اداره کل آموزش مدام جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پاسخ دهنده‌گان به پرسش‌های مطرح شده در این مقاله اعم از پزشکان عمومی، متخصصین بیماریهای داخلی، کودکان و بیماریهای عفونی ۱/۵ امتیاز تعلق می‌گیرد

### آسپیراسیون جسم خارجی

دکتر ابوالحسن حلوانی<sup>\*</sup>، دکتر پانتهه میرمحمدی<sup>۱</sup>

۱- استادیار گروه داخلی، فوق تحصص ریه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi بزد

۲- دستیار بیماریهای قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi بزد

#### اهداف آموزشی

هدف این مقاله خود آموزی آشنا کردن بیشتر پزشکان با علائم بالینی و روش‌های تشخیصی آسپیراسیون جسم خارجی بوده تا بتوانند این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص دهنند چون تأخیر در تشخیص آن باعث عوارض متعدد و جبران ناپذیری می‌شود.

#### چکیده

آسپیراسیون جسم خارجی یکی از علل مهم مرگ و میر در کودکان زیر ۵ سال به شماره رفت و یکی از موارد اورژانس پزشکی است. در بزرگسالان نادر و معمولاً با تأخیر تشخیص داده می‌شود. اکثر بیماران به علت سرفه و خلط و تنگی نفس مزمن مراجعه می‌نمایند. سابقه حالت خفگی ناگهانی در تعداد کمی از موارد دیده می‌شود. اساس تشخیص آسپیراسیون جسم خارجی بر پایه ظن بالینی بالا و گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی دقیق است. مهمترین یافته در گرافی سینه پر هوایی یکطرفه در گرافی دمی و به دام افتادن هوا در گرافی بازدمی است. گرافی سینه نرمال رد کننده این تشخیص نیست. در مواردی که مشکوک به این تشخیص بوده ولی گرافی سینه نرمال است بایستی از روش‌های تصویربرداری تکمیلی استفاده نمود. هر چند برونکوسکوبی ری ژید بهترین روش تشخیص و درمان این عارضه بوده ولی در موارد زیادی می‌توان از برونکوسکوبی فیراپتیک نیز در این جهت استفاده کرد.

\* (نویسنده مسئول)؛ تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۲۴۰۰۰؛ پست الکترونیکی: halvani47@yahoo.com

### معرفی بیمار



شکل (۱)



شکل (۲)

**اپیدمیولوژی:** آسپیراسیون جسم خارجی بیشتر در کودکان روی داده و در بزرگسالان نادر و معمولاً با تأخیر تشخیص داده می شود(۲). بر اساس تجربه ۲۰ ساله یک مرکز در ۱۱۲ بیمار مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی، ۷۵٪ کودک و ۲۵٪ بزرگسال بودند در این گزارش بیشترین موارد آسپیراسیون در کودکان در سن ۲ سالگی و در بزرگسالان دهه ششم عمر بود(۳). کودکان به دلیل نداشتن دندانهای آسیا(مولار) و در نتیجه جویدن نامنا سب غذا واز طرفی انجام فعالیتهای مختلف از جمله حرف زدن، خندیدن و حتی دور خود چرخیدن حين غذا خوردن بیشتر در خطر آسپیراسیون هستند. حس کنگکاوی و وجود فاز دهانی در بچه های یک تا سه ساله احتمال عارضه فوق را بیشتر می کند. آسپیراسیون در بزرگسالان معمولاً در زمینه اختلال رفلکس بلع

بیمار مردی ۳۸ ساله که با شکایت سرفه از ۳ سال پیش مراجعه کرده بود. سابقه آلرژی و بیماری ریوی را ذکر نمی کرد. در این مدت چند نوبت دچار عفونت تنفسی شده و با تشخیص آسم و پنومونی درمان گرفته ولی بهبودی واضحی نداشته و سرفه وی ادامه داشت در آخرین مراجعه در معاینه متوجه نامتقارن بودن شدت ویز دوریه شده به طوری که هر چند ویزدر هر دو ریه سمع شده ولی شدت آن در سمت راست بیشتر بود. از طرفی در گرافی ساده قفسه سینه بیمار ریه راست پر هوای بود(شکل ۱). جهت بیمار سی تی اسکن درخواست شد که این موضوع را تأیید و از طرفی نقش پر شدگی در مدخل برونش اصلی راست نشان داد(شکل ۲). با شک به آسپیراسیون جسم خارجی، بیمار تحت برونکوسکوپی فیراپتیک قرار گرفت که جسم خارجی (قطعه ای از قالب دندان مصنوعی) در مدخل برونش اصلی راست مشاهده شده و خارج گردید و پس از آن شکایات تنفسی وی به طور کامل بر طرف شد(شکل ۴). پس از اخذ شرح حال دقیق از بیمار و اطرافیان، وی سابقه بیماری صرع داشته و متعاقب یکی از حملات تشنج سرفه های وی شروع شده بود. در آن زمان متوجه گم شدن قطعه ای از قالب دندان مصنوعی شده ولی به آن اهمیت نداده و در شرح حال گیری های قبلی یا این مورد سوال نشده و یا اطلاعی از آن موضوع داده نشده بود.

### مقدمه

آسپیراسیون جسم خارجی یکی از علل مهم مرگ و میر در کودکان زیر ۵ سال به شمار رفته و یکی از موارد اورژانس پزشکی است. بر طبق آمار موجود در ایالات متحده امریکا سالانه ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد مرگ و میر ناشی از آسپیراسیون جسم خارجی روی داده که نیمی از این موارد در کودکان زیر ۴ سال بوده است(۱). در بزرگسالان ممکن است تا چندین سال تشخیص داده نشده و به اشتباه به عنوان آسم، پنومونی راجعه، برونشکتازی و یا حتی تومور درمان شود(۲). تنها با ظن بالینی بالا می توان آن را در مراحل اولیه تشخیص داد و در صورت تأخیر در تشخیص عوارض متعدد و جبران ناپذیری ایجاد خواهد شد. لذا با توجه به اهمیت موضوع آشنایی هرچه بیشتر با این پدیده توصیه می گردد.

**یافته‌های تصویر بوداری:** از آنجاییکه بیشتر اجسام خارجی آسپیره شده مواد غذایی بوده که رادیولوست هستند، تنها در ۱۶٪ موارد می‌توان مستقیماً جسم خارجی را در گرافی ساده ریه دید<sup>(۶)</sup>. اغلب یافته‌های غیر مستقیم ناشی از آسپیراسیون شامل پر هوایی (Over inflation) و یا آتلکتازی ریه مسدود در گرافی سینه کمک کننده است. در صورتیکه جسم خارجی به طور کامل راه هوایی را بیند رادیوگرافی علائم کلپس را نشان داده چون هوای باقیمانده جذب می‌شود ولی اگر انسداد نسبی باشد منطقه انسداد به صورت دریچه توپی (Ball valve) عمل کرده که منجر به پر هوایی ریه در گیر می‌شود در این حالت در محل انسداد دم انجام شده ولی بازدمی صورت نمی‌گیرد. گاهی تنها یافته گرافی به دام افتادن هوا (Air Trapping) در بازدم است<sup>(۱)</sup>. لذا در صورتیکه مشکوک به آسپیراسیون جسم خارجی بوده و یافته‌های فوق الذکر مشاهد نشد گرافی سینه در بازدم عمیق درخواست می‌شود<sup>(۷)</sup>. اغلب تهیه این گرافی در کودکان کم سن مقدور نیست. راه دیگر اثبات به دام افتادن هوا، گرافی لترال دکوبیتوس است<sup>(۵)</sup> که در بچه‌هایی که همکاری جهت تهیه گرافی در بازدم عمیق ندارند می‌توان از آن استفاده کرد. در این حالت تشخیص بر مبنای وجود پر هوایی و هیپر لومنسنسی در ریه قرار گرفته بر روی میز رادیوگرافی (ریه پایین تر) است (در حالت عادی انتظار داریم ریه پایین تر به علت افزایش گردش خون لومنسنسی کمتری داشته باشد). از دیگر یافته‌های موجود در گرافی ساده ریه می‌توان به اتلکتازی، شیفت مدياستن، آمفیزم جبرانی در ریه سالم، پنومونی و یا پنوموتوراکس در سمت در گیر اشاره کرد<sup>(۶)</sup>. در بیماران دچار استریدور یک گرافی لترال گردن جهت رویت جسم خارجی ممکن است کمک کننده باشد<sup>(۳)</sup>. در ۱/۳ موارد ممکن است گرافی دم و بازدم نرمال باشد<sup>(۸)</sup>. پس همیشه گرافی ساده کمک کننده نخواهد بود. سی تی اسکن ریه در تشخیص و تعیین محل اجسام خارجی آسپیره شده بسیار دقیق است و در صورتی که گرافی‌های ساده کمک کننده نبود روش تشخیصی بعدی است<sup>(۹)</sup>. همچین فلوروسکوپی قفسه سینه نیز در نشان دادن هوای گیرافتاده در محل انسداد و حرکات پارادوکس دیافراگم و

ناشی از اختلالات نورولوژیک مانند تشنج، سکته مغزی، پارکینسونیسم، شرایط بیهوشی عمومی، دمانس پیری و مصرف داروهای سداتیو والکل است<sup>(۲)</sup>.

شایع ترین مواد آسپیره شده خوراکی‌ها هستند ولی آمار مربوط به جوامع مختلف تا حدی متفاوت است. شایع ترین ماده آسپیره شده در کشورهای آسیایی قطعات استخوانی<sup>(۲،۳)</sup> ولی در کشورهای اروپایی مواد آلی از جمله بادام زمینی بوده‌اند<sup>(۴)</sup>. اسباب بازیهای کودکان، سکه و یا حتی دندان نیز ممکن است آسپیره شوند<sup>(۱،۲)</sup>. در بیشتر مطالعات انجام شده در آمریکا برتری جنسی آسپیراسیون با آقایان است<sup>(۱)</sup>.

زاویه برونشهای اصلی راست و چپ از تراشه تا ۱۵ سالگی برابر بوده به همین دلیل در این گروه سنی احتمال آسپیراسیون اجسام خارجی در برونمش اصلی دو طرف یکسان است. پس از آن با رشد طبیعی فرد زاویه برونمش چپ با تراشه بیشتر شده و برونمش اصلی راست زاویه کمتری خواهد داشت بنابراین در بزرگسالان برونمش اصلی راست شایع ترین محل آسپیراسیون خواهد بود<sup>(۱)</sup>.

**علائم بالینی:** اکثر بیماران به علت سرفه و خلط و تنگی نفس مزمن مراجعه می‌نمایند<sup>(۳)</sup>. در یک گزارش سری از ۴۳ بزرگسال با سابقه آسپیراسیون ۶۷٪ سرفه، ۲۳٪ هموپیزی و ۱۹٪ تنگی نفس داشتند در حالیکه سابقه حالت خفگی ناگهانی تنها در ۷٪ موارد دیده شده که این منجر به تأخیر تشخیص به خصوص در بزرگسالان می‌شود<sup>(۲)</sup>. گاهی در همان ابتدا عوارض حادی از جمله تنگی نفس، خفگی، ایست قلبی، پنوموتوراکس و ادم حنجره ایجاد می‌شود<sup>(۵)</sup>. یافته‌های معاینه فیزیکی متفاوت است. در موارد آسپیراسیون اجسام خارجی در تراشه استریدور دمی به طور شایع وجود دارد. رونکای، ویز و کاهش یکطرفه صدای تنفسی در موارد آسپیراسیون به راههای هوایی تحتانی وجود دارد<sup>(۲)</sup>.

تشخیص معمولاً با وجود یافته‌های معاینه فیزیکی و از آن مهمتر در زمینه شرح حال تیپیک بیماری است. در مواردی که دو مورد بالا کمک کننده نبوده ولی ظن بالینی بالا باشد بایستی از مطالعات تصویربرداری استفاده نمود.

مونیتور قلبی، پالس اکسیمتری و رگ محیطی برقرار کرد. در بیماران دچار استریدور تجویز اپی نفرین راسمیک از طریق نبولایزر تا قبل از انجام بروونکوسکوپی کمک کننده است. بروونکوسکوپی بهترین روش تشخیصی و درمانی آسپیراسیون جسم خارجی است. معمولاً از نوع ری ژید(شکل ۷) جهت خارج کردن و از نوع فیراپتیک جهت تشخیص استفاده می شود(۱۰). از نوع فیراپتیک در موارد ترومای سر و گردن و همچنین در مواردی که جسم خارجی در برونش ساب سگمنتال قرار گرفته جهت درمان استفاده می شود. در مجموع هرچند به طور مرسوم از بروونکوسکوپی ری ژید در جهت تشخیص و درمان این عارضه استفاده می شود ولی مطالعات اخیر میزان موفقیت روش فیراپتیک را مشابه روش ری ژید نشان داده و در صورت داشتن تجربه کافی می توان از روش فیراپتیک که نیاز به بیهوشی عمومی نداشته در این جهت استفاده کرد(۱۱،۱۲). در ۹۸٪ موارد با بروونکوسکوپ می توان جسم آسپیره شده را خارج کرد ولی در صورت شکست این روش توراکوتومی لازم خواهد بود. در صورتی که جسم خارجی بزرگتر از منطقه ساب گلوتیک باشد تراکنستومی ممکن است انجام شود. استروئید و آنتی بیوتیکها به صورت روئین قبل از بروونکوسکوپی لازم نبوده ولی در صورت وجود التهاب شدید و یا شواهدی به نفع عفونت راه هوایی استفاده می شود. در صورتی که بیمار مشکل اورژانسی حاد و یا عوارضی چون پنومونی، آبسه ریوی و یا هیپوکسی پایدار نداشته باشد، می توان در همان روز بیمار را از بیمارستان مرخص نمود.

**عوارض آسپیراسیون جسم خارجی:** آتلکتازی در زمینه انسداد طولانی مدت راه هوایی، برونشکتازی در زمینه عفونت مزمن ریوی، آبسه ریه، پنومومدیاستن و پنوموتوراکس عوارض آسپیراسیون جسم خارجی می باشد که البته دو عارضه اخیر بسیار نادر هستند. شدت این عوارض بستگی به اندازه، شکل، ترکیب ماده آسپیره شده، محل و همچنین میزان تأخیر در تشخیص دارد. آسپیراسیون مواد آلی به دلیل ایجاد حساسیت با عوارض بیشتری همراه است و تأخیر در تشخیص آسپیراسیون نیز تعداد عوارض و شدت آنرا بیشتر خواهد کرد. جسم خارجی هرچه زودتر برداشته شود(به ویژه در ۲۴ ساعت اول) بهبودی بیمار هم به همان نسبت

شیفت مدیاستن کمک کننده است.



شکل ۳



شکل ۴

**تشخیص افتراقی:** شامل آسم حاد، برونشیت، برونشیولیت، پنومونی آسپیراتیو، پنومونی باکتریال، آمپیم، آبسه ریه، کروب، اپی گلوتیت، سیاه سرفه و لارنژیت می باشد(۱۰،۱۱).

**درمان:** در صورتی که بیمار مبتلا به آسپیراسیون دچار سرفه، خس خس سینه و یا استریدور شده ولی راه هوایی وی برقرار باشد نبایستی اطرافیان سعی به خارج کردن جسم خارجی کنند چون ممکن است باعث جابجایی جسم خارجی و انسداد کامل راه هوایی شود در این حالت باید بیمار را سریعاً به نزدیکترین بیمارستان منتقل نمایند. ولی اگر وضعیت راه هوایی بیمار نامناسب و یا انسداد کامل رخ داده باشد باید از مانورهای همیixin و ضربه به پشت برای خارج کردن جسم خارجی استفاده کرد. البته هر کدام از این مانورها در گروه سنی خاصی کاربرد دارند. پس از رسیدن بیمار به بیمارستان باید اکسیژن برای بیمار تجویز و

به اين تشخيص بوده ولی گرافى سينه نرمال بود بايستى از سريعتر و كاملتر خواهد بود(۹).  
**نتيجه گيري**  
 اساس تشخيص آسپراسيون جسم خارجي بر پايه ظن باليني بالا و گرفتن شرح حال و انجام معاینه فيزيكى دقیق است. گرافى سينه نرمال رد كننده اين تشخيص نیست. در مواردی که مشکوك

برونکوسکوپي رى ژيد بهترین روش تشخيص و درمان اين عارضه بوده ولی در موارد زيادي می توان از بروونکوسکوپي فيراپتىك نيز در اين جهت استفاده كرد.

**منابع:**

- 1- Limper AH, Prakash UB. *Tracheobronchial foreign bodies in adults*. Ann Intern Med 1990; 112:604-9.
- 2- Chen CH, Lai CL, Tsai TT, Lee YC, Perng RP. *Foreign body aspiration into the lower airway in Chinese adults*. Chest 1997; 112:129-33.
- 3- Lan RS. *Non asphyxiating tracheobronchial foreign bodies in adults*. Eur Respir J 1994; 7: 510-4.
- 4- Baharloo F, Veyckemans F, Francis C, Biettlot MP, Rodenstein DO. *Tracheobronchial foreign bodies: presentation and management in children and adults*. Chest 1999; 115:1357-62.
- 5- Tarka M, Antilla S, Sutinen S. *Bronchial stenosis after aspiration of an iron tablet*. Chest 1988; 93:439-41.
- 6- Cantaneo AJ, Reibscheid SM, Ruiz Junior RL, Ferrari GF. *Foreign body in the tracheobronchial tree*. Clin Pediatr 1997; 36:701-6.
- 7- Hansel DM, Armstrong P, Lynch DA, McAdams HP. *Inhalation of foreign bodies. Imaging of diseases of the chest*. Elsevier MosBY; 2005:474-7.
- 8- Avital A, Springer C, Meyer JJ, Godfrey S. *Case report: hollow bone in the bronchus or the danger of chicken soup*. Respiration 1992; 59:62-3.
- 9- Patel S, Kazerooni EA. *Foreign Body Aspiration-Chicken Vertebra*. Radiology. 2001; 218:523-5.
- 10- Casson AG, Guy JRF. *Foreign body aspiration in adults*. Can J Surg 1987; 30:193-4
- 11- Ramirez F JL, Gochicoa R LG, Ramirez SJ DH, Vargas MH. *Foreign body removal by flexible fiberoptic bronchoscopy in infants and children*. Pediatr Pulmonol 2005; 40(5):392-7.
- 12- Lain A, Fanjul M, Garcia C MA, Parente A, Canizo A, Carreras N, et al. *Airway foreign bodies removal with flexible bronchoscopy in children*. Cir Pediatr 2007; 20(4):194-8.

## سؤالات خودآموزی آسپیراسیون جسم خارجی

- ۶- در مرد ۴۰ ساله‌ای که به طور حد دچار سرفه‌های شدید و تنگی نفس شده است و به درمانهای متداول آسم پاسخ نمی‌دهد وجود کدام گزینه زیر در شرح حال بیمار جهت آسپیراسیون جسم خارجی کمک کننده است؟
- الف- سرماخوردگی شدید
  - ب- بیماری قلبی عروقی
  - ج- پارکینسون
  - د- سن بیمار
- ۷- شایع ترین سن بروز آسپیراسیون جسم خارجی کدام است؟
- الف- بعد از ۵۰ سالگی
  - ب- ۱ تا ۷۰ سالگی
  - ج- دوره بلوغ
  - د- ۱ تا ۳ سالگی
- ۸- جهت خروج جسم خارجی از راه هوایی بیمار روش ارجح کدام است؟
- الف- برونکوسکوپی ری ژید
  - ب- توراکوتومی
  - ج- برونکوسکوپی فیر اپتیک
  - د- هیچکدام
- ۹- کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟
- الف- در اطفال جسم خارجی به یک میزان در هر دو برونش اصلی دیده می‌شود.
  - ب- معمولاً در آسپیراسیون جسم خارجی آنتی بیوتیک داده می‌شود.
  - ج- مواد آلی آسپیره شده نسبت به مواد غیر آلی با عوارض بیشتری همراه استند.
  - د- جسم شایع آسپیره شده بر حسب منطقه جغرافیایی متفاوت است.
- ۱۰- کدام یک از روشهای زیر به صورت دینامیک معرف وجود جسم خارجی است؟
- الف- گرافی بازدمی ریه
  - ب- فلوروسکوپی
  - ج- سی تی اسکن
  - د- ام.ار.ای

- ۱- کدام یک از یافته‌های ذکر شده در گرفتاری ریه جهت آسپیراسیون جسم خارجی تشخیصی قریبی باشد؟
- الف- شیفت مدیاستن به سمت ریه مبتلا
  - ب- وجود کدورت در ریه مبتلا
  - ج- پرهوایی ریه مبتلا حین بازدم
  - د- پنوموتوراکس
- ۲- کودکی که حین بازی با بادکنک دچار حالت خفگی شده دو ساعت بعد به دلیل تنگی نفس و منقطع صحبت کردن موجب نگرانی والدینش شده است در این وضعیت کدام یک از اقدامات زیر اشتباه است؟
- الف- انتقال هر چه سریع تر کودک به بیمارستان
  - ب- سعی به خارج کردن جسم خارجی با انگشت
  - ج- ضربه زدن متواالی به پشت کودک
  - د- حفظ ارامش خود و اطرافیان
- ۳- گزینه صحیح کدام است؟
- الف- در ۱۶٪ موارد، جسم خارجی در گرافی ساده ریه دیده نمی‌شود.
  - ب- بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از آسپیراسیون جسم خارجی در شیرخواران دیده می‌شود.
  - ج- برونش اصلی چه شایع‌ترین محل آسپیراسیون در بزرگسالی می‌باشد.
  - د- در اکثر بزرگسالان مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی سابقه حالت خفگی وجود ندارد.
- ۴- بهترین روش تصویر برداری در کودک ۲ ساله مشکوک به آسپیراسیون جسم خارجی کدام است؟
- الف- گرافی قدامی خلفی بازدمی ریه
  - ب- گرافی لترال ریه
  - ج- گرافی لترال دکوبیتوس ریه
  - د- هیچکدام
- ۵- کدام یک از علایم بالینی زیر در بیمار مشکوک به آسپیراسیون جسم خارجی اهمیت بیشتری دارد؟
- الف- تاکیکاردنی
  - ب- سرفه
  - ج- ویز ریوی یکطرفه
  - د- تاکی پنه

بسمه تعالى

قابل توجه شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی:

شرکت کنندگان در برنامه خودآموزی لازم است فرم ثبت نام را بطور کامل تکمیل و به مهر نظام پزشکی ممهور نمایند و پس از مطالعه مقاله خودآموزی بعد از پاسخگویی به سوالات پرسشنامه و اعلام نظر خود درخصوص مقاله مطالعه شده در فرم نظرخواهی نسبت به ارسال اصل هر سه فرم تکمیل شده حداقل تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به آدرس : یزد - میدان باهنر - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی - دفتر مجله علمی پژوهشی اقدام نمایند تا در صورت پاسخگویی صحیح به حداقل ۷۰٪ از سوالات مقاله، گواهینامه شرکت در برنامه خودآموزی صادر و به آدرس مندرج در فرم ثبت نام ارسا گردد.

بسمه تعالى

جمهوری اسلامی، ایران

## وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی - اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

## فرم ثبت نام در پنامه خودآموزی

نام نشریه:

صادره از:

شماره شناسنامه:

شناوه

## عنوان مقاله: آسپیراسیو جسم خارجی

نام خانوادگی: نام: نام پدر:

تاریخ تولد:

محل فعالت: استان: شهر س

نوع فعالیت: هیات علمی ○ آزاد ○

مقطع آخر بن مدر ک تحصله و سال اخذ مد  
نوع تعاویت: نیات علمی از ارادت

١- شته تحصله ، مقاطع : لسانی : فوہ ل

رسه شخصیی ر مقاطع . یساس . آداس دقیق است :

امضاء، شماره نظام بن شکر و مهر متقارض :

امضاء و مهر مسئول ثبت نام

نظری نارم	کلاماً مخالفم	تاجدی مخالفم	تاجدی موافقم	کاملاً موافقم	خواهشمند است نظر خود را با گذاردن علامت(×) در زیر گزینه مربوطه اعلام نماید
					<p>۱- محتوای مقاله براساس منابع جدید علمی ارایه شده است.</p> <p>۲- محتوای مقاله با نیازهای حرفه ای من تناسب داشته است.</p> <p>۳- محتوای مقاله در جهت تحقق اهداف آموزشی نوشته شده است.</p> <p>۴- در محتوای مقاله شیوه ای و سهولت بیان در انتقال مفاهیم رعایت شده است.</p> <p style="text-align: right;">- سه عنوان پیشنهادی خود را برای ارایه مقالات خود آموزی ذکر نماید</p>