

## بررسی جنبه هایی از اپیدمیولوژی لیشمینیوز پوستی در کانون جدید شهرستان خاتم، استان یزد

۵. کتر محمد رضا یعقوبی ارشادی<sup>\*</sup>، نرگس مروی مقدم<sup>۲</sup>، رضا جعفری<sup>۳</sup>، امیر احمد اخوان<sup>۴</sup>، حسن سلیمانی<sup>۵</sup>، علیرضا زهرا فی رضانی<sup>۶</sup>، محمد حسین آزادیان<sup>۷</sup>، دکتر علیرضا دهقان دهنوی<sup>۸</sup>

### چکیده

مقدمه: لیشمینیوز پوستی روستایی از مهمترین بیماریهای انگلی در ایران است که در نواحی روستایی ۱۵ استان از ۳۰ استان کشور به صورت اندیمیک وجود دارد. در سالهای اخیر لیشمینیوز پوستی روستایی یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی استان یزد به حساب می آید. به دنبال ایدمی این بیماری در شهرستان خاتم مطالعاتی در زمینه عفونت انسانی و مخازن حیوانی این بیماری انجام گرفت.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۵ صورت گرفت. جهت بررسی شیوع بیماری، اقدام به بازدید خانه به خانه از ۳۰۰ خانوار شامل ۱۳۶۴ نفر در منطقه گردید. در این بازدیدها وضعیت افراد هر خانوار از نظر بیماری بررسی و در فرمهای مخصوص ثبت می گشت. به منظور بررسی فون جوندگان منطقه و تعیین مخازن بیماری در ماههای شهریور، مهر و آبان سال ۱۳۸۵ هر ۱۵ روز یکبار اقدام به نصب ۲۰ عدد تله زنده گیر در مجاورت لانه های فعال جوندگان گردید. جوندگان صید شده، تعیین هویت شده و از نظر آلدگی به انگل لیشمینیا مورد آزمایش قرار گرفتند. ماهیت انگل جدا شده از انسان و جوندگان با آزمایش RAPD-PCR تعیین گردید.

نتایج: میزان ابتلاء به زخم حاد و جای زخم سالک در بین خانوارهای بررسی شده به ترتیب ۹/۸ و ۴/۸ درصد محاسبه شد. انگل Leishmania major از بیماران این منطقه جداسازی و تعیین هویت گردید. در طی این بررسی جمعاً ۱۵ سر جوندگان از گونه های Tatara indica و Rhombomys opimus، Meriones libycus از رومبومیس اپیموس نیز جدا سازی و تعیین هویت گردید.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که لیشمینیوز جلدی روستایی با عامل Leishmania major در شهرستان خاتم شایع شده است. به نظر می رسد رومبومیس اپیموس به عنوان مخزن اصلی به همراه مریونس لیکوس و تاترا ایندیکا در نگهداری این کانون نقش داشته باشد.

**واژه های کلیدی:** لیشمینیا ماژور، لیشمینیوز پوستی روستایی، خاتم، یزد

### مقدمه

لیشمینیوز جلدی یکی از بیماریهای انگلی منتقله توسط پشه خاکی ها در ایران است و کانون های آن در نقاط مختلف کشور وجود دارد. روند میزان بروز بیماری با توجه به آمار های اداره کل پیشگیری و مراقبت بیماریها از سال ۱۳۶۶ با میزان ۱۴ در هزار نفر جمعیت روند رو به کاهشی داشته ولی متأسفانه بعد از سال ۱۳۶۸ افزایش نشان می دهد<sup>(۱)</sup>. در ایران لیشمینیوز جلدی روستایی در نواحی روستایی ۱۵ استان از ۳۰ استان کشور به

- \*- نویسنده مسئول: استاد گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین - دانشکده بهداشت و انتیتو تحقیقات بهداشتی - تلفن: داخلی ۰۲۱-۶۶۴۵۰۴۰-۲۱؛ داخلی ۰۲۱-۸۸۹۵۱۳۹۳؛ Email: yagoobia@sina.tums.ac.ir
  - ۱- دانشجویی کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  - ۲- کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  - ۳- کارشناس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  - ۴- مربی گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  - ۵- کارشناس حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  - ۶- تکنسین حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
  - ۷- پزشک، مسئول گروه مبارزه با بیماریها، مرکز بهداشت استان یزد
  - ۸- انتیتو تحقیقات بهداشتی، مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی اصفهان
  - ۹- انتیتو تحقیقات بهداشتی، مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی یزد
  - ۱۰- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  - ۱۱- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
- تاریخ دریافت: ۱۳۸۵/۱۲/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۴/۲۸

شهر به نامهای مروست و هرات و ۴ دهستان به نامهای فتح آباد، هرآبرجان، چاهک و ایشار می‌باشد. مشاغل عمده در این شهرستان شامل کشاورزی، دامداری و مشاغل خدماتی، اداری و داد و ستد می‌باشد (آمارنامه سال ۱۳۸۳ استان یزد).

ب- بررسی عفونت انسانی: به منظور بررسی شیوع لیشمانيوز جلدی، در ماه بهمن اقدام به بازدید خانه به خانه از ۳۰۰ خانوار شامل ۱۳۶۴ نفر (۶۹۶ مرد و ۶۶۸ زن) در روستاهای فتح آباد، هرآبرجان و شهر مروست گردید. در این بازدیدها، وضعیت افراد هر خانوار از نظر این بیماری بررسی شد. در فرمهای ویژه خانوار، تعداد افراد خانوار، افراد سالم، افراد مبتلا به بیماری، سن، جنس، وضعیت بیماری (زخم حاد یا اسکار)، محل و تعداد زخم، زمان و محل ابتلاء ثبت می‌گردید. در مورد افرادی که ضایعه مشکوک داشتند، از ضایعه آنها نمونه برداری و به روش گیمسارنگ آمیزی انجام گرفت. هم‌مان با بازدید خانه به خانه، کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی در این مناطق از نظر شیوع بیماری بررسی شدند. در نهایت پس از بررسی خانه به خانه و مدارس، اطلاعات استخراج و آنالیز آماری با استفاده از آزمون مجدور کای و برنامه نرم افزاری SPSS11.5 صورت پذیرفت. جهت تعیین هویت انگل، از سروزیته زخم ۳ بیمار مبتلا به زخم حاد که سابقه مسافرت به سایر کانون‌های بیماری را نداشتند، برداشت و به قاعده دم ۶ عدد موش c/BALB تلقیح گردید. بعد از ابتلاء موش‌ها و ایجاد زخم از سروزیته آنها برداشت نموده و در شرایط کاملاً استریل در محیط Eshnider+RPMI کشت داده شد. بعد از یک هفته اشکال پروماستیگوت به خوبی رشد کرده و با آزمایش RAPD-PCR ماهیت انگل جدا شده تعیین گردید.

ج- بررسی مخازن حیوانی بیماری: به منظور بررسی فون جوندگان منطقه و تعیین مخازن بیماری در ماههای شهریور، مهر و آبان سال ۱۳۸۵ هر ۱۵ روز یک بار، اقدام به نصب ۲۰ عدد تله سیمی زنده گیر (Sherman) در مجاورت لانه‌های فعال جوندگان در اطراف روستاهای انتخابی گردید. تله‌ها به هنگام غروب آفتاب نصب و صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب جمع آوری می‌شدند. جوندگان صید شده با استفاده از خصوصیات مرفلوزیک و مرفومتریک تعیین هویت شده<sup>(۲۱)</sup> و پس از بیهوشی به وسیله پنبه آغشته به

صورت اندمیک مشاهده می‌شود. حدود ۸۰ درصد موارد لیشمانيوز جلدی در کشور ما مربوط به فرم روستایی است<sup>(۲)</sup>. از کانونهای مهم لیشمانيوز جلدی روستایی در ایران می‌توان به برخوار، نطنز، اردستان، نیک آباد (استان اصفهان)، اردکان، بافق (استان یزد)، سبزوار و اسفراین (استان خراسان رضوی)، ترکمن صحرا (استان گلستان)، ارسنجان (استان فارس)، جنوب استان سیستان و بلوچستان، ابردژورامین (استان تهران)، ارزوئیه (استان کرمان) و همچنین استان ایلام اشاره کرد<sup>(۳-۱۷)</sup>.

در کانون‌های مرکزی و شمال شرقی کشور گونه‌های آلووده به انگل لیشمانيا مژور گزارش شده اند<sup>(۱۹)</sup>. ژریل فعال در جنوب شرق کشور Meriones hurrianae می‌باشد که آلوودگی به این انگل در این گونه به اثبات رسیده است<sup>(۱۴)</sup>. در جنوب غرب کشور نیز Tatera indica آلووده به انگل لیشمانيا گزارش شده است<sup>(۱۷)</sup>. آلوودگی طبیعی به انگل لیشمانيا در Nesokia indica از استانهای خوزستان و اصفهان گزارش گردیده است<sup>(۲۰)</sup>. در سالهای اخیر لیشمانيوز پوستی در استان یزد شایع شده و شهرستان‌های خاتم، بافق، ابرکوه، اردکان، میبد و یزد به طور جدی با این مشکل بهداشتی مواجه شده اند. در این مطالعه عفونت انسانی لیشمانيوز پوستی و مخازن در شهرستان خاتم برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است.

### روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۵ صورت گرفت.

الف- وضعیت جغرافیایی: شهرستان خاتم با مساحت ۷۹۳۱ کیلومتر مربع در جنوبی ترین نقطه استان یزد و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری جنوب شهر یزد واقع شده است. این شهرستان دارای حداقل ۱۵۰۰ متر و حداکثر ۳۰۰۵ متر ارتفاع از سطح دریا می‌باشد و به علت قرار گرفتن در پایانه‌های زاگرس و شروع کویرهای خشک کشور دارای آب و هوای متأثر از آب و هوای کوهستانی یا گرم و خشک است. این شهرستان دارای ۳۲۹۳۳ نفر جمعیت بوده و تراکم جمعیت در آن ۴ نفر در کیلومتر مربع می‌باشد. براساس تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۰ دارای دو

تعداد ۸۱ نفر (۱۱/۶ درصد) مرد و ۶۲ نفر (۶/۳ درصد) زن بودند. بیشترین درصد جای زخم در گروه سنی بالای ۲۵ سال (۱۲/۱ درصد) و کمترین آن در سنین ۴-۰ سال (۱/۸ درصد) مشاهده گردید. از کل اسکارها ۴۸ درصد روی دست، ۳۱ درصد روی پا، ۱۷ درصد روی صورت و ۴ درصد روی سایر نقاط بدن می باشد. از کل افراد دارای جای زخم، ۵۱ درصد دارای ۱ ضایعه، ۲۰ درصد دارای ۲ ضایعه، ۱۱ درصد دارای سه ضایعه و ۱۸ درصد دارای بیش از سه ضایعه بودند.

تعداد دانش آموزان معاینه شده ۷۲۷ نفر (۳۷۹ پسر و ۳۴۸ دختر) و سن آنها بین ۷-۱۵ سال بود. از این تعداد، ۳۶ نفر (۴/۹ درصد) دارای زخم حاد بودند که ۱۸ نفر (۴/۷ درصد) پسر و ۱۷ نفر (۴/۸ درصد) دختر بودند.

از ۴۸ عدد زخم حاد ۱۷ عدد (۳۵ درصد) روی دست، ۱۸ عدد (درصد) روی پا، ۹ عدد (۱۹ درصد) روی صورت، ۲ عدد (۴ درصد) روی گردن و ۲ عدد (۴ درصد) روی سایر نقاط بدن می باشد. از کل مبتلایان به زخم حاد، ۵۵ درصد دارای یک زخم، ۲۱ درصد دارای ۲ زخم، ۱۲ درصد دارای سه زخم و ۱۲ درصد دارای بیش از سه ضایعه می باشند.

با استفاده از آزمایش RAPD-PCR ماهیت انگل جدا شده Leishmania major تعیین گردید.

در طی این بررسی جمعاً ۱۵ عدد جونده توسط تله های زنده گیر Meriones libycus Sherman صید شد. از این تعداد ۱۰ سر Rhombomys opimus (۲۰ درصد) و ۳ سر Tatera indica (۱۳/۳ درصد) بود (نمودار ۱). از لاله گوش تمام جوندگان صید شده به روش سمباده زنی چهار عدد لام تعیین گردیده و از نظر آلدگی لیشمانیایی مورد آزمایش قرار گرفت.

از تعداد ۱۰ سرمیونس لیبیکوس صید شده یک سر (۱۰ درصد) و از ۲ سر تاترا ایندیکا یک سر آن به فرم آماتیگوت انگل لیشمانیا آلدود بودند. همگی ۳ عدد رومبومیس اپیموس صید شده آلدود به انگل تشخیص داده شد.

انگل جدا شده از Rhombomys opimus نیز با استفاده از آزمایش Leishmania major ، RAPD-PCR ماهیت انگل جدا شده تعیین گردید.

کلروفرم، از هر گوش جونده دو عدد لام به روش سمباده زنی تعیین می گردید<sup>(۲۲)</sup>. نتایج تشخیص گونه و آزمایش مستقیم انگل شناسی همراه با شماره، تاریخ و محل صید ثبت می گشت. به منظور تعیین هویت انگل، سروزیته تعیین شده از لاله گوش یک سر رومبومیس اپیموس آلدود برداشت و در شرایط کاملاً استریل RAPD Eshnider+RPMI کشت داده شد و با آزمایش PCR ماهیت انگل جدا شده تعیین گردید.

- آزمونهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها: به منظور مقایسه میزان ابتلاء به بیماری در بین جنس و همچنین گروههای سنی مختلف، از آزمون آماری مجذور کای استفاده شد. در مواردی که شرایط آزمون برقرار نبود از تست دقیق فیشر استفاده گردید. میزان خطأ برای کلیه آزمون های آماری ۵ درصد تعیین گردید( $\alpha=0.05$ ) برای انجام تست های آماری مورد نظر از برنامه نرم افزاری SPSS(11.5) استفاده شد.

## نتایج

در بازدید خانه به خانه از روستاهای فتح آباد، هرابرجان و شهر مروست، جمعاً ۳۰۰ خانوار با جمعیت ۱۳۶۴ نفر (۶۹۶ مرد و ۶۶۸ زن) مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد ۶۵ نفر (۴/۸ درصد) به سالک حاد مبتلا بودند که از این عده ۳۳ نفر (۴/۸ درصد) مرد و ۳۲ نفر (۴/۸ درصد) زن بودند.

بیشترین درصد آلدگی (۸/۱ درصد) در گروه سنی ۱۰-۱۴ سال و کمترین درصد آلدگی (۱/۷ درصد) در گروه سنی ۲۰-۲۴ سال می باشد(جدول ۱). همچنین بیشترین درصد زخم حاد در افراد کمتر از ۱۰ سال برابر ۷/۲ درصد و در افراد بالای ۱۰ سال برابر ۴/۴ درصد می باشد.

محل ضایعات روی تمام مبتلایان حاد بیماری تعیین شد. از ۸۳ عدد ضایعه ۳۷ عدد (۴۵ درصد) روی دست، ۲۰ عدد (۲۴ درصد) روی پا، ۱۴ عدد (۱۷ درصد) روی صورت و ۱۲ عدد (۱۴ درصد) روی سایر نقاط بدن قرار داشتند.

از کل مبتلایان به زخم حاد، ۵۸ درصد دارای یک زخم، ۱۶ درصد دارای ۲ زخم، ۱۱ درصد دارای سه زخم و ۱۵ درصد دارای بیش از سه ضایعه بودند.

در این بررسی ۱۸۵ نفر دارای جای زخم(اسکار) بودند که از این


جدول ۱: میزان ابتلا به زخم حاد و جای زخم در خانوارهای بررسی شده بر حسب سن و جنس، شهرستان خاتم، استان یزد، سال ۱۳۸۵.

سنی	گروه‌های	کل				زن				مرد					
		افراد دارای افراد دارای		افراد دارای جای زخم		افراد دارای رخم حاد		افراد دارای رخم		افراد دارای حاد					
		درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد				
۷۳/۷	۲	%۱/۸	۱	۵۳	%۳/۵	۱	۰	۰	۲۸	%۴	۱	%۴	۱	۲۵	۰-۴
۷۷/۱	۶	%۳/۵	۳	۸۵	%۱۰	۴	%۵	۲	۴۰	%۴/۴	۲	%۲/۲	۱	۴۵	۵-۹
۷۸/۱	۱۲	%۱۰/۸	۱۶	۱۴۸	%۵/۲	۴	%۱۳/۱	۱۰	۷۶	%۱۱/۱	۸	%۸/۳	۶	۷۲	۱۰-۱۴
۷۴/۲	۱۱	%۸/۴	۲۲	۲۵۹	%۴/۴	۶	%۴/۴	۶	۱۳۴	%۴	۵	%۱۲/۹	۱۶	۱۲۴	۱۵-۱۹
۷۱/۷	۳	%۷/۴	۱۳	۱۷۴	%۲/۶	۲	%۹/۲	۷	۷۶	%۱	۱	%۶/۱	۶	۹۸	۲۰-۲۴
۷۴/۷	۳۰	%۱۲/۱	۷۸	۶۴۵	%۴/۷	۱۵	%۱۱/۷	۳۷	۳۱۴	%۴/۵	۱۶	%۱۲/۳	۴۱	۳۳۲	+۲۵
۷۴/۷	۶۵	%۹/۷	۱۳۳	۱۳۶۴	%۴/۷	۳۲	%۹/۲	۶۲	۶۶۸	%۴/۷	۳۳	%۱۱/۶	۸۱	۶۹۶	کل

پسر و دختر هم از نظر ابتلا به زخم حاد اختلاف معنی داری وجود ندارد. برای اولین بار در این منطقه انگل L.major از افراد بومی که سابقه هیچ گونه مسافرتی به خارج از منطقه را نداشته اند جداسازی ، و به کمک تکییک RAPD-PCR در بخش تک یاخته شناسی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پژوهشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پژوهشکی تهران تعیین هویت گردید که با گونه جدا شده از R.optimus در همین منطقه مطابقت دارد. این سویه قبل از انسان، P. papatasii، T. indica، R. opimus، M. libycus group در مناطق اصفهان، بادرود، نیک آباد، ایلام، ارسنجان، یزد و سبزوار جدا گردیده است.

در هر سه گونه جونده صید شده در منطقه، آلودگی لیشمانيایی مشاهده گردید. در این مطالعه، انگل L.major از R.optimus به انگل لیشمانيای در جداسازی شد. تا کنون آلودگی R.optimus به انگل لیشمانيای در ایران از داشت گرگان، طبس، لطف آباد، سرخس ، اسفراین، اصفهان، بادرود، اطراف تهران، یزد و سبزوار گزارش شده است (۱۰،۱۵). همچنین در کانونهای اصفهان (اردستان و بادرود)، لطف آباد ، ترکمن صحرا ، دشت آزادگان و بافق یزد Meriones libycus آلوود به لیشمانيوز جلدی گزارش شده است (۴،۵،۹،۱۲،۲۲).

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعات مشخص گردید که لیشمانيوز جلدی روستایی (ZCL) در بخش هرات و مرور است شهرستان خاتم شایع شده است. عامل بیماری در این منطقه شهرستان خاتم شایع شده است. عامل بیماری در این منطقه می باشد و به نظر می رسد R.optimus مخزن اصلی



نمودار ۱: فون و درصد جوندگان صید شده در شهرستان خاتم، استان یزد، سال ۱۳۸۵.

## بحث و نتیجه گیری

مطالعات اپیدمیولوژیک لیشمانيوز جلدی برای اولین بار در دو بخش هرات و مرور است از شهرستان خاتم انجام شد. بررسی شیوع بیماری نشان می دهد که تمامی گروههای سنی به لیشمانيوز جلدی مبتلا شده اند. آزمون آماری  $\chi^2$  اختلاف معنی داری بین میزان ابتلا به زخم حاد در افراد کمتر از ۱۰ سال و بالای ۱۰ سال و همچنین بین زنان و مردان با حذف عامل سن نشان نمی دهد. به علت جدید بودن کانون بیماری و حساسیت تمامی افراد نسبت به لیشمانيوز، بیماری به صورت اپیدمی در منطقه بروز کرده است. بنابراین ابتلا تمامی گروههای سنی و هر دو جنس به این بیماری طبیعی است. آزمون آماری  $\chi^2$  نشان می دهد بین دانش آموzan

صمیمانه شان در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این طرح تشکر و قدردانی نمایند. همچنین از آقایان کافی، نوروزی و موسوی کارشناسان شبکه بهداشت خاتم نیز به علت همکاریشان در عملیات های صحرایی سپاسگزاری می شود.

این پژوهش با حمایت قطب علمی انسستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است.(شماره طرح ۶۸/۱ ۲۴۱).

بیماری باشد که به همراه *M.libycus* در نگهداری این کانون نقش دارند.

### سپاسگزاری

محققین برخود لازم می دانند از آقایان: دکتر محمد حسین سالاری ریاست محترم مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی یزد، دکتر محمود نوری شادکام معاونت محترم بهداشتی استان یزد، دکتر جعفری رئیس شبکه بهداشت شهرستان خاتم ، دکتر فرقانی و عزت کارشناسان مرکز بهداشت استان یزد به خاطر همکاریهای

### منابع

- Mohebali. *Epidemiological study in a new focus of cutaneous leishmaniasis due to Leishmania major in Ardestan town, central Iran.* Acta Tropica. 79:115-121.
- ۶- جعفری، رضا بررسی لیشمانیوز جلدی در شهر نیک آباد. پایان نامه جهت دریافت فوق لیسانس علوم بهداشتی در رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، ۱۳۷۶، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ۲۷۷
- ۷- یعقوبی ارشادی م ر، حنفی بجادع، اخوان ا، جعفری ر. مجلعی م. بررسی مخازن حیوانی لیشمانیوز جلدی در دو کانون ایدمیک در استان یزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۱۳۸۰، سال نهم، شماره دوم، ص ۴۳-۴۸.
- 8- Yaghoobi-Ershadi MR, Jafari R, Hanafi-Bojd, A A. *A new epidemic focus of zcl in central Iran.* Annals of Saudi Medicine 24,(2),March-April 2004:98-101.
- ۹- جعفری ر، مجلعی م، دهقان دهنوی ع ر، سلیمانی ح، اخوان ا، حجاران ه و همکاران. ایدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان بافق استان یزد سال ۱۳۸۴. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد. ۱۳۸۶، سال پانزدهم، شماره دوم، ص ۸۳-۷۶.

- ۱- پزشکی گوشه گیر س ۱، هوشمند ب ، شریفیان ج ، زینعلی م . برنامه اجرایی پیشگیری و مراقبت بیماری لیشمانیوز (جلدی و احشایی) در کشور. وزارت بهداشت، درمان آموزش، معاونت امور بهداشتی اداره کل پیشگیری و مراقبت بیماریها، (۱۳۷۶).
- 2- Yaghoobi-Ershadi, M R ,Zahraei-ramazani, A.R. Akhavan, A A ,Jalali-Zand,A R Abdoli ,H, Nadim ,A. *Rodent control operation agains ZCL in rural Iran.* Ann Saudi Med 2005:25(4):309-312.
- ۳- یعقوبی ارشادی م ر. بررسی وضع فعلی ایدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در بخش‌هایی از کانون اندامیک اصفهان به منظور طرح و پیشنهاد برنامه کنترل، پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری (Ph.D) رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ۲۰۶۷، ۱۳۷۲.
- ۴- اخوان ا، یعقوبی ارشادی م ر، مجلعی م. ایدمیولوژی لیشمانیوز جلدی (عفونت انسانی) در منطقه بادرود، شهرستان نطنز، خلاصه مقاله اولین کنگره و باز آموزی حشره شناسی پزشکی ایران، ۲۵-۲۳ خرداد ۱۳۷۷، انسستیتو پاستور ایران، تهران، صفحه ۱۸-۱۷.
- 5- Yaghoobi-Ershadi M R, Hanafji-Bojd A A, Akhavan A A, Zahrai-Ramazani A R. and M.

- 10-** Yaghoobi-Ershadi MR. Akhavan AA, Zahraii-Ramazani AR. Abai M.R. Ebrahimi ,B.Vafaei-Nezhad R. Hanafi-Bojd, AA. Jafari ,R. *Epidemiological study in a new focus of cutaneous leishmaniasis in the Islamic Republic of Iran.* Eastern Mediterranean Health Journal, 2003; 9, (4).
- 11-** Javadian E, Nadim A, Tahvildare-Bidruni, Gh H. and V. Assefi. *Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Iran, B-Khorassan, Part V: Report on focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Esferayen.* Bull. Soc.Path. Ex. 69, (2): 140-143.
- 12-** Nadim A, Seyed-Rashti, M.A. and A. Mesghali. *Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Turkmen-Sahara, Iran.* J. Trop. Med. Hyg. 1977; 71: 238-239.
- 13-** Moemenbellah-Fard M D, Kalantari M Rassi Y, Javadian E. *The PCR-based detection of leishmania major infection in Meriones libycus from southern Iran .* Ann Trop Med Parasitol. 2003;97(8):811-816.
- 14-** Seyed-Rashti, M.A. and A. Nadim. *Cutaneous leishmaniasis in Baluchistan, Iran. Abstracts and Poster Volume XI, International Congress for Tropical Medicine and Malaria.* Calgary, Canada. Sep.16-22, 1984:124.
- 15-** Seyed-Rashti M A , A. Salehzadeh .*A new focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis near Teheran, Iran. Abstracts of VIII International Congress of Parasitology,* Paris, France, August 20-24. Bull. Soc. Franc. Parasitol. 1990, Supp. 2 .1145.
- 16-** Akhavan A A, Yaghoobi-Ershadi,M R, Hasibi F, Jafari R ,Abdoli H , Arandian M H, Soleimani H, Zahraei-Ramazani A R, Mohebali M, Hajjaran H. *Emergence of cutaneous leishmaniasis due to Leishmania major in a new focus of southern Iran.* Iranian J Arthropod-Borne Dis, 2007, 1(1): 1-8.
- 17-** Javadian E, Dehestani M, Nadim A, Rassi Y, Tahvildare-Bidruni GH, Seyed-Rashti M A. *Confirmation of Tatera indica as the main reservoir host of ZCL in the west of Iran.* Iranian J Publ Health, 1998; 27(1-2):55-60.
- 18-** Yaghoobi-Ershadi, M.R., Akhavan, A.A., Mohebali, M. *Meriones libycus and Rhombomys opimus (Rodentia: Gerbillidae) are the main reservoir hosts in a new focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran.* Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 1996, 90: 503-504.
- 19-** Yaghoobi- Ershadi, M R. Javadian E. *Epidemiological study of reservoir hosts in an endemic area of ZCL in Iran.* Bull Wld Health Org. 1996;74(6):587-590.
- ۲۰- اردھالی، ص.-رضائی، ح. و اندیم. *انگل لیشماینیا و لیشماینیوزها*، تحریر دوم، مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۷۷، ۲۰۸.
- ۲۱- اعتماد، ا. پستانداران ایران، جلد اول، جوندگان و کلید تشخیص آنها. انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، تهران، ۱۳۵۷، ۲۸۸.
- 22-** Edrissian Gh H, Zovein, Z. and A. Nadim A *simple technique for preparation of smears from the ear of Rhombomys opimus for the detection of leishmanial infection.* Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. 1982 ,76: 706-707.
- 23-** Javadian, E. *Reservoir host of cutaneous leishmaniasis in Iran. Abstracts XIIth International Congress for Tropical Medicine and Malaria. 18-23 september, 1988.* Amsterdam, The Netherlands. :52.