

# بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت در سال ۱۳۹۶

نیلوفر حلوانی<sup>۱</sup>، زهرا بحرالعلومی<sup>۲</sup>، علی سرچمی<sup>۳</sup>، فاطمه زارع بیدکی<sup>۴\*</sup>

## مقاله پژوهشی

**مقدمه:** فیشورسیلانت یکی از مهمترین تکنیک‌های پیشگیری از پوسیدگی است که داشتن اطلاعات صحیح و دستورالعمل‌های لازم از مهمترین عوامل موفقیت درمان می‌باشد. بدین علت در این مطالعه دانش، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی درخصوص فیشورسیلانت در شهر یزد در سال ۱۳۹۵ مورد ارزیابی قرار گرفت.

**روش بررسی:** در این مطالعه توصیفی مقطعی که به وسیله پرسشنامه انجام شد، ۱۴۰ نفر از دندانپزشکان عمومی شهر یزد بررسی شدند. پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک،<sup>۹</sup> پرسش سطح آگاهی راجع به موضوع فیشورسیلانت،<sup>۴</sup> پرسش راجع به نگرش افراد و<sup>۷</sup> پرسش در مورد عملکرد آن‌ها بود. پرسشنامه‌ها به وسیله افراد مورد مطالعه کامل شد. پس از جمع‌آوری، اطلاعات به وسیله نرم‌افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 18 و آزمون‌های آماری T-test و ANOVA بررسی گردید.

**نتایج:** نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت افراد دارای سطح آگاهی (۸۵/۷۲٪) خوب و سطح نگرش (۷۷/۱۴٪) و عملکرد (۰/۸۵٪) متوسط می‌باشند. تفاوت آماری معنی‌داری در سطح آگاهی (P-value=۰/۰۰۴) و عملکرد (P-value<۰/۰۰۰۱) با توجه به متغیرهای گروه سنی و سابقه کار مشاهده گردید، ولی تفاوت معنی‌داری در سطح نگرش (P-value=۰/۹۸) دیده نشد.

**نتیجه‌گیری:** طبق نتایج به‌نظر می‌رسد آگاهی دندانپزشکان یزد در بیشتر موارد در حد خوب می‌باشد ولی با این حال نگرش و عملکرد آن‌ها در حد متوسط و در بعضی موارد با وجود داشتن آگاهی خوب، ضعیف می‌باشد، که می‌تواند نشان‌دهنده همراهانبودن با اطلاعات روز و منابع جدید باشد و این امر لزوم آموزش منابع جدید در دوره‌های بازآموزی با تاکید بر نقاط ضعف عملکردی و آگاهی دندانپزشکان را نشان می‌دهد.

**واژه‌های کلیدی:** آگاهی، عملکرد و نگرش سلامت، پیت و فیشورسیلانت، دندانپزشکان

**ارجاع:** حلوانی نیلوفر، بحرالعلومی زهرا، سرچمی علی، زارع بیدکی فاطمه. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت در سال ۱۳۹۶. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۴۹۶-۱۵۰۴؛ ۲۷: ۱۳۹۸-۱۵۰۴.

۱- استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

۲- دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

۳- دندانپزشک، یزد، ایران

۴- دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

\*(نویسنده مسئول): تلفن: ۰۳۵۳۶۲۵۵۸۸۱، پست الکترونیکی: fzarebidoki@yahoo.com، کد پستی: ۳۳۱۹۱۱۸۶۵۱

## روش بررسی

در این پژوهش توصیفی- مقطعي نیاز به مشارکت ۱۴۰ نفر دندانپزشک عمومي در مراکز دولتی و مطب های استان يزد در سال ۹۶ را داشتيم. با درنظرگرفتن سطح اطمینان يزد٪ و با توجه به مطالعات مشابه (۸) با در نظر گرفتن خطای برآورد٪، تعداد نمونه تعیين شد که به طور تصادفي ساده نمونه ها انتخاب شدند. متناسب با تعداد کل دندانپزشکان عمومي با توجه به آمار سازمان نظام پزشكى يزد شمار نمونه مورد نياز ۱۴۰ دندانپزشک عمومي بود که با احتساب ريزش و پاسخ ندادن احتمالي، ۲۰۰ نفر به صورت تصادفي از روی لیست ارائه شده توسط سازمان نظام پزشكى يزد انتخاب شدند.

برای هر فرد پرسشنامه ای شامل ۴ بخش تکمیل شد. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک از قبیل سن، جنس و سابقه کار، بخش دوم مربوط به سوالات آگاهی دندانپزشکان عمومی (شامل سوالات شماره ۱ تا ۹)، بخش سوم شامل سوالات نگرش دندانپزشکان (از سوال شماره ۱۰ تا ۱۳) و بخش پایاني شامل سوالات عملکرد دندانپزشکان (از سوال شماره ۱۴ تا ۲۰) در مورد فیشورسیلانت بود. سوالات آگاهی و نگرش توسط گزینه های موافق (نموده ۱) نظری ندارم (نموده ۵/۰) و مخالف (نموده صفر) و سوالات عملکرد توسط گزینه های همیشه (نموده ۱)، بعضی اوقات (نموده ۵/۰) و هرگز (نموده صفر) نمره گذاري شدند. پرسشنامه ها به صورت بی نام تحويل افراد شرکت كننده در مطالعه شد و به صورت خودايقا (self administered) توسط آنها تکمیل و سپس گردآوری شد. کسانی که تمایل به پرکردن پرسشنامه را نداشتند و یا پرسشنامه را کامل پر نکرده بودند، از بررسی کنار گذاشته شدند. دامنه نمره در بخش های مربوط به سوالات آگاهی، نگرش و عملکرد به ترتیب (۰-۹)(۰-۷)(۰-۴) بود. رده بندی نمرات در هر یک از بخش های پرسشنامه در سه سطح انجام شد. در واقع برای هر فرد جمع نمرات مربوط به آگاهی،

## مقدمه

پوسیدگی دندانی یکی از مهم ترین مشکلات عمومی و شایع ترین بیماری های دهان و دندان است. بهترین راه درمان پوسیدگی پیشگیری از بوجود آمدن آن است (۱). لازمه انجام پیشگیری از پوسیدگی های دندانی، کارگروهی و مشارکت است. بهداشت کاران دهان و دندان و دندانپزشکان از مهم ترین اجزا این تیم هستند که باید اطلاعات کامل و جامعی از مشکلات دهان و دندان، پوسیدگی های دندانی، مشکلات سلامت جامعه و استراتژی هایی برای درمان و پیشگیری برای افزایش کیفیت سلامت دهان و دندان در سطح جامعه داشته باشند (۲). در سه دهه گذشته بهبود قابل توجهی در بهداشت دهان و دندان با کاهش شیوع و شدت پوسیدگی دندانی دیده شده است. برای تعداد قابل توجهی از کودکان تکنیک های موثری در کاهش پوسیدگی وجود دارد. این شیوه های پیشگیرانه به راحتی قابل استفاده و اثربخشی آنها به اثبات رسیده است. این تکنیک ها شامل: فلوراید تراپی، محلول کلره گریدین، فیشورسیلانت و آموزش بهداشت می باشند (۳-۵).

شیوه های دندانی شایع ترین محل پوسیدگی های دندانی و تجمع باکتری های پوسیدگی زا است. درصد قابل توجهی از پوسیدگی ها در سطح اکلوزال دندانی اتفاق می افتد (۶). فیشورسیلانت یک روش پیشگیرانه قابل اعتماد و موثر در کاهش قابل توجه پوسیدگی به حساب می آید (۵). مطالعات نشان می دهد فاکتور های مختلفی در کاهش انجام فیشورسیلانت توسط دندانپزشکان وجود دارد که شامل: عدم اطمینان کافی از موثر بودن سیلانت، نگرانی در مورد انتخاب دندان مناسب، مدیریت مشکل درمان بچه ها و نداشتن مهارت و اطلاعات به روز در مورد تکنیک ها و ابزار جدید است (۷). هدف از مطالعه حاضر بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در مورد فیشورسیلانت می باشد.

۲۵-۳۴٪ در گروه سنی ۳۵-۴۵ سال و ۱۶٪ هم بالاتر از ۴۵ سال بودند که بیشترین فراوانی در گروه زیر ۳۴ سال بود. ۶۱٪ دندانپزشکان کمتر از ۵ سال، ۳۰٪ بین ۵ تا ۱۰ سال و ۷٪ هم بیشتر از ۱۰ سال سابقه کار داشتند. تفاوت معنی‌دار آماری در سطح آگاهی ( $P\text{-value}=0.932$ )، نگرش ( $P\text{-value}=0.814$ ) و عملکرد ( $P\text{-value}=0.842$ ) در زنان و مردان مشاهده نشد. فراوانی نسبی پاسخ دندانپزشکان شهر یزد به سوالات آگاهی، نگرش و عملکرد در جداول ۱، ۲ و ۳ بیان شده است.

آگاهی در گروه سنی بالای ۴۵ سال دارای بیشترین میانگین نمره (۸/۲۵) و در گروه ۲۵-۳۴ دارای کمترین میانگین نمره (۷/۸۹) است که بر این اساس با افزایش سن میانگین نمره آگاهی افزایش پیدا می‌کند که از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد. نگرش در گروه سنی ۴۵-۳۵ و بالای ۴۵ سال برابر و با اختلاف اندک (۰/۰۱۲) کمتر از گروه سنی ۲۵-۳۴ است که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری ندارد. میانگین نمره عملکرد در گروه بالای ۴۵ سال از دو گروه دیگر بیشتر است که مشاهده می‌شود عملکرد با افزایش سن افزایش پیدا می‌کند و از نظر آماری دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد ( $P\text{-value}<0.0001$ ). (جدول ۴). میانگین نمره آگاهی با افزایش سابقه کار کاهش پیدا می‌کند به‌طوریکه بیشترین میانگین نمره مربوط به دندانپزشکانی با سابقه کار کمتر از ۵ سال است (۸/۰۷) که از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری دارد ( $P\text{-value}=0.004$ ). میانگین نمره نگرش در سه گروه (با توجه به سابقه کار) از نظر آماری معنی‌دار نیست و میانگین نمره عملکرد با افزایش سابقه کار ارتباط مستقیم دارد به این معنی که در گروه با سابقه کار بالای ۱۰ سال بیشترین مقدار است که از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری دارد ( $P\text{-value}<0.0001$ ) (جدول ۵).

نگرش و عملکرد به‌طور جداگانه محاسبه شد و به این صورت ردبندی شد: کمتر از ۵٪=ضعیف، ۵٪ تا ۷۵٪=متوسط و بیشتر از ۷۵٪=خوب. پرسشنامه مربوطه یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. لذا به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه، این پرسشنامه در اختیار ۵ متخصص کودکان قرار گرفت و سوالات از نظر محتوی مناسب تشخیص داده شد. هم‌چنین دو سوال حذف و دو سوال اصلاح شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه توسط ۱۵ دندانپزشک عمومی تکمیل شد و مجدداً پس از ۱ ماه توسط همان افراد تکمیل شد. از نظر آماری، ضریب آلفای کرونباخ در حد مطلوب (۰/۸۲) گزارش شد. ابزار جمع‌آوری در این مطالعه پرسشنامه خودایفا است که به افراد تحت مطالعه داده می‌شود.

### تجزیه و تحلیل آماری

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS Inc., Chicago, IL; version 18 و آزمون T-test و ANOVA و آزمون کای‌دو استفاده شد.

### ملاحظات اخلاقی

این طرح با رعایت کلیه اصول آیین‌نامه اخلاق در پژوهش مصوب وزارت بهداشت و درمان انجام شد. لازم به‌ذکر است که این مطالعه در «کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد» به تصویب رسیده است (IR.SSU.REC.1395.221).

### نتایج

با درنظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵٪ و با توجه به مطالعات مشابه (۸) و با درنظر گرفتن خطای برآورد ۵٪، تعداد ۱۴۰ نمونه نیاز است که به‌طور تصادفی ساده نمونه‌ها انتخاب شدند. در این مطالعه ۱۴۰ دندانپزشک عمومی شرکت کردند. اطلاعات دموگرافیک نشان می‌دهد که ۶۱٪ شرکت‌کننده‌ها آقا و ۳۸٪ خانم بودند. ۶۰٪ دندانپزشکان در گروه سنی

### نیلوفر حلوانی و همکاران

جدول ۱: فراوانی نسبی پاسخ دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت به سوالات مربوط به آگاهی

مخالفم	نظری ندارم	موافقم	آگاهی
.	(٪۳۰)۴۲	(٪۷۰)۹۸	۱. تأثیر فیشورسیلانت توسط شواهد علمی قوی پشتیبانی می‌شود.
.	.	(٪۱۰۰)۱۴۰	۲. با تکنیک قرار دادن سیلانت‌های دندانی آشنایی دارم.
.	(٪۷.۱)۱۰	(٪۹۲.۹)۱۳۰	۳. فیشورسیلانت بعد از قرار دادن باید بصورت دوره‌ای مورد ارزیابی قرار بگیرد.
(٪۷.۹)۱۱	(٪۸۴.۳)۱۱۸	(٪۷.۹)۱۱	۴. قرار دادن سیلانت روی دندان‌های شیری و دائمی با شیارهای گیردار در هر سنی توصیه می‌شود.
.	.	(٪۱۰۰)۱۴۰	۵. مهمترین جنبه در موفقیت درمان با سیلانت به کاربردن ایزولاسیون مناسب است.
.	.	(٪۱۰۰)۱۴۰	۶. قبل از قراردادن سیلانت باید یک ارزیابی ریسک پوسیدگی انجام بگیرد.
.	(٪۴۵.۷)۶۴	(٪۵۴.۳)۷۶	۷. نگرانی در مورد اثرات مضر سیلانت (استروژنوسیتی ناشی از بیسفنول A) وجود دارد ولی تایید نشده است.
.	.	(٪۱۰۰)۱۴۰	۸. رعایت دقیق دستورالعمل‌ها در قراردادن سیلانت در موفقیت درمان موثر است
.	(٪۶۱.۴)۸۶	(٪۳۸.۶)۵۴	۹. سیلانت‌های رزینی موثرتر از سیلانت‌های گلاس اینومری عمل می‌کنند.

جدول ۲: فراوانی نسبی پاسخ دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت به سوالات مربوط به نگرش

مخالفم	نظری ندارم	موافقم	نگرش
(٪۱۵)۲۱	(٪۸۵)۱۱۹	.	۱۰. یکی از دلایل استفاده نکردن فیشورسیلانت توسط دندانپزشکان ترس از قرار دادن فیشورسیلانت روی پوسیدگی‌های اولیه مینا می باشد.
.	.	(٪۱۰۰)۱۴۰	۱۱. از دلایل شکست سیلانت‌ها عدم مراجعة بیماران برای جلسات فالوآپ می‌باشد
.	(٪۶۱.۴)۸۶	(٪۳۸.۶)۵۴	۱۲. ترویج استفاده از سیلانت‌ها در میان دندانپزشکان و آموزش دهنده‌گان ضروری است
(٪۷.۱)۱۰	(٪۹۲.۹)۱۳۰	.	۱۳. از سیلانت دندانی به دلیل اینکه کاربرد آن آسان و برای بیمار راحت است استفاده می‌کنم.

جدول ۳: فراوانی نسبی پاسخ دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلانت به سوالات مربوط به عملکرد

هرگز	بعضی اوقات	همیشه	عملکرد
.	(٪۴۶.۴)۶۵	(٪۵۳.۶)۷۵	۱۴. از فیشورسیلانت به عنوان ماده ترمیمی جهت ترمیم پوسیدگی‌های اولیه استفاده می‌کنم
.	(٪۸۵)۱۱۹	(٪۱۵)۲۱	۱۵. از فیشورسیلانت همراه با فلوراید استفاده می‌کنم
.	(٪۷۷.۱)۱۰۸	(٪۲۲.۹)۳۲	۱۶. در موارد از دست رفتن قسمتی یا کل سیلانت به صورت مجدد سیلانت قرار می‌دهم
.	(٪۳۷.۹)۵۳	(٪۶۲.۱)۸۷	۱۷. برای گیر بیشتر سیلانت بعد از اچینگ از باندینگ استفاده می‌کنم.
(٪۶۹.۳)۹۷	(٪۲۲.۹)۳۲	(٪۷.۹)۱۱	۱۸. برای افزایش گیر قبل از قرار دادن سیلانت برساز با پودر پامیس انجام می‌دهم.
.	.	(٪۱۰۰)۱۴۰	۱۹. در موارد مشکوک به پوسیدگی پروگزیمال قبل از کار رادیوگرافی تهیه می‌کنم.
.	.	(٪۱۰۰)۱۴۰	۲۰. اگر حین کار به علت آلودگی یا براق ایزولاسیون به هم بخورد با اچینگ دوباره به مدت کمتر کار را ادامه می‌دهم.

## آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در مورد فیشورسیلات

جدول ۴: میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلات بر حسب سن

P-value	نتیجه آزمون ANOVA			۴۵<			۳۵-۴۵			۲۵-۳۴			گروه متغیر
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
۰/۰۰۴	۰/۷۶۷	۸/۲۵	۰/۲۳۹	۸/۱۶	۰/۵۴۰	۷/۸۹							آگاهی
۰/۹۸۰	۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۰/۰۰۰	۳/۰۰۰	۰/۴۲۹	۳/۰۱۲							نگرش
۰/۰۰۰	۱/۰۲	۵/۵۰	۰/۲۳۹	۴/۱۶	۰/۵۲۹	۴/۵۵							عملکرد

جدول ۵: میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد در مورد فیشورسیلات بر حسب سابقه کار

P-value	نتیجه آزمون ANOVA			۱۰<			۵-۱۰			<۵			گروه متغیر
	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
۰/۰۰۴	۰/۰۰۰	۷/۵۰	۰/۷۰۶	۸/۰۲	۰/۴۵۷	۸/۰۷							آگاهی
۰/۹۸۰	۰/۰۰۰	۳/۰۰	۰/۰۰۰	۳/۰۰	۰/۴۲۶	۳/۰۱							نگرش
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۶/۵۰	۰/۶۰۷	۴/۴۷	۰/۳۹۷	۴/۴۳							عملکرد

بعد از چند سال نشان می‌دهد. سیلات‌های رزینی قابل قبول‌ترین مواد برای فیشورسیلات هستند زیرا میزان گیر بیشتری نسبت به سیلات‌های گلاس آینومر نشان داده‌اند (۱۱، ۱۲). ولی متناسفانه تنها ۳۸ درصد از دندان‌پزشکان مطالعه حاضر تاثیر بیشتر سیلات‌های رزینی را تایید کردد و ۰/۶۲ هم نظری در این مورد نداشتند که نشان از آگاهی نسبتاً پایین آن‌ها به دلایلی مثل: فاصله گرفتن از زمان فارغ‌التحصیلی، نبود برنامه آموزشی مداوم و نداشتن مطالعه از منابع جدید باشد. اگر ایزولاسیون به دقت حفظ نشود، تشکیل تگ‌های رزینی موفق نخواهد بود (۱۳). خوشبختانه ۱۰۰٪ دندان‌پزشکان با ایزولاسیون به عنوان یکی از مراحل کلیدی در موفقیت درمان موافقت داشتند. مطالعات جدید نگرانی در مورد کاهش میزان گیر تحت تاثیر درمان با فلوراید موضعی قبل از کاربرد سیلات را بطرف کردن (۱۴، ۱۵). در مطالعه حاضر اکثر دندان‌پزشکان (۰/۸۰) از فلوراید بدون نگرانی استفاده می‌کنند. مشابه نتایج ما در مطالعه‌ای که در هند صورت گرفته (۸)، ۰/۸۵٪ استفاده از فلوراید توأم با فیشورسیلات را باعث بهبود نتایج درمان می‌دانستند. در رابطه با این‌می سیلات‌ها گفته شده است که تماس با

## بحث

مطالعه حاضر به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان یزد در مورد فیشور سیلات می‌پردازد. این مطالعه برای اولین بار در شهر یزد صورت گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر افراد دارای سطح آگاهی مطالعه حاضر نشان داد که اکثر افراد دارای سطح آگاهی (۰/۷۷/۱۴٪) و عملکرد (۰/۸۵/۷۲٪) خوب و سطح نگرش (۰/۸۵٪) متوسط می‌باشند. بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک (سن، جنس و سابقه کار) با میانگین نمره آگاهی نشان داد که تنها متغیرهای سن و سابقه کار با آگاهی ارتباط معنی‌داری دارد. ارتباط متغیر سن با آگاهی به این صورت بود که نمره آگاهی با افزایش سن بالا می‌رود. همچنین بررسی ارتباط میان آگاهی و سابقه کار دندانپزشکان نشان دهنده این بود که با افزایش سابقه کار میزان آگاهی به صورت معنی‌داری کاهش پیدا کرده است که از این نظر با سابقه کار ارتباط معنی‌داری ندارد. مطالعه ali Sadegh (۹) که نشان داد دانش با سابقه کار ارتباط معنی‌داری ندارد مغایرت دارد. این نتایج مشابه مطالعه Kailash (۸) و san martin (۱۰) می‌باشد. می‌توان این طور استنباط کرد با فاصله گرفتن از زمان فارغ‌التحصیلی میزان آگاهی کاهش پیدا می‌کند که نیاز به آموزش‌های یادآوری را

است باعث شود تعداد عظیمی از بیماران نتوانند از این درمان پیشگیری بهره ببرند. در مطالعه ما ۱۰۰٪ دندانپزشکان ذکر کردند که با تکنیک قرار دادن سیلان آشنایی دارند ولی بررسی عملکرد مشخص شد در بعضی موارد نیاز به افزایش آگاهی و آموزش می باشد از جمله به کاربردن پودر پامیس قبل از فیشورسیلان به منظور افزایش گیر، چراکه مقالات متعدد نشان می دهند که سیلان‌ها جهت نفوذ احتیاج به فیشورهای فاقد دربری دارند تا با افزایش تعداد تگ‌های رزینی گیر میکرومکانیکال ایجاد شود (۱۹) در حالی که در مطالعه اخیر ۶۹٪ دندانپزشکان هرگز از برساز با پودر پامیس استفاده نمی کنند که این نشان از عملکرد نسبتاً پایین آن‌ها در این مورد می‌دهد.

### نتیجه‌گیری

طبق نتایج مطالعه حاضر آگاهی دندانپزشکان یزد در بیشتر موارد در حد خوب می باشد اما نگرش و عملکرد آن‌ها در حد متوسط و در بعضی موارد با وجود داشتن آگاهی خوب، ضعیف می باشد، که می تواند نشان دهنده همراه نبودن با اطلاعات روز و منابع جدید باشد و این امر لزوم آموزش منابع جدید در دوره های بازآموزی با تأکید بر نقاط ضعف عملکردی و آگاهی دندانپزشکان را نشان می دهد.

### سپاس‌گزاری

نویسندهای مقاله برخود لازم می دانند از معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی شهید صدوqi یزد بهدلیل تامین هزینه‌های مالی این طرح سپاس‌گزاری نمایند.  
تعارض در منافع: وجود ندارد.

بیس‌فنول‌آ (BPA) گذرا و قابل‌کنترل است، نبایستی نگرانی در مورد استروژن‌سازی سیلان‌ها باعث عدم کاربرد آن‌ها شود (۱۶). در مطالعه حاضر نیز ۵۴٪ دندانپزشکان موافق این نظر و بیشتر از نصف آن‌ها (۵۶٪) هم نظری در این مورد نداشتند که شاید علت آن نداشتن آگاهی و اطمینان کافی در مورد بی خطر بودن سیلان‌ها می باشد که این مورد می‌تواند باعث کاهش استفاده از سیلان‌ترایپی شود. در مطالعه حاضر ۶۲٪ از دندانپزشکان بزد همیشه و ۳۸٪ در بعضی مواقع از باندینگ بعد از اچینگ استفاده می‌کنند. با وجود این که مطالعات نشان دادند استفاده از باندینگ میکرولیکیج را کاهش و نفوذ سیلان را افزایش داده ولی در پیشنهادات مبتنی بر شواهد بیان شده به علت افزایش زمان کار و هزینه فقط در موارد مورد نیاز مثل دندان‌های هیپومینرالیزه و مواردی که نیاز به گیر بیشتر به علت شرایط بیمار (از جمله سن کم، عدم همکاری در ایزولاسیون کافی و...) داریم، استفاده شود و استفاده آن در تمام موارد لزومی ندارد و درصد بالاتر استفاده کنندگان از باندینگ در تمام موارد نشان از ناقص بودن اطلاعات در این زمینه می باشد (۵). گیر سیلان در گذر زمان برای موقتی آن حیاتی است به همین دلیل ارزیابی دوره‌ای سیلان توسط دندانپزشک امری ضروری می باشد (۱۷)، (۵) اکثر دندانپزشکان (۹۲/۹٪) حاضر در مطالعه آگاهی لازم در این مورد را دارا می‌باشد. در نظریه‌های جدید مبتنی بر شواهد تاکید می‌کنند زمانی که دندان یا بیمار در خطر ایجاد پوسیدگی قرار دارد، بزرگسالان نیز همانند کودکان باید سیلان را دریافت کنند (۱۸)، (۵). طبق نتایج مطالعه حاضر تعداد کمی از دندانپزشکان (۷/۹٪) به این امر آگاه بودند و ۸۴٪ در این مورد نظری نداشتند که متسافنه متغیر با مطالعات و نظریه‌های جدید است و ممکن

## References:

- 1-Momeni A, Mardi M, Pieper K. *Caries Prevalence And Treatment Needs Of 12-Year-Old Children In The Islamic Republic Of Iran*. Med Princ Pract 2006;15(1):24-8
- 2-Romito L, McDonald JL. *Nutritional Considerations for the Pediatric Dental Patient*. In *McDonald and Avery Dentistry for the Child and Adolescent* 2011 (pp. 223-240).
- 3-Nowak AJ, Skotowski MC, Widmer R, Strate J, Cugini M. *A Practice-Based Evaluation Of A Range Of Children's Manual Toothbrushes: Safety And Acceptance*. Compend Contin Educ Dent 2002;23(3 Suppl 2):17-24.
- 4-Crall JJ, Bjerga JM. *Fluoride uptake and retention following combined applications of APF and stannous fluoride in vitro*. Pediatr Dent 1984;6(4):226-9.
- 5-Casamassimo PS, Fields Jr HW, McTigue DJ, Nowak A. *Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence*, 5/e. Elsevier India; 2012 Dec 20.
- 6-Locker D, Jokovic A, Kay E. *Prevention Part 8: The use of pit and fissure sealants in preventing caries in the permanent dentition of children*. Br Dent J 2003;195(7):375-8.
- 7-Michalaki M, Sifakaki M, Oulis CJ, Lygidakis NA. *Attitudes, knowledge and utilization of fissure sealants among Greek dentists: a national survey*. Eur Arch Paediatr Dent 2010;11(6):287-93.
- 8-Asawa K, Gupta VV, Tak M, Nagarajappa R, Chaturvedi P, Bapat S, et al. *Dental Sealants: Knowledge, Value, Opinion, and Practice among Dental Professionals of Bathinda City, India*. Adv Prev Med 2014;2014:469738.
- 9-Al-Maweri SA, Al-Jamaei AA, Halboub ES, Al-Soneidar WA, Tarakji B, Alsahlani A. *Fissure sealants: Knowledge and practice of Yemeni dental practitioners*. Eur J Dent 2016;10(2):234-8.
- 10-San Martin L, Castaño A, Bravo M, Tavares M, Niederman R, Ogunbodede EO. *Dental sealant knowledge, opinion, values and practice of Spanish dentists*. BMC Oral Health 2013;13:12.
- 11-Forss H, Halme E. *Retention of a glass ionomer cement and a resin-based fissure sealant and effect on carious outcome after 7 years*. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26(1):21-5.
- 12-Forss H, Saarni UM, Seppä L. *Comparison of glass-ionomer and resin-based fissure sealants: a 2-year clinical trial*. Community Dent Oral Epidemiol 1994;22(1): 21-4.
- 13-Silverstone LM, Hicks MJ, Featherstone MJ. *Oral fluid contamination of etched enamel surfaces: an SEM study*. J Am Dent Assoc 1985;110(3):329-32.
- 14-Koh S, Chan J, You C. *Effects of topical fluoride treatment on tensile bond strength of pit and fissure sealants*. Gen Dent 1998;46(3):278-80.
- 15-Warren DP, Infante NB, Rice HC, Turner SD, Chan JT. *Effect of topical fluoride on*

- retention of pit and fissure sealants.* J Dent Hyg 2001;75(1):21-4.
- 16-** Azarpazhooh A, Main PA. *Is there a risk of harm or toxicity in the placement of pit and fissure sealant materials? A systematic review.* J Can Dent Assoc 2008;74(2):179-83.
- 17-** Beauchamp J, Caufield PW, Crall JJ, Donly K, Feigal R, Gooch B, et al. *Evidence-based clinical recommendations for the use of pit-and-fissure sealants: a report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs.* J Am Dent Assoc 2008;139(3):257-68.
- 18-** Dean JA, editor. *McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent-E-Book.* Elsevier Health Sciences; 2015 Aug 10.
- 19-** Muller-Bolla M, Lupi-Pégurier L, Tardieu C, Velly AM, Antomarchi C. *Retention Of Resin-Based Pit And Fissure Sealants: A Systematic Review.* Community dent oral epidemiol 2006;34(5):321-36.

## Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of General Dentists in Yazd about Fissure Sealant in 2017

Niloofar Halvani<sup>1</sup>, Zahra Bahrololoomi<sup>2</sup>, Ali Sarchami<sup>3</sup>, Fatemeh Zarebidoki<sup>\*1</sup>

### Original Article

**Introduction:** Fissure sealant is one of the most important and effective preventing techniques. Having proper information and guidelines is the most important factors for the success of treatment. Therefore, in this study, the knowledge, attitude and practice of general dentists about fissure sealant in Yazd in 2017 were evaluated.

**Methods:** A descriptive cross-sectional study was conducted by a questionnaire in which 140 general dentists were investigated in Yazd. The questionnaire consisted of demographic information, 9 questions about awareness of the issue of Fissure sealant, 4 questions about people's attitude and 7 questions about their practice. After gathering the data, they were analyzed by SPSS 20 version 18 software and ANOVA test.

**Results:** The results of the study showed that the majority of General dentists had a good knowledge (85.72%), their attitude level (77.14%) and performance (85%) were moderate. There was a significant difference in knowledge ( $P$ -value = 0.004) and practice ( $P$ -value = 0.000) levels in age group and work experience, but there was no significant difference in attitude level ( $P$ -value = 0.980).

**Conclusion:** According to the results, the knowledge of dentists in Yazd seems to be good in most cases, but their attitudes and practice are moderate and in some cases poor, despite having good knowledge, the results indicate that they are not up to date with new information and resources. This indicates the need to train new resources in retraining courses with emphasis on functional weaknesses and dentists' awareness.

**Keywords:** Dentists, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Pit and Fissure Sealants.

**Citation:** Halvani N, Bahrololoomi Z, Sarchami A, Zarebidoki F. **Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of General Dentists in Yazd about Fissure Sealant in 2017.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2019; 27(4): 1496-1504

<sup>1</sup>Department of Pediatric Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

<sup>2</sup>Social Determinants of Oral Health Research Center, Department of Pediatric Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

<sup>3</sup>Dentist, Yazd, Iran

\*Corresponding author: Tel: 03536255881, email: fzarebidoki@yahoo.com