

بررسی مقایسه تأثیرات نانوذرات نقره بر میزان تغییرات گلbul‌های خونی در موش‌های صحرایی نر

نوشین نقش^{*}^۱، سمیرا امیرخانی‌دهکردی^۲، حیدر آقابابا^۳

- ۱- استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
- ۲- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، شیراز، ایران
- ۳- ستادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، شیراز، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۸/۱۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۴/۲۱

چکیده

مقدمه: استفاده از نانوذرات نقره (Nanosilver particles) یکی از زمینه‌های کاربردی فناوری نانو می‌باشد. نانوذرات نقره می‌توانند رادیکال‌های آزاد (Free radicals) تولید کرده و به انواع سلول‌ها آسیب برسانند. در این تحقیق به بررسی اثرات سمی (Toxic effects) نانوسیلور بر روی گلbul‌های سفید و قرمز در رت‌های نر نژاد ویستان پرداخته شده است.

روش بررسی: در این مطالعه بالینی، نانوذرات نقره به صورت تزریقی و از طریق داخل صفاقی با غلظت‌های ۱۰۰، ۵۰ و ۴۰۰ ppm بر روی گروه‌های تیمار اثر داده شدند. سپس میانگین تعداد گلbul‌های قرمز و سفید موش‌ها در گروه‌های تیمار و کنترل، ۸، ۱۲ و ۱۶ روز پس از تیمار با یکدیگر مقایسه گردید.

نتایج: این نانوذرات بر گلbul‌های قرمز و سفید رت‌ها، ۱۲ روز بعد از تزریق در غلظت ۴۰۰ ppm بیشترین تأثیر را داشت ($p < 0.01$). نانوسیلور باعث افزایش گلbul‌های سفید و کاهش تعداد گلbul‌های قرمز شد.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که کاهش گلbul‌های قرمز و افزایش تعداد گلbul‌های سفید در غلظت ۴۰۰ ppm به علت لیز احتمالی گلbul‌های قرمز و احتمالاً تحریک شدید سیستم ایمنی سلولی می‌باشد. استفاده از نانوذرات با شکل، اندازه و ترکیبات مختلف، افق‌های نوینی برای تحقیقات آینده جهت بررسی کاربردهای فناوری نانو در فیزیولوژی را نمایان می‌کند.

واژه‌های کلیدی: نانوذرات نقره، گلbul‌های قرمز، گلbul‌های سفید، اثرات سمی و رت

* (نویسنده مسئول); تلفن: ۰۳۱۱-۲۲۱۲۸۵۷، پست الکترونیکی: naghsh@iaufala.ac.ir

مقدمه

استفاده از فناوری نانو مانند بقیه فناوری‌ها معايب متعددی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، متصاعد شدن این ذرات در محیط زیست، تماس پوستی محققین با این نانوذرات و تأثیرات مختلف آنها بر تمام ارگانیسم‌های بدن انسان، موضوعی است که باید بر روی آن تحقیقات گستردۀ و دقیقی صورت پذیرد. نانوذرات نقره با اثر بر روی سلول‌های مختلف می‌توانند اثرات سمی (Toxic effects) داشته باشند(۷,۶). یکی از تأثیرات نانوذرات نقره اثر بر روی گلbul‌های خونی می‌باشد. به دلیل اعمال مختلف و مهم گلbul‌های خونی در نقل و انتقال مواد غذایی و اکسیژن و همچنین تأثیرات این نانوذره بر تغییرات تولید گلbul‌های سفید در بافت‌های لغافی و تحریک سیستم ایمنی، باعث تغییرات فیزیولوژیک بسیار زیادی در بدن انسان می‌گردد. از طرفی کاربرد بسیار زیاد نانوذرات مختلف سیلور در کل جهان و به خصوص در کشور ما، مطالعات دقیق‌تری را برای شبیه‌سازی مدل‌های حیوانی پیرامون تأثیرات این نانو ذره بر روی گلbul‌های خونی می‌طلبد(۸,۷). با توجه به تغییر خواص نانوذرات با تغییرات شکل، اندازه و غلظت، در این تحقیق به بررسی اثرات مقایسه‌ای تزریق نانوذرات نقره کروی شکل با میانگین قطر ۴۰ نانومتر بر روی میزان گلbul‌های قرمز و سفید موش‌های نر پرداخته شده است.

روش بورسی

این مطالعه به روش تجربی بر روی ۴۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار انجام شد. این حیوانات از انستیتو پاستور تهران خریداری شدند و به منظور آماده‌سازی برای آزمایش به مدت یک ماه در حیوان‌خانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان نگهداری شدند. کلیه آزمایش‌ها بر اساس اصول کمیته اخلاقی بر روی موش‌ها انجام پذیرفت که به تأیید کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان رسیده بود. حیوانات در شرایط درجه حرارت مناسب آزمایشگاهی (درجه حرارت 22 ± 2 درجه سانتی‌گراد) و نور کافی اطاق (۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی) نگهداری

امروزه کاربرد نانوذرات نقره (Nanosilver particles) در علوم مختلف و به خصوص پزشکی، در سراسر جهان دیده می‌شود. به عنوان مثال، در بیمارستان‌ها برای زخم‌های خارجی و سوختگی‌ها می‌توان از آن استفاده کرد. نانوذرات نقره برای پوشش دستگاه‌های پزشکی، مهار رشد بیوذرات مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها کاربرد دارد. مواد ضدغوفونی کننده نانونقره به صورت اسپری و پوشش‌های پلیمری هستند که به طور گستردۀ به عنوان محافظ در برابر عفونت‌های ویروسی استفاده می‌شود. علاوه بر این، نانونقره به علت دارا بودن خواص ضدبacterی (Antibacterial) به طور گستردۀ در مواد غذایی و بسته‌بندی استفاده می‌شود(۱,۲). نقره خالص بالاترین ضربیت انتشار الکتریکی و انتقال حرارتی را نسبت به فلزات دیگر دارا می‌باشد. یون‌های نقره‌ای که اتم‌های آن کوچک‌تر از شاعع ۰/۱ نانومتر و با یک الکترون کمتر از پروتون باشند استفاده‌های بیشتری دارند. نانوذرات نقره در محدوده اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر قرار گرفته می‌شود. محققان توانسته‌اند با آزمایش‌های گوناگون، ساختار ترکیبی متفاوت بعضی از ذرات را شناسایی کنند. در ابعاد نانو، نسبت سطح به حجم افزایش یافته و قابلیت نفوذ ذرات و تأثیرگذاری آنها بر سلول‌های موجود در محیط نانو و یا بدن موجودات زنده بیشتر می‌گردد(۳,۴).

تکنولوژی نانو با دستکاری و تغییرات در اندازه و ابعاد مولکول‌های عناصر، از ۱۱ تا ۱۰۰ میلیارد متر، انقلاب نوینی را در شیمی، فیزیک، بیولوژی و پزشکی ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها در اندازه و ابعاد عناصر، بلکه در به وجود آوردن ویژگی‌های جدید و مهم در آنها تأثیر داشته است. فناوری نانو با ایجاد مواد جدید، امید جدیدی برای مهندسین محیط زیست در بهبود آводگی محیط زیست محسوب می‌شود. ولی باید توجه کرد که علیرغم فواید مؤثر آن، این فناوری می‌تواند مواد جدید زیان‌آور ناشناخته‌ای را در محیط زیست وارد کند که پیش از این وجود نداشته است(۵,۶).


ضمن با توجه به اثرات احتمالی سمی این نانوذرات در حین مراحل آزمایش از ماسک‌های فیلتردار و دستکش‌های مخصوص استفاده شد.

با استفاده از نرم‌افزار SIGMASTAT TM (Jandel Software, San Raphael, CA) بر روی نتایج، کارهای آماری لازم انجام پذیرفت. به منظور مقایسه تغییرات میزان گلوبول‌های قرمز در کل گروه‌های تیمار با یکدیگر بعد از اعمال تیمار، در غلظت‌های مختلف نانونقره از آزمون آماری ANOVA استفاده شد. تعداد تکرار نمونه‌ها ۸ راس رت نر در نظر گرفته شد (۹، ۱۰). جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۵ استفاده شد.

نتایج

نمودار ۱ نشان می‌دهد که در غلظت 400 ppm تعداد گلوبول‌های قرمز خون رت‌ها در گروه کنترل معادل $10.6 \pm 0.9 \times 10^6$ می‌باشد که بعد از گذشت ۳ روز از تزریق به میزان $10.6 \pm 1.0 \times 10^6$ رسید که این کاهش از نظر آماری معنی‌دار است ($p \leq 0.05$). شمارش گلوبول‌های قرمز بعد از گذشت ۸ روز به میزان $10.6 \pm 0.96 \times 10^6$ کاهش یافت که از نظر آماری معنی‌دار است ($p \leq 0.01$). بعد از ۱۲ روز از آخرین تزریق، تعداد گلوبول‌های قرمز به میزان $10.6 \pm 1.1 \times 10^6$ رسید که این کاهش معنی‌دار می‌باشد (نمودار ۱).


شدن. حیوانات آزمایشگاهی با میانگین وزنی 225 ± 25 گرم بودند و به پنج گروه هشت‌تایی تقسیم شدند. این گروه‌ها شامل گروه اول شاهد، که به میزان ۱ سی‌سی سرم فیزیولوژی دریافت کردند تا تأثیر شوک حاصل از تزریق در گروه‌های تیمار و کنترل یکسان گردد. به گروه دوم ۱ سی‌سی از نانوذرات نقره با غلظت 50 ppm تزریق شد. به گروه سوم، ۱ سی‌سی از نانوذرات نقره با غلظت 100 ppm به گروه چهارم، ۱ سی‌سی از نانوذرات نقره با غلظت 200 ppm و به گروه پنجم، ۱ سی‌سی از نانوذرات نقره با غلظت 400 ppm تزریق شد. این تزریقات به مدت ۵ روز متوالی تکرار شد. در ضمن شیوه تزریق در تمام گروه‌ها داخل صفاقی (Interpritonealy) می‌باشد. دلیل انتخاب این دوزها مقایسه نتایج تحقیقات قبل بود. ۳، ۸ و ۱۲ روز بعد از تیمار، خونگیری از موش‌ها انجام شد. خونگیری از گوش پلک چشم حیوانات با کمک لوله مویینه انجام شد. میزان Cell Counter گلوبول‌های سفید و قرمز خون توسط دستگاه Sysmex مدل از کشور انگلستان اندازه‌گیری شد. میانگین غلظت گلوبول‌های قرمز و سفید در موش‌های گروه‌های تیمار و کنترل با یکدیگر مقایسه گردید. در ضمن نانوذرات نقره کروی با میانگین قطر 4 نانومتر از شرکت نانونسب پارس خریداری شد. این نانوذرات به شیوه شیمیایی و با روش احیای نیترات نقره تهیه شدند و سپس با سیترات پایدار شدند. نانوذرات نقره به روش سری رقت (Serial delution) رقیق شدند (۸، ۱). در




نمودار ۱: مقایسه میانگین تعداد گلوبول‌های قرمز در گروه‌های شاهد و تیمار

تفاوت نسبت به گروه کنترل معادل $10^3 \times 10^3 \pm 10^2 \times 10^2 \times 16/25$ معنی دار می باشد ($p < 0.01$) (نمودار ۳). نمودار ۴ نشان می دهد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره، میزان شمارش گلبول های سفید افزایش معنی داری می یابد. مؤثرترین زمان و دوز برای اعمال تغییرات بر افزایش گلبول های سفید، غلظت ۴۰۰ ppm در ۱۲ روز بعد از تیمار بود (نمودار ۴).

نمودار ۲ نشان دهنده مقایسه میانگین تعداد گلبول های قرمز در گروه های شاهد و تیمار ۱۲ روز بعد از تیمار با نانوذرات نقره در غلظت های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ ppm می باشد. این نمودار نشان می دهد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره، میزان شمارش گلبول های قرمز کاهش معنی داری می یابد (نمودار ۲). میزان شمارش گلبول های سفید برابر با $10^3 \times 10^3 \pm 10^2 \times 10^2 \times 25/19$ است که این




نمودار ۲: مقایسه میانگین تعداد گلبول های قرمز در گروه های شاهد و تیمار



نمودار ۳: مقایسه میانگین گلبول های سفید در گروه شاهد و گروه تیمار شده با نانوذرات ۴۰۰ ppm.

هر ستون نمایانگر میانگین ها می باشد. اختلاف در $p \leq 0.01$ معنی دار است.



نمودار ۴: بررسی مقایسه تغییرات میانگین میزان گلبول های سفید متناسب با تغییرات غلظت نانونقره ۱۲ روز بعد از تیمار (هر نقطه معرف میانگین ۸ بار تکرار گلبول های سفید در غلظت مزبور می باشد).

بحث و نتیجه گیری

نشان دادند که با تغییر قطر نانوذرات، توزیع آنها در بافت های بدن و اثراتشان متفاوت می گردد(۱۲). در این پژوهه میانگین قطر نانوذرات نقره ۴ نانومتر بوده و شکل آن کروی می باشد. مکانیسم احتمالی برای کاهش تعداد گلبول های قرمز، نفوذ این نانوذره به گلبول های قرمز و پاره شدن احتمالی غشای این سلول ها می باشد. این یون های نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارند و تأثیر بیشتری بر غشای سلول ها می گذارند. از طرفی مکانیسم فیزیولوژیک احتمالی ایجاد شده توسط نانوذرات نقره را می توان به تولید رادیکال های آزاد (Free radicals) اکسیژن فعال نسبت داد(۹). بدین صورت نقره با اکسید کردن اتم اکسیژن، یون اکسیژن و با هیدرولیز کردن آب، یون OH را تولید می کند که هر دو از بنیان های قوی و عوامل ایجاد استرس اکسیداتیو (Oxidative stress) می باشند. این رادیکال های آزاد با حمله به ارگان های داخلی گلبول های قرمز، مانند میتوکندری می توانند باعث مرگ برنامه ریزی شده (Apoptosis) سلول های زنده گردند(۸). این دلایل می تواند در مقایسه با نتایج Sriram و همکارانش در سال ۲۰۱۰ تفسیر گردد. آنها اثبات کردند که نانونقره می تواند آنزیم های کاسپازی به خصوص Caspase8 را

در مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات مقایسه ای نانوذرات نقره در سلول های خونی موش های صحرایی نر پرداخته شد. آسیب خونی ناشی از تزریق نانوذرات نقره به صورت درون صفاقی در موش ها باعث تحریک شدید سیستم اکسیدانی در گلبول های قرمز و لیز آنها و ایجاد حالت فقر گلبول های قرمز و کم خونی شدید (Anemia) در رت های تیمار شده با نانوذرات نقره شده است. این تأثیرات در غلظت های بالا (Overdose) ۴۰۰ ppm نانوذرات نقره باعث کم خونی شدید آشکار می شوند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تأثیرات نانوذرات نقره بر میزان گلبول های قرمز به صورت وابسته به دوز (Time dependent) و وابسته به زمان (Dose dependent) بوده است (نمودار ۲). Sriram و همکاران در سال ۲۰۱۰ به بررسی تأثیرات خوراکی نانوذرات نقره با قطر ۶۰ نانومتر بر روی رت های نر پرداختند. این دانشمندان نشان دادند که گلبول های سفید تک هسته به علت افزایش آپوپتوز کاهش یافته ولی یافته های آنها در مورد گلبول های قرمز برخلاف نتایج حاضر بود و افزایش تعداد آنها را نشان می داد(۱۱). دلیل این تضاد را شاید بتوان به تغییرات قطر نانونقره آنها و متفاوت بودن شیوه تیمار با نانونقره نسبت داد. Wijnboven و همکاران در پژوهشی

گلbul‌های سفید تقویت شده است. این پاسخ در واقع نوعی تحریک شدید سیستم ایمنی سلولی به حمله نانوذرات می‌باشد. ممکن است بدن رت‌ها در پاسخ به اثرات سمی عامل بیگانه، با تحریک تولید عوامل بیگانه خوار (مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها) واکنش نشان داده باشد(۱۳،۱۲). به دلیل اهمیت گلbul‌های سفید در دفاع از بدن، هر گونه تغییر اعمال شده در ساختمان و تعداد آنها می‌تواند باعث تغییرات فیزیولوژیک بسیار زیادی برای بدن انسان گردد(۱۴). کاربرد بسیار زیاد نانوذرات مختلف نقره در کل جهان و به خصوص در کشور ما، مطالعات دقیق و جامعتری را پیرامون تأثیرات این نانوذره بر روی گلbul‌های خونی می‌طلبد. استفاده از موش‌های آزمایشگاهی به عنوان مدل‌های حیوانی و نحوه‌های مختلف تیمار و نانوذرات به دست آمده از قارچ‌ها و گیاهان با ترکیبات و قطره‌ای مختلف، افق‌های نوینی را جهت بررسی کاربردهای فناوری نانو در زیست‌شناسی نمایان می‌کند(۱۵).

سپاسگزاری

از کلیه کارکنان آزمایشگاه دانشگاه آزاد فلاورجان و آقای دکتر محمدرضا قزوینی رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی هشت بهشت اصفهان جهت همکاری‌های صمیمانه ایشان تشکر و قدردانی می‌شود.

در سلول‌های سرطانی لنفاوی فعال و باعث آپوپتوز آنها گردد(۱۱). مکانیسم دیگر به عملکرد یون‌های نقره در محلول کلوریدی برمی‌گردد. دگرگون ساختن میکروارگانیسم به وسیله تبدیل پیوندهای SH به S-Ag صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب سیستم احیاکنندگی گلbul‌های قرمز به واسطه گلوتاتیون‌ها از بین رفته و موجب همولیز احتمالی می‌گردد(۸،۹). با توجه به خواص ویژه گلbul‌های سفید در تغییر شکل یا دیاپدز (Diapedese) هنگام عبور از رگ‌های خونی و همچنین گرایش آنها به سمت حاشیه رگ‌های خونی (Margination)، این امکان وجود دارد که با حمله نانوذرات و نفوذ آنها به داخل رگ‌های خونی، گلbul‌های سفید با ۲ مکانیسم فوق از تغییرات معنی‌داری در غلظت‌های پایین مثل ۵۰ ppm از نانونقره مصنون مانده باشند. در دوزهای بالاتر، نانونقره به دلیل سطح تماس بیشتر و تأثیر بیشتر بر غشای سلول‌ها باعث نفوذ در میتوکندری گلbul‌های سفید و تغییر فعالیت آنزیمه‌ای آنها می‌گردد(۱۰،۱۱). این مسیرها احتمالاً منجر به تغییر فعالیت ژن‌های دخیل در چرخه سلولی گردیده و باعث ایجاد لوسومی و فعال‌سازی پروتوانکوژن‌ها (Protooncogenes) و تبدیل آنها به ژن‌های سرطانی یا انکوژن‌ها (Oncogenes) شده است. در مطالعه حاضر، احتمالاً با توجه به قطر و شکل نانوذره به کار رفته، مسیرهای ضدآپوپتوزی (Antiapoptotic Pathways) در

References:

- 1- Eisler R. *A review of silver hazards to plants and animals.* 1996.p. 143-4. Available from: www.images.library.wise.edu/Econatrs/Effect/Argentum/Argentum04/reference.
- 2- Hochmuth RM, Worthy PR, Evans EA. *Red cell extensional recovery and the determination of membrane viscosity.* Bio Phys J 2007; 26: 101-14.
- 3- Hori K, Martin TG, Rainey P, Robertson WO. *Believe it or not-silver still poison.* Vet Hum Toxicol 2002; 44(5): 291-2.
- 4- Hogstrand C, Wood CM. *The toxicity of silver to marine fish.* Questions & Answers; 1996.p. 109-12.
- 5- Tahan C, Leung R, Zenner GM, Ellison KD, Crone WC, Miller CA. *Nanotechnology and improving packaged food quality and safety. Part 2: nanocomposites.* Am J Physics 2006; 74: 443-8.

- 6- Powers KW, Brown SC, Krishna VB, Wasdo SC, Moudgil BM, Roberts SM. *Designing a strategies for safety evaluation of nanomaterials. Part VI. Characterization of nanoscale particles for cells: challenges and perspectives.* Toxicol Sci 2006; 90(2): 296-303.
- 7- Geho DH, Jones CD, Petricoin EF, Liotta LA. *Nanoparticles: potential biomarker harvesters.* Curr Opin Chem Biol 2006; 10(1): 56-61.
- 8- Naghsh N, Valian S, Madani H. *Investigation of Beta cells specific apoptosis on the plasma free fatty acids level.* Iran J Bioch Molecular Biol 2005; 1(1): 15-16
- 9- Machiedo GW, Powell RJ, Rush BF, Swislocki NI, Dikdan G. *The incidence of decreased red blood cell deformability in sepsis and the association with oxygen free radical damage and multiple-sys tem organ failure.* Arch Surg 1989; 124(12): 1386-9.
- 10- Hussain SM, Hess KL, Gearhart JM, Geiss KT, Schlager JJ. *In vitro toxicity of nanoparticles in BRL 3A rat liver cells.* Toxicol Vitro 2005; 19(7): 975-83.
- 11- Sriram MI, Mani Kanth SB, Kalishwaralal K, Gurunathan S. *Antitumor activity of silver nanoparticles in Dalton,s lymphoma ascites tumor model.* Int J Nanomedicine 2010; 5: 753-62.
- 12- Wijnboven SWP, Peijnenburg WJGM, Herberts CA, Hagens WI, Oomen AG, Heugens EHW, et al. *Nanosilver: a review of avelable data and knowledge gaps in human and environmental risk assessment.* Nanotoxicol 2009; 3(2); 109-38.
- 13- Pisanic TR, Blackwell JD, Shubayev VI, Finones RR, Jin S. *Nanotoxicity of iron oxide nanoparticle internalization in growing neurons.* Biomaterials 2007; 28(16): 2572-81.
- 14- Radziuk D, Shchukin DG, Skirtach A, Mohwald H, Sukhorukov G. *Synthesis of silver nanoparticles for remote opening of polyelectrolyte microcapsules.* Langmuir 2007; 23(8): 4612-17.
- 15- Bhainsa KC, D'Souza SF. *Ex tracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Aspergillus fumigates.* Colloids Surf B Biointerfaces 2006; 47(2): 160-4.

Investigating Nanosilver Effects on Blood Cells Counter in Male Rats

Naghsh N(PhD)^{*1}, Amirkhani-Dehkordi S(MSc)², Aghababa H(PhD)³

¹*Department of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran*

²*Department of Animal Physiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran*

³*Department of Biology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran*

Received: 12 Jul 2011

Accepted: 1 Nov 2012

Abstract

Introduction: Nanosilver particles are one of the functional grounds in nanotechnology field. These nanoparticles may produce free radicals and destruct different cells. In this study, Nanosilver toxic effects on RBC and WBC numbers in male Rats were studied. Thus, male rats were treated with nanosilver and RBC and WBC were detected.

Methods: In this study, RBC was detected in male Wistar rats following exposure to 50, 100, 200 and 400ppm concentration of silver nanoparticles administrated peritoneally.

Then, RBC and WBC were collected in rats 3, 8 and 12 days after treatment of nanosilver particles. Numbers of RBC and WBC were compared in treatment and control groups.

Results: The study results indicated that dose of 400ppm nanosilver was effective on decrease of RBC and increase of WBC in treatment rats 12 day after treatment. These results were significant ($p \leq 0.01$).

Discussion: The efficiency of 400ppm concentration of nanosilver, RBC decease and WBC increase could be referred to probabale lyses of RBC cell membranes and sever incitement of cellular immune system. The extra investigation is recommended regarding variety of new shapes, sizes and composition of nanosilver.

Keywords: Nanosilver; Rat; RBC; Toxic effects; WBC

This paper should be cited as:

Naghsh N, Amirkhani-Dehkordi S, Aghababa H. ***Investigating nanosilver effects on blood cells counter in male rats.*** J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2013; 20(6): 716-23.

****Corresponding author:*** Tel: +98 311 2212857, Email: naghsh@iaufala.ac.ir