



بررسی تأثیر پیش درمانی با اکسیژن بر مهار نفروتوکسیسیتی حاد القا شده به وسیله جنتامایسین در رت

مجید طوافی^۱, حسن احمدوند^۲, سمیرا گودرزی^{*۳}, بهرام رسولیان^۴

۱- دانشیار گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، لرستان، ایران

۲- دانشیار گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، لرستان، ایران

۳- دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، لرستان، ایران

۴- استادیار گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، لرستان، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۰/۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۹/۲۷

چکیده

مقدمه: به نظر می‌رسد سمیت جنتامایسین به علت تولید گونه‌های واکنشی اکسیژن ROS درون سلول‌ها باشد. شواهدی است که پیش درمانی با اکسیژن میزان و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانتی را افزایش می‌دهد. در این مطالعه به بررسی تأثیر پیش درمانی با اکسیژن در مهار نفروتوکسیسیتی جنتامایسینی پرداخته شده است.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۸ راس رت ماده بالغ (نژاد اسپراغ) به طور تصادفی به ۶ گروه ۸ تایی تقسیم شدند. گروه اول، به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد و برای سایر گروه‌ها دوزهای مختلف اکسیژن به همراه mg/kg ۱۰۰ جنتامایسین به مدت ۸ روز به صورت داخل صفاقی استفاده شد. بعد از آخرین تزریق، ادرار ۲۴ ساعته تهیه، نمونه خون گرفته و کلیه طرف چپ حیوان در محلول فرمال سالین فیکس گردید. مالون دی‌الدهید (MDA)، کراتینین و اوره سرم و نیز کراتینین ادرار اندازه‌گیری شد. برش‌های بافتی ۵ میکرونی از نواحی متفاوت کلیه به طریقه PAS رنگ‌آمیزی گردید. دانسیته حجمی لوله‌های خمیده نزدیک، نکروز توبولی و انفیلتراسیون لنفوسيتی بافت بینابینی به طریقه نیمه کمی بررسی شد. جهت مقایسه داده‌ها بین گروه‌ها از آزمون Mann Withney استفاده شد.

نتایج: پیش درمانی با اکسیژن در مهار MDA سرمی، بهبود کراتینین و اوره سرمی و ادراری، حفظ دانسیته حجمی توبولی، کاهش نکروز توبولی و کاهش انفیلتراسیون لنفوسيتی توانسته است در گروه‌های ۶ و ۴ نسبت به گروه ۲ به طور معنی‌داری مؤثر باشد ($p < 0.05$).

نتیجه‌گیری: پیش درمانی و کاربرد همزمان اکسیژن، نفروتوکسیسیتی جنتامایسینی را بهبود می‌بخشد ولی نمی‌تواند آنها را در سطح کنترل حفظ کند.

واژه‌های کلیدی: جنتامایسین، پیش درمانی با اکسیژن، رادیکال‌های آزاد، آنتی اکسیدانت

مقدمه

علوم پزشکی شهید بهشتی به خرم آباد، به مدت یک هفته نگهداری شدند تا با شرایط جدید تطبیق داده شوند. بر اساس فرمول $\phi^2 = \frac{nD^2}{2a\delta}$ (n=تعداد در هر گروه) (a=تعداد گروه‌ها) (δ =انحراف معیار) (D=تفاوت دو میانگین) تعداد حجم نمونه ۵ به دست آمد که با توجه به مرگ و میر احتمالی و نتایج مطمئن‌تر هر گروه ۳ حیوان بیشتر در نظر گرفته شد. بر همین اساس ۴۸ عدد رت ماده بالغ به طور تصادفی به ۶ گروه ۸ تایی تقسیم شدند و طبق گروه‌بندی زیر مورد بررسی قرار گرفتند. گروه اول: (کنترل) قرارگیری در محفظه با جریان هوای معمولی و ۲۴ ساعت بعد تزریق داخل صفاقی سالین به مدت ۸ روز.

گروه دوم: قرارگیری در محفظه با جریان هوای معمولی و ۲۴ ساعت بعد شروع تزریق روزانه جنتامایسین 100 mg/kg به مدت ۸ روز.

گروه سوم: روزی ۲ ساعت در برابر اکسیژن به مدت ۲ روز و سپس تزریق روزانه جنتامایسین 100 mg/kg به مدت ۸ روز. گروه چهارم: روزی ۴ ساعت در برابر اکسیژن به مدت ۲ روز و سپس تزریق روزانه جنتامایسین 100 mg/kg به مدت ۸ روز. گروه پنجم: روزی ۴ ساعت به مدت ۴ روز در معرض اکسیژن و سپس تزریق روزانه جنتامایسین 100 mg/kg به مدت ۸ روز.

گروه ششم: دو روز پیش درمانی با اکسیژن و از روز سوم هر روز ۲ ساعت قبل از تزریق جنتامایسین در معرض اکسیژن قرار گرفتند. اکسیژن توسط دستگاه Super Oxygen HMS-5 با خلوص ۹۰ درصد و دبی ۲ لیتر بر دقیقه مورد استفاده قرار گرفت. بعد از آخرین تزریق، رت‌ها در قفس متابولیک قرار گرفتند و ادرار ۲۴ ساعته آنها جمع‌آوری شد.

دستگاه اکسیژن از محفظه مخصوصی با ابعاد $(35 \times 25 \times 20 \text{ cm})$ از جنس پلکسی‌گلاس تهیه شد که دارای یک سوراخ ورودی و یک سوراخ خروجی بود و در هنگام بسته بودن درب محفظه مخصوص، به غیر از این دو سوراخ ارتباطی با محیط بیرون نداشت. پروب اکسیژن متر به گونه‌یی درون محفظه مخصوص جای داده شده بود که رت‌ها نتوانند آسیبی

آناتوپیک‌های آمینو نوکلئوزیدی به طور وسیعی برای درمان عفونت‌های شدید باکتری‌های گرم منفی به کار می‌رود و پرکاربردترین این دسته داروها، جنتامایسین است. مهم‌ترین عوارض این دارو نفروتوكسیستی است که مسئول ۱۰-۲۰ درصد نارسایی کلیوی حاد در ۱۰-۲۰ درصد افراد است. ۳۰ درصد از بیماران درمان شده با جنتامایسین بیش از ۷ روز عالیم نفروتوكسیستی را نشان می‌دهند و این مسئله مصرف این دارو را محدود کرده است(۱). هرچند مصرف روزانه این دارو، خطر نفروتوكسیستی این دارو را نسبت به تزریق یک باره کم کرده است اما همچنان شیوع نارسایی حاد کلیوی با جنتامایسین بالا است. نفروتوكسیستی با جنتامایسین پدیده پیچیده‌ای است که با افزایش کراتینین سرم- کاهش (GFR: Glomerular Filtration Rate) - افزایش نیتروژن اوره خون (BUN: Blood Urea Nitrogen) و نکروز شدید لوله‌های خمیده نزدیک و به دنبال اینها با نارسایی کلیوی همراه است (۲-۴). به نظر می‌رسد سمیت جنتامایسین به علت تولید گونه‌های واکنشی اکسیژن (ROS: Reactive Oxygen Species) درون سلول‌ها باشد(۷-۲). از طرفی ROS به عنوان عامل سببی مرگ سلولی در شرایط پاتولوژیک متفاوت معرفی شده است. شواهدی است که جنتامایسین می‌تواند موجب تکثیر سلول‌های مزانژال داخل گلومرولی و نیز موجب انقباض سلول‌های مزانژال شود(۱). از طرفی نتایج برخی بررسی‌ها نشان داده است عوامل آنتی‌اکسیدانت نظیر ویتامین E و پروبوکول (۸،۶،۴) آمینوگونیدین(۷) لیکوپن(۳) می‌توانند در کاهش سمیت جنتامایسین مؤثر باشند. شواهدی است که پیش درمانی با اکسیژن میزان و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی را افزایش و توان جاندار را در مقابله با رادیکال‌های آزاد را افزایش می‌دهد(۹-۱۲)، لذا در این مطالعه به بررسی اثر پیش درمانی با اکسیژن را برای اول بار در مهار نفروتوكسیستی جنتامایسینی پرداخته شده است.

روش بررسی

۴۸ رت ماده نژاد اسپرائگ دو ماهه که بعد از انتقال از دانشگاه


که در داخل پروب بودند، مورد شمارش نقطه واقع شدند و اگر لوله‌ای با اضلاع پروب برخورد کرده بود، مواردی که با اضلاع بالا و راست پروب برخورد نموده، مورد شمارش نقطه واقع می‌شدند و اگر لوله‌ای با اضلاع پایین و چپ پروب برخورد داشت از محاسبه کنار گذاشته می‌شد. در واقع نقاطی (+) شمارش می‌شد که با پوشش لوله خمیده نزدیک برخورد داشته و یا اینکه بالا و راست نقطه در داخل پوشش لوله قرار می‌گرفت (۱۳) و تصویر ۱). در مجموع بین ۴۰-۷۰ میدان دید از لامهای هر کلیه مورد شمارش نقطه قرار گرفت. دانسیته حجمی لوله‌های خمیده نزدیک با استفاده از فرمول $\Sigma Pp = \Sigma Pt/Vv$ (۱۴)

ΣPp = مجموع تعداد نقاط که با پوشش لوله‌های خمیده نزدیک در n میدان تحت بررسی برخورد داشته‌اند.

ΣPt = مجموع تعداد نقاط پروب در n میدان دید تحت بررسی $n \times 360$

به آن وارد کنند. بعد از کالیبره کردن دستگاه اکسیژن‌متر، رت‌ها در محفظه مخصوص قرار داده شدند و سپس برای ایجاد محیط هیپراکسیک یک شیلنگ مرتبط با کپسول حاوی اکسیژن با خلوص بالا ($\geq 85\%$) به سوراخ ورودی متصل شد، سپس به مدت حدود ۱۰ دقیقه با برقراری جریان نسبتاً بالای اکسیژن ($\geq 5\text{lit/min}$) هوای درون محفظه تخلیه شده و درصد خلوص اکسیژن به حدود ۹۰ درصد می‌رسید.

۴۸ ساعت بعد از ثبوت کلیه‌ها به روش معمول پروسس داده شد و از آنها برش‌های ۵ میکرونی تهیه و سپس تحت رنگ‌آمیزی PAS قرار گرفتند. دانسیته حجمی لوله‌های خمیده نزدیک با استفاده از یک پروب نقطه (مستطیل 14×13 دارای ۳۶۰ نقطه) و روش شمارش نقطه برآورد گردید. به کمک میکروسکوپ دارای دوربین و با اتصال به کامپیوتر تصویر میدان دید در بزرگنمایی ۴۰۰ به مونیتور و روی پروب منتقل شد. لوله‌های خمیده نزدیک (واجد حاشیه مساوی ارغوانی رنگ)



تصویر ۱: تصویر میکروسکوپی کورتکس کلیه واقع بر پروب نقطه

لوله‌های خمیده نزدیک با ساختار طبیعی دارای حاشیه مساوی در راس سلول‌های پوشش لوله می‌باشند. رنگ آمیزی پاس و بزرگنمایی ۴۰۰.

متفاوت کلیه تهیه شده بودند در زیر میکروسکوپ بین ۱۷-۱۲ میدان دید تصادفی با بزرگنمایی ۴۰۰ از کورتکس کلیه بررسی

برای بررسی اندازه‌گیری نکروز توبولی از روش Farombi استفاده گردید (۲). برش‌های کلیه هر حیوان که از نواحی

استاندار وجود داشت. برای آماده سازی نمونه ها داخل لوله شماره یک ۱۰۰ میکرولیتر محلول R1 و داخل لوله شماره دو نیز ۱۰۰ میکرولیتر محلول R2 ریخته شد. بعداز گذشت ۲۵ ثانیه محتويات دو لوله با هم مخلوط گردید. سپس به هر لوله ۲۰ میکرولیتر سرم یا ادرار اضافه شد در لوله شماره سه نیز ۲۰ میکرولیتر ماده استاندارد اضافه گردید. سپس جذب نوری نمونه ها در دستگاه اسپکتروفوتومتر و با استفاده از طول موج ۵۰۰ نانومتر اندازه گیری شد. کلیه مراحل بالا برای تمام نمونه های سرمی و ادرار های جمع آوری شده، انجام شد. به منظور کاهش خطای اندازه گیری از سرم یا ادرار هر موش دو نمونه برای قرار گیری در دستگاه اسپکتروفوتومتر تهیه و میانگین جذب نوری آنها گزارش گردید.

در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از استرس اکسیداتیو مقدار مالون دیالدهید سرمی (MDA) سرم به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو اندازه گیری شد. مقدار MDA بر اساس میزان تشکیل کمپلکس MDA با تیوباربیتوريک اسید (TBARS) و رسوب پروتئين ها با تری کلورو استیک اسید (TCA) سنجیده گردید. مقدار TBARS به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتری و طول موج ۵۳۵ نانومتر اندازه گیری شد.

جهت مقایسه متغیرهای هیستوپاتولوژیک و عوامل بیوشیمیایی خون و ادرار به دلیل عدم توزیع نرمال داده ها از تست ناپارامتری Mann-Witnny استفاده گردید. سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

نتایج

جنتامايسین موجب افزایش معنی دار نکروز توبیولی نسبت به گروه کنترل شده است ($p < 0/05$). اکسیژن درمانی در گروه چهارم (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامايسین به مدت ۸ روز) و گروه ششم (پیش درمانی و درمان هر روزه با اکسیژن همراه با جنتامايسین) توانسته نسبت به گروه ۲ (جنتامايسین بدون درمان) به طور معنی دار از افزایش نکروز توبیولی جلوگیری کند ولی نتوانسته آن را در حد کنترل حفظ کند ($p < 0/05$) (نمودار ۱).


گردید. این روش یک روش نیمه کمی است که از یک رتبه بندی ۴-۰ استفاده می گردد. در این روش = عدم وجود سلول نکروزی در لوله های خمیده نزدیک در میدان دید، ۱ = وجود یک سلول نکروزی در لوله های خمیده نزدیک در لوله های پراکنده در میدان دید، ۲ = بیش از یک سلول نکروزی در لوله های خمیده نزدیک، ۳ = لوله های با نکروز کامل (ریزش پوشش) به طور پراکنده و ۴ = نکروز کامل (در میدان دید تمام لوله های خمیده ریزش پوشش را نشان می دهدند.

برای بررسی ارتashاج لنفوسيتي، برش های کلیه هر حيوان در زير ميكروسكوب با بزرگنمایي ۴۰۰ برابر ميدان ديده هاي تصادفي از كورتكس انتخاب و بر اساس وسعت پراكنش لنفوسيتها در ميدان دید، شدت ارتashاج آن به روش زير بين ۰ تا ۴ رتبه بندی شد: در اين رتبه بندی = فاقد ارتashاج لنفوسيتي، ۱ = ۰-۲۵٪ ميدان ديد داراي ارتashاج لنفوسيتي، ۲ = ۲۵-۵۰٪ ميدان ديد داراي ارتashاج لنفوسيتي، ۳ = ۵۰-۷۵٪ ميدان ديد داراي ارتashاج لنفوسيتي و ۴ = ۷۵-۱۰۰٪ ميدان ديد داراي ارتashاج لنفوسيتي (۱۵).

مقدار اوره و کراتينين با استفاده از کيت های آماده (ایران/ پارس آزمون) اندازه گیری گردید. هر کيت اوره حاوی سه محلول R1، R2 و R3 و یک محلول استاندار بود. برای سنجش اوره ادرار مطابق با دستور کيت ابتدا ۹۹ ميلی لیتر از محلول R1 با يك ميلی لیتر از محلول R2 مخلوط تا محلول اوليه تهیه گردید. سپس داخل لوله شماره یک ۱۰ میکرولیتر ادرار يا سرم و در لوله شماره دو ۱۰ میکرولیتر از محلول استاندارد ریخته شد. در ادامه به هر دو لوله ۱۰۰ میکرولیتر از محلول اوليه اضافه و با کمک ورتكس محتويات لوله ها مخلوط شدند. پس از آن لوله ها به مدت ۵ دقيقه در دمای ۳۷ درجه سانتي گراد گرفتند. سپس به هر لوله ۱۰۰ میکرولیتر از محلول R3 اضافه شد. پس از مخلوط شدن با ورتكس لوله ها به مدت ۱۰ دقيقه در دمای ۳۷ درجه سانتي گراد قرارداده شدند. برای خواندن ميزان جذب shimadzu, uv-160/Japan و طول موج ۵۷۸ نانومتر استفاده شد.


در کيت آماده کراتينين دو محلول R1 و R2 و یک محلول

جنتامایسین موجب افزایش معنی دار ارتضاح لنفوسيتی نسبت به گروه کنترل شده است ($p<0.05$). اکسیژن درمانی در گروه چهارم (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) و گروه ششم (پیش درمانی و درمان هر روزه با اکسیژن همراه با جنتامایسین) درمان توانسته است نسبت به گروه ۲ (جنتامایسین بدون درمان) به طور معنی دار از افزایش ارتضاح لنفوسيتی جلوگیری کند ($p<0.05$) ولی نتوانسته آن را در حد کنترل حفظ کند (نمودار ۳).




نمودار ۱: مقایسه نکروز توبیولی لوله های خمیده نزدیک

جنتامایسین موجب کاهش معنی دار دانسیته حجمی لوله های خمیده نزدیک نسبت به گروه کنترل شده است ($p<0.05$). در گروه چهارم (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) و گروه ششم (پیش درمانی و درمان هر روزه با اکسیژن همراه با جنتامایسین) اکسیژن درمانی توانسته است نسبت به گروه ۲ (جنتامایسین بدون درمان) به طور معنی دار از کاهش دانسیته حجمی لوله های خمیده نزدیک جلوگیری کند ($p<0.05$) ولی نتوانسته آنرا در حد کنترل حفظ کند (نمودار ۲).



نمودار ۴: مقایسه ارتضاح لنفوسيتی در کلیه رت ها


جنتامایسین موجب افزایش معنی دار Cast در کلیه رت ها نسبت به گروه کنترل شده است ($p<0.05$). اکسیژن درمانی در گروه چهارم (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامایسین ۸ روز) و گروه ششم (پیش درمانی و درمان هر روزه با اکسیژن همراه با جنتامایسین) توانسته است نسبت به گروه ۲ (جنتامایسین بدون درمان) به طور معنی دار از افزایش ارتضاح لنفوسيتی جلوگیری کند ($p<0.05$) ولی نتوانسته آن را در حد کنترل حفظ کند (نمودار ۴).



نمودار ۲: مقایسه دانسیته حجمی لوله های خمیده نزدیک کلیه رت ها

روز) و گروه ۶ (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۲ ساعت و ۲ ساعت اکسیژن روزانه در طی ۸ روز همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) کاهش معنی دار کراتینین سرم نسبت به گروه جنتامایسین بدون درمان دیده می شود ولی نتوانسته است کراتینین سرم را به سطح کنترل و نرمال برساند (جدول ۱).

جنتامایسین موجب افزایش معنی دار اوره سرم نسبت به گروه کنترل شده است. در گروه ۴ (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) و گروه ۶ (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۲ ساعت و ۲ ساعت اکسیژن روزانه در طی ۸ روز همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) کاهش معنی دار اوره سرم نسبت به گروه جنتامایسین بدون درمان دیده می شود ولی نتوانسته است اوره سرم را به سطح کنترل و نرمال برساند (جدول ۱).



نمودار ۴: مقایسه میزان cast در کلیه رت‌ها (رتیه بندی ۰-۴)

جنتامایسین موجب افزایش معنی دار کراتینین سرم نسبت به گروه کنترل شده است. در گروه ۴ (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامایسین به مدت ۸

جدول ۱: اثر پیش درمانی با اکسیژن بر کراتینین، اوره، مالون دیالدهید سرمی و کراتینین ادراری در نفروتوکسیستی جنتامایسینی

کراتینین ادرار (mg/dl) (انحراف معیار ± میانگین)	مالون دیالدهید سرمی (nmol/mg protein) (انحراف معیار ± میانگین)	اوره سرمی (mg/dl) (انحراف معیار ± میانگین)	کراتینین سرمی (mg/dl) (انحراف معیار ± میانگین)	
۴۰/۲۵ ± ۵/۹۹	۰/۲۳ ± ۰/۰۲۷	۵۶/۸ ± ۵/۱۴	۰/۶۹ ± ۰/۰۴	گروه یک
۹۸/۴ ± ۷/۶۹ *	۰/۷۰۱ ± ۰/۰۵۶ *	۱۹۸/۴۲ ± ۵۸/۱۶ *	۲/۹۸ ± ۰/۲۵ *	گروه دو
۸۱/۷۵ ± ۱۴/۲۵ *	۰/۵۴۳ ± ۰/۰۴۵ *	۱۶۰/۱۴ ± ۱۳/۲۱ *	۲/۷ ± ۰/۴۰ *	گروه سه
۶۹/۰۸ ± ۸/۸۵ **#	۰/۴۱۳ ± ۰/۰۳۴ * #	۱۲۰/۵ ± ۵/۲۵ * #	۱/۶۰ ± ۰/۰۶ * #	گروه چهار
۸۳/۱۱ ± ۸/۳۱ *	۰/۵۰۵ ± ۰/۰۵۱ *	۱۹۲/۳ ± ۱۷/۶۳ *	۲/۷۷ ± ۰/۴۵ *	گروه پنج
۶۶/۳۳ ± ۵/۷۵ **#	۰/۴۱۴ ± ۰/۰۲۶ * #	۱۱۷/۶۶ ± ۵/۳۸ * #	۱/۷۷ ± ۰/۱۷ * #	گروه شش

* نشان‌دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل

نشان‌دهنده تفاوت معنی دار نسبت به گروه ۲ (جنتامایسینی بدون درمان)

مدت ۲ روز، روزی ۲ ساعت و ۲ ساعت اکسیژن روزانه در طی ۸ روز همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) کاهش معنی دار مالون دیالدهید سرم نسبت به گروه جنتامایسین بدون درمان دیده می شود ولی نتوانسته است مالون دیالدهید سرم را به سطح کنترل و نرمال برساند (جدول ۱).

در بررسی اثر پیش درمانی با اکسیژن بر مالون دیالدهید سرم مشاهده شد جنتامایسین موجب افزایش معنی دار مالون دیالدهید سرم نسبت به گروه کنترل شده است. در گروه ۴ (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامایسین ۸ روز) و گروه ۶ (پیش درمانی با اکسیژن به

باعث ایجاد استرس اکسیداتیوی شده است که بدن توان مقابله با آن را نداشته است. به علاوه از نتایج به دست آمده بر می‌آید که با کاهش پراکسیداسیون لیپیدی به طور معنی‌دار مارکرهای فعالیت کلیه بهبود یافته‌اند.

در مطالعاتی که در مورد ایسکمی- ریپرفیوژن بافت کلیه رت صورت گرفته است، مشخص شد که ایجاد حالت آماده باش زودرس قابل توجه در بافت کلیه با پیش درمانی ۱، ۳ یا ۶ ساعته با اکسیژن ممکن نیست. تجویز روزانه یک ساعت اکسیژن به مدت ۳ روز تا حدی مؤثر بود، ولی بیشترین تأثیر را تجویز روزانه یک ساعت اکسیژن به مدت ۵ روز داشت (۱۰).

جنتامایسین هنوز هم یک آنتی‌بیوتیک مهم در مقابل عفونت‌های تهدیدکننده زندگی است و به دلیل عوارض، در مقابل نفروتوکسیسیتی آن بایستی در کلینیک تمھیداتی اندیشیده شود ولی به طور معمول در این مورد کوتاهی صورت می‌گیرد. در مطالعات زیادی گزارش شده است که رادیکال‌های آزاد اکسیژن از مدیاتورهای مهم در القای نارسایی حاد کلیوی به دنبال جنتامایسین می‌باشند (۱۶، ۳).

ایجاد حالت آماده باش عبارت است از آماده سازی بافت‌هایی مانند قلب و کلیه و غیره در برابر آسیب عواملی چون ایسکمی- ریپرفیوژن. این آماده‌سازی می‌تواند توسط دوره‌های کوتاه مدت ایسکمی- ریپرفیوژن یا عوامل متعدد دیگری ایجاد شود. یکی از این عوامل، قرار دادن موقت حیوان در محیط اکسیژن خالص یا با درصدهای بالای اکسیژن است که به تازگی تحقیقاتی در مورد آن در بافت‌های قلب، مغز و کلیه صورت گرفته است (۱۷-۱۹). می‌توان چنین تصور کرد که پیش درمانی کوتاه مدت با اکسیژن باعث استرس اکسیداتیو خفیف شده (۱۷) و این استرس منجر به تحریک مکانیزم‌های دفاعی ذاتی بافت علیه آسیب رادیکال‌های آزاد اکسیژن خواهد شد. این مکانیسم‌ها شامل مواد و آنزیمهای آنتی‌اکسیدان است. از آنجا که بخش عمده‌ای از آسیب ایسکمی- ریپرفیوژن به علت رادیکال‌های آزاد ایجاد می‌شود، این امر می‌تواند منجر به مقاومت بیشتر بافت در برابر ایسکمی شود.

در مطالعاتی که در مورد ایسکمی- ریپرفیوژن بافت کلیه رت

همچنین در بررسی اثر پیش‌درمانی با اکسیژن بر کراتینین ادرار مشاهده گردید جنتامایسین موجب افزایش معنی‌دار کراتینین ادرار نسبت به گروه کنترل شده است. در گروه ۴ (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۴ ساعت همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) و گروه ۶ (پیش‌درمانی با اکسیژن ۲ روز، روزی ۲ ساعت و ۲ ساعت اکسیژن روزانه در طی ۸ روز همراه با جنتامایسین به مدت ۸ روز) کاهش معنی‌دار کراتینین ادرار نسبت به گروه جنتامایسین بدون درمان دیده می‌شد ولی نتوانسته است کراتینین ادرار را به سطح کنترل و نرمال برساند (جدول ۱).

بحث و نتیجه‌گیری

بر اساس کارهای انجام شده بر روش پیش‌درمانی با اکسیژن چنین به نظر می‌رسد که در دوزها و زمان‌های خاصی از اکسیژن درمانی، پراکسیداسیون لیپیدی کاهش یافته است. این مسئله مؤکد این نکته است که پیش درمانی با اکسیژن توانسته است به نحوی بدن را در کاهش و برداشت رادیکال‌های آزاد کمک کند و از افزایش مالون دی‌الدهید سرمی در مسمومیت جنتامایسینی بکاهد. هر چند مطالعه حاضر بیانگر مکانیسم‌های مولکولی در گیر در چگونگی کاهش رادیکال‌های آزاد نیست ولی کاهش مالون دی‌الدهید سرمی افزایش توان بدن جاندار را در برداشت رادیکال‌های آزاد به دنبال اکسیژن درمانی را تأیید می‌کند. چنانچه از نتایج این تحقیق بر می‌آید در گروه سوم (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۲ روز، روزی ۲ ساعت) کاهش معنی‌داری در MDA سرمی ایجاد شده است و به موازات آن تأثیر معنی‌داری بر بهبود اوره و کراتینین سرم و ادار مشاهده نشده است که حاکی از این موضوع که این اندازه اکسیژن درمانی تحریک کافی برای سیستم آنتی‌اکسیدانتی نداشته است. از طرفی نتایج در گروه پنجم (پیش درمانی با اکسیژن به مدت ۴ روز، روزی ۴ ساعت) نامناسب بوده و حتی در بعضی موارد مثلاً میزان Cast در لوله‌ها و فیلتراسیون لکوسیتی حتی از گروه دریافت‌کننده جنتامایسین بدتر شده است که احتمالاً اثر نامطلوب این روش (روزی ۴ ساعت به مدت ۴ روز اکسیژن درمانی) حاصل آن است که این روش

در کشور ترکیه انجام شده است که البته در آن این پیش درمانی ۷۵ دقیقه در فشار ۲/۸ اتمسفر، ۳۰ دقیقه قبل از ایسکمی) فقط درجه آسیب بافتی کلیه را کاهش داده است ولی در بهبود عملکرد کلیه بی تأثیر بوده است(۲۲). در مورد بافت نخاع خرگوش با تجویز روزانه یک ساعت اکسیژن نورمو باریک به مدت ۵ روز و در مورد بافت مغز رت قرارگیری طولانی مدت در محیط هیپراکسیک (۲۴ ساعته) توانسته است مقاومت در برابر ایسکمی را القا کند(۲۰،۲۳).

پیش درمانی و کاربرد همزمان اکسیژن تعییرات بافتی کلیه، اوره و کراتینین سرمی در نفروتوكسیستی جنتامایسینی را بهبود می بخشد ولی نمی تواند آنها را در سطح کنترل حفظ کند.

سپاسگزاری

از دانشگاه علوم پزشکی لرستان بابت حمایت های مالی و همچنین از زحمات استادی گرانقدر کمال قدردانی را داریم.

صورت گرفته است، مشخص شد که ایجاد حالت آماده باش زودرس قابل توجه در بافت کلیه با پیش درمانی ۱، ۳ یا ۶ ساعته با اکسیژن ممکن نیست. تجویز روزانه یک ساعت اکسیژن به مدت ۳ روز تا حدی مؤثر بود، ولی بیشترین تأثیر را تجویز روزانه یک ساعت اکسیژن به مدت ۵ روز داشت(۱۰). احتمال ایجاد حالت ایجاد آماده باش تأخیری در بافت کلیه در برابر آسیب ایسکمی - ریپر فیوژن با تجویز اکسیژن نیز ثابت شده است(۲۰). برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ میلادی در بررسی هایی که توسط Tahepol و همکاران و نیز Kim و همکاران انجام شد، نشان داده شد که قرارگیری یک یا سه ساعته رت ها در محیط هایپراکسیک می تواند موجب ایجاد هر دو مرحله زودرس و تأخیری PC در بافت قلب ایزوله شود(۲۱،۲۲).

اخیراً مطالعه ای در مورد پیش درمانی با محیط با اکسیژن هایپر باریک بر آسیب ایسکمی - ریپر فیوژن کلیه توسط Gurer

References:

- 1- Salgado CM, Hernandes FL, Novoa JM. *Glomerular nephrotoxicity of amino nucleosides*. Toxicol Applied Pharmacol 2007; 223: 86-98.
- 2- Farombi EO, Ekor M. *Curcumin attenuates gentamicin induced renal oxidative damage in rats*. Food Chem Toxicol 2006; 44(9): 1443-8.
- 3- Karahan I, Ateşşahin A, Yilmaz S, Ceribaşı AO, Sakin F. *Protective effect of lycopene on gentamicin-induced oxidative stress and nephrotoxicity in rats*. Toxicology 2005; 215(3): 198-204.
- 4- Vijay KK, Naidu MU, Anwar A, Ratnakar KS. *Probucol protects against gentamicin induced nephrotoxicocity in rats*. Indian J Pharmacol 2000; 32(2): 108-13.
- 5- Banday AA, Farooq N, Priyamvada S, Yusufi AN, Khan F. *Time dependent effects of gentamicin on the enzymes of carbohydrate metabolism, brush border membrane and oxidative stress in rat kidney tissues*. Life Sci 2008; 82(9–10): 450-59.
- 6- Kadkhodaee M, Khastar H, Arab HA, Ghaznavi R, Zahmatkesh M, Mahdavi-Mazdeh M. *Antioxidant vitamins preserve superoxide dismutase activities in gentamicin-induced nephrotoxicity*. Transplant Proc 2007; 39(4): 864-65.
- 7- Polat A, Parlakpinar H, Tasdemir S, Çolak C, Vardi N, Ucer M, et al. *Protective role of aminoguanidine on gentamicin-induced acute renal failure in rat*. Acta Histochemica 2006; 108(5): 365-71.

- 8- Abdel Niam A, Abdelvahab MH, Attia F. *Protective effects of vitamin E and probucol against gentamicin induced nephrotoxicity in rats.* Pharmacological Res 1999; 40(2): 183-7.
- 9- Wang L, Li W, Kang Z, Liu Y, Deng X, Tao H, et al. *Hyperbaric oxygen preconditioning attenuates early apoptosis after spinal cord ischemia in rats.* J Neurotrauma 2009; 26(1): 58-66.
- 10- Rasoulian B, Mohammadhosseiniakbari H, Kadkhodaee M, Mofid M, Baqeri G, Bigdeli MR, et al. *Preconditioning with oxygen attenuates rat renal ischemia-reperfusion injury.* J Surg Res 2008; 146(2): 282-8.
- 11- Yu SY, Chiu JH, Yang SD, Yu HY, Hsieh CC, Chen PJ, et al. *Preconditioned hyperbaric oxygenation protects the liver against ischemia-reperfusion injury in rats.* J Surg Res 2005; 128(1): 28-36.
- 12- Li J, Liu W, Ding S, Xu W, Guan Y, Zhang JH, et al. *Hyperbaric oxygen preconditioning induces tolerance against brain ischemia-reperfusion injury by upregulation of antioxidant enzymes in rats.* Brain Res 2008; 1210: 223-29.
- 13- Puddephat M. *Easy measure.* 2005. www.easymasure.co.uk/sos1.aspx.
- 14- Mandarim-de-Lacerda CA. *Stereological tools in biomedical research.* An Acad Bras Ciênc 2003; 75(4): 413.
- 15- Velasquez MT, Striffler JS, Abraham AA, Michaelis OE, Scalbert E, Thibault N. *Perindopril ameliorates glomerular and renal tubulointerstitial injury in the SHR/N-corpulent rat.* Hypertension 1997; 30(5): 1232-37.
- 16- Walker PD, Barri Y, Shah SV. *Oxidant mechanisms in gentamicin nephrotoxicity.* Renal Failure 1988; 21(3-4); 433-42.
- 17- Tahepo Id P, Valen G, Starkopf J, Kairane C, Zilmer M, Vaage J. *Pretreating rats with hyperoxia attenuates ischemia reperfusion injury of the heart.* Life Sci 2001; 68(14): 1629-40.
- 18- Esmaili Dehaj M, Baharvand B, Rasoulian B, Foadaddini M, Asgari A, Noroozzadeh A, et al. *Delayed protective effects of hyperoxia against cardiac arrhythmias and infarction in anesthetized rats.* J Invest Surg 2009; 151(1): 55-61.
- 19- Bigdeli MR, Hajizadeh S, Froozandeh M, Heidarianpour A, Rasoulian B, Asgari AR, et al. *Normobarichyperoxia induces ischemic tolerance and upregulation of glutamate transporters in the rat brain and serum TNF- α level.* Exp neurol 2008; 212(2): 298-306.
- 20- Wahhabaghai H, Rasoulian B, Esmaili M, Mehrani HA, Mohammadhosseiniakbari H, Mofid M, et al. *Hyperoxia induced protection against rat' renal ischemic damage; Relation to oxygen exposure time.* Ren fail 2009; 31(6): 514-21.
- 21- Kim CH, Choi H, Chun YS, Kim GT, Park GW, Kim MS. *Hyperbaric oxygenation pretreatment induces catalase and reduces infarct size in ischemic rat myocardium.* Pflugers Arch 2001; 442(4): 519-25.
- 22- Gurer A, Ozdogan M, Gomceli I, Demirag A, Gulbahar O, Arikok T, et al. *Hyperbaric oxygenation attenuates renal ischemia reperfusion injury in rats.* Transplant Proc 2006; 38(10): 33-7.
- 23- Zhang X, Xiong L, Hu W, Zheng Y, Zhu Z, Liu Y, et al. *Preconditioning with prolonged oxygen exposure induces ischemic tolerance in the brain via oxygen free radical formation.* Can J Anaesth 2004; 51(3): 258-63.

Investigating the Effect of Pretreatment with Oxygen on Inhibition of Gentamycin-induced Nephrotoxicity in Rats

Tavafi M (PhD)¹, Ahmadvand H (PhD)², Goodarzi S (MD) *³, Rasoulian B(PhD)⁴

¹Department of Anatomy and Pathology, Lorestan University of Medical Sciences, Khoram Abad, Iran

²Department of Biochemistry, Lorestan University of Medical Sciences, Khoram Abad, Iran

³General Physician, Lorestan University of Medical Sciences, Khoram Abad, Iran

⁴Department of Physiology, Lorestan University of Medical Sciences, Khoram Abad, Iran

Received: 17 Dec 2011

Accepted: 27 Dec 2012

Abstract

Introduction: The toxicity of gentamycin in the kidney seems to be related to the generation of reactive oxygen species (ROS). There is evidence that pretreatment with oxygen increases the rate and activity of antioxidant enzymes.

Methods: In this experimental study, forty eight female rats (Sprague Dawlley) were divided into 6 groups randomly (8 in each) as follows: group 1 was the control and for other groups different doses of oxygen with Gentamycin was used for 8 days intra-peritoneally (100 mg/kg). 24-hour urine samples were collected after the final injection. Blood samples were collected and serum was prepared. The left kidney was fixed in formal saline. Serum MDA, creatinin and urea, as well as urine creatinine were measured. 5-micron tissue sections were prepared and stained by Periodic Acid Shift method. Volume density of proximal tubules, necrosis of proximal tubules and lymphocytic infiltration were studied. The data were analyzed by Mann-Whitney test at significant level of $p < 0.05$.

Results: Pretreatment with oxygen was effective significantly in two groups of 6 and 4 compared to group 2. The effectiveness was found in inhibition of serum MDA, improving serum, urinary urea and creatinine, preserving tubular volume density, and reducing tubular necrotizing and lymphocytic infiltration.

Conclusion: Pretreatment with oxygen and its concomitant use can improve renal tissue changes, serum urea and creatinine in gentamycin-induced nephrotoxicity, but cannot preserve them at the same level of control.

Keywords: Anti-oxidant; Free radicals; Gentamycin; Pretreatment with oxygen

This paper should be cited as:

Tavafi M, Ahmadvand H, Goodarzi S, Rasoulian B. ***Investigating the effect of pretreatment with oxygen on inhibition of gentamycin-induced nephrotoxicity in rats***. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2013; 21(4): 423-32.

***Corresponding author:** Tel: +98 9167212606, Email: Godarzi128@yahoo.com