

اثر تزریق عصاره الکلی فرولا اسزوویتسیانا بر روی نقایص شناختی و پرواکسیداسیون القاء شده توسط اتیدیوم بروماید در مدل تجربی MS

سمیه عبدی^۱، حمیرا حاتمی نعمتی^{۲*}، رقیه خاکپای^۳، غلامرضا دهقان^۴

مقاله پژوهشی

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، اثر ریزتزریق کوتاه مدت عصاره فرولا اسزوویتسیانا بر روی حافظه فضایی و پرواکسیداسیون لیپیدی در هیپوکامپ مدل‌های تجربی مالتیپل اسکلروزیس (MS) است.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد ۳۵ سر رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی به پنج گروه هفت‌تایی شامل کنترل، شاهد، مدل MS، و دو گروه تیمار عصاره تقسیم شدند. در گروه مدل تجربی MS، القای MS با تزریق سم اتیدیوم بروماید به هیپوکامپ انجام گرفت. یک هفته پس از القای MS، دو گروه تیمار به مدت ۳ روز عصاره فرولا اسزوویتسیانا را با دوزهای ۵g/ratm و ۱۰g/ratm دریافت کردند. پس از اتمام دوره تیمار، جهت سنجش حافظه فضایی، آزمون ماز آبی موریس انجام گرفت. در خاتمه، بعد از نمونه‌برداری از هیپوکامپ هر دو طرف و سنجش مالون‌دی‌آلدئید (MDA)، داده‌ها به صورت میانگین \pm خطای استاندارد میانگین (Mean \pm S.E.M) ارائه گردید و اختلاف معنی‌دار توسط آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) با آزمون تعقیبی Student-Newman-Keuls به وسیله نرم‌افزار Instat3 مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد که مسافت طی شده ($1022/44 \pm 53/29$) و زمان ($41/30 \pm 3/29$) رسیدن به سکوی پنهان در گروه مدل‌های MS نسبت به مسافت طی شده ($885/94 \pm 29/56$) و زمان ($36/26 \pm 0/65$) گروه کنترل سالم افزایش یافت ($P < 0/001$) و تیمار کوتاه مدت عصاره فرولا اسزوویتسیانا، مسافت ($838/39 \pm 24/16$) و زمان ($39/87 \pm 1/24$) رسیدن به سکو را در این مدل‌ها کاهش داد ($P < 0/001$). میزان MDA مدل‌های تجربی MS ($3/8 \pm 0/51$) نسبت به گروه کنترل ($0/68 \pm 0/13$) افزایش یافت ($P < 0/001$) و در مدل‌های MS تحت تیمار با عصاره فرولا ($0/34 \pm 0/04$) کاهش یافت ($P < 0/001$).

نتیجه‌گیری: تیمار عصاره فرولا اسزوویتسیانا با کاهش میزان محصولات پرواکسیداسیون لیپیدی قادر به ممانعت از کاهش روند یادگیری و حافظه در مدل‌های تجربی MS است.

واژه‌های کلیدی: هیپوکامپ، مالتیپل اسکلروزیس، مالون‌دی‌آلدئید، فرولا اسزوویتسیانا، حافظه فضایی، رت

ارجاع: عبدی سمیه، حاتمی نعمتی حمیرا، خاکپای رقیه، دهقان غلامرضا. اثر تزریق عصاره الکلی فرولا اسزوویتسیانا بر روی نقایص شناختی و پرواکسیداسیون القاء شده توسط اتیدیوم بروماید در مدل تجربی MS. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۹۷؛ ۲۶ (۱۱): ۱۰۰۸-۱۸.

- ۱- کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران
- ۲- دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران
- ۳- دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران
- ۴- استاد بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران

* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۹۱۴۴۰۰۶۲۰۳، پست الکترونیکی: homeirahatami@yahoo.com، کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

مرکزی با اتیولوژی ناشناخته است که در آن میلین رشته‌های عصبی تخریب می‌شود. از طرفی فرولا اسزوویتسیانا با خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی که دارد انتظار می‌رود با گرفتن رادیکال‌های آزاد، فعالیت‌های یادگیری و حافظه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین به نظر می‌رسد عصاره فرولا اسزوویتسیانا به واسطه تعدیل وضعیت ردوکس سلول‌های تحت شرایط استرس اکسیداتیو، به ویژه سلول‌های مغزی، اثرات حفاظتی خود را بر سیستم اعصاب مرکزی و عملکرد شناختی در شرایط پاتولوژیک اعمال می‌کند. با این وجود تا کنون اثر ریزتزریق عصاره فرولا اسزوویتسیانا بر روی عملکرد حافظه فضایی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در مدل‌های تجربی MS مطالعه نشده است. از این رو در مطالعه حاضر بر آن شدیم تا اثر ریز تزریق سم EB به عنوان القاء کننده مدل تجربی MS با دو دوز متفاوت را به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی بر عملکرد حافظه فضایی و وضعیت اکسیداتیو هیپوکامپ مدل‌های تجربی MS با استفاده از آزمون ماز آبی موریس و سنجش یکی از مهمترین پارامترهای استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار دهیم.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی گیاه فرولا اسزوویتسیانا مورد استفاده قرار گرفت که از آذربایجان شرقی جمع‌آوری شد. برای تهیه عصاره ابتدا ریشه فرولا اسزوویتسیانا با استفاده از آسیاب مکانیکی پودر گردید. سپس با استفاده از حلال اتانولی فرولا اقدام به عصاره‌گیری به روش سوکسله شد. در این روش عصاره‌گیری ۱۰ گرم پودر ریشه فرولا در ۳۰۰ میلی‌لیتر اتانول ۸۰٪ به مدت سه روز خیسانده شد. پس از صاف کردن محلول به‌دست آمده با صافی، حلال توسط دستگاه اواپراتور Evaporator تحت خلاء و در دمای ۶۰-۵۰ °C حذف شد. عصاره به‌دست آمده تا زمان استفاده در یخچال و در دمای زیر صفر درجه نگهداری شد (۱۹). در این مطالعه تعداد ۳۵ سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی (۲۵۰ ± ۵۰) گرم از حیوان خانه پاستور تهران خریداری شد و به آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم دانشگاه تبریز انتقال یافت. حیوانات قبل و در طول دوره آزمایش در شرایط سیکل روشنایی-تاریکی ۱۲ ساعته و دمای


مالتیپل اسکلروزیس Multiple sclerosis (MS) بیماری مزمنی است که از نظر پاتولوژی با التهاب، از دست دادن میلین، استرس اکسیداتیو، آسیب آکسونی در نواحی متعدد ماده سفید سیستم اعصاب مرکزی Central nervous system (CNS) مشخص می‌شود (۱). میلی‌نسیون آکسون‌ها در CNS، هدایت جهشی و سریع پیام‌های الکتریکی را فراهم می‌آورد (۲). نقایص شناختی از جمله توجه Attention، یادگیری Learning و حافظه Memory؛ در ۵۰ درصد بیماران مبتلا به MS گزارش شده است (۳، ۴). تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند که علاوه بر ماده سفید، بخش‌های خاکستری مغز به ویژه هیپوکامپ نیز دچار دمیلیناسیون و تغییرات ساختاری می‌گردند (۵).

استرس اکسیداتیو نقش کلیدی در پاتوفیزیولوژی MS ایفا می‌کند (۶). مطالعات مختلفی بیان می‌کنند که تولید گونه‌های باز فعال اکسیژن (ROS) با اختلال تثبیت حافظه در MS و مدل‌های تجربی MS در ارتباط می‌باشد (۷). سلول‌های فعال مغزی به دلیل مصرف بالای اکسیژن، در ریسک مشخصی از خطر آسیب‌دیدگی توسط رادیکال‌های آزاد قرار دارند (۸، ۶). اتیدیوم بروماید (EB) به منظور القای دمیلیناسیون سمی در جوندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد (۹، ۱۰). تزریق موضعی EB به CNS، اولیگودندروسیت‌ها و آستروسیت‌ها را به‌طور انتخابی از بین می‌برد و دمیلیناسیون کانونی در CNS را القا می‌کند (۱۱، ۱۲).

فرولا اسزوویتسیانا *Ferula szowitsiana* یکی از گیاهان دارویی جنس فرولا است که اثرات فارماکولوژیکی زیادی از عصاره این گیاه گزارش شده که شامل ضدسرطان (۱۳)، آنتی‌اکسیدانت (۱۴)، ضدالتهابی (۱۵)، ضد میکروبی (۱۶)، و فعالیت‌های آنتی‌بیوتیک (۱۷) می‌باشد. از محتویات مهم عصاره این گیاه می‌توان به گالبانیک اسید Galbanic acid، اوراپتن Auraptene و آمبلی‌پرنین Umbelliprenin اشاره کرد که هرکدام خواص مربوط به خود را دارند (۱۸). همان‌گونه که اشاره شد MS از دسته بیماری‌های خود ایمنی سیستم عصبی

تزریق داروها با استفاده از سرنگ همیلتون ۱۰۱ μ انجام گرفت. برای القای مدل تجربی MS، سم اتیدیوم بروماید به صورت تک دوز (محلول ۰/۰۱٪ اتیدیوم بروماید در سالین ۰/۹٪ استریل) و در حجم ۳ میکرولیتر و با سرعت ۱ میکرولیتر در دقیقه به صورت دو طرفه به تشکیلات هیپوکامپ (CA₁) تزریق شد (۱۱). رت‌های گروه‌های تیمار با فرولا اسزوویتسیانا، یک هفته بعد از القای مدل تجربی MS، عصاره فرولا اسزوویتسیانا را با دوزهای ۵g/rat μ و ۱۰ g/rat μ به مدت ۳ روز و به صورت ریزتزریق دریافت نمودند.

عصاره الکلی فرولا اسزوویتسیانا به صورت محلول در سالین ۰/۹٪ استریل و در حجم ۳ میکرولیتر در دقیقه به صورت دو طرفه به تشکیلات هیپوکامپ (ناحیه CA₁) تزریق شد (تمامی تزریق‌ها در فاصله قبل از ظهر انجام می‌گرفت) (۱۱، ۲۲، ۲۳). پس از اتمام دوره تیمار، از هر یک از گروه‌های آزمایشی یک رت به صورت تصادفی انتخاب گردید. حیوانات رنگ قرمز خنثی را به منظور تعیین محل دقیق کانول‌گذاری به صورت ریز تزریق دریافت نمودند و پس از بیهوشی، سر آن‌ها با استفاده از گیوتین جدا شد و بافت مغز آن‌ها پس از شست و شو با سالین نرمال در محلول فرمالین ۲۰٪ قرار گرفت و برای تأیید بافت‌شناسی ماکروسکوپی به آزمایشگاه بافت‌شناسی منتقل گردید (شکل ۱).



شکل ۱: تأیید بافت‌شناسی ماکروسکوپی به منظور تعیین محل دقیق کانول‌گذاری. ناحیه CA₁ هیپوکامپ پس از ریز تزریق دوطرفه رنگ قرمز خنثی در تصویر مشخص است.

این دستگاه از یک حوضچه استوانه‌ای شکل سیاه رنگ (به قطر ۱۳۶ سانتیمتر و ارتفاع ۶۰ سانتی‌متر) با یک سکوی پنهان به قطر ۱۰ سانتیمتر تشکیل شده است. ۲۴ ساعت پس از اتمام

22 ± 2 درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شدند و دسترسی آزادانه به آب و غذا داشتند. کلیه آزمایشات روی حیوانات با رعایت اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام شد.

رت‌ها به طور تصادفی به پنج گروه هفت‌تایی ذیل تقسیم شدند: I- گروه کنترل (رت‌های سالم و بدون جراحی تحت تست حافظه فضایی)، II- گروه شاهد (اعمال جراحی و دریافت حلال و تحت تست حافظه فضایی)، III- گروه اتیدیوم بروماید (۰/۰۱٪) + عصاره الکلی فرولا اسزوویتسیانا با دوز ۵g/rat μ ، V- گروه اتیدیوم بروماید (۰/۰۱٪) + عصاره الکلی فرولا اسزوویتسیانا با دوز ۱۰g/rat μ . رت‌ها به صورت عمیق با تزریق داخل صفاقی کتامین (۱۰۰mg/kg) و زایلازین (۵ mg/kg) بیهوش شده (۲۰) و در دستگاه استرنوتاکس (Stoelting, USA) در موقعیت مجسمه مسطح مستقر گردیدند (۱۱). پوست ناحیه سر به حداقل میزان برش داده شده، پس از کنار زدن بافت‌های پوششی اطراف، نواحی برگما و لامبدا شناسایی شده و بر اساس مختصات ذکر شده در اطلس پاکسینوس، ناحیه مربوط به CA₁ هیپوکامپ در سطح مجسمه به صورت دوطرفه مشخص گردید (AP=-۳/۸; ML= \pm ۲/۲; DV=+۲/۷) (۲۱) کانول‌گذاری انجام شد. رت‌های نر در گروه‌های III، IV و V تحت جراحی قرار گرفتند و به مدت ۷-۵ روز دوره بهبودی را طی نمودند. ریز

جهت ارزیابی اثرات تخریبی ریز تزریق سم اتیدیوم بروماید و نیز اثرات حفاظتی عصاره فرولا اسزوویتسیانا بر حافظه و یادگیری فضایی، روش ماز آبی موریس مورد استفاده قرار گرفت.

آبی تیوباربیتوریک اسید ۰/۶٪ (w/v) به ۰/۵ میلی‌لیتر محلول رویی اضافه گردیده و به مدت ۴۵ دقیقه در حمام آب جوش حرارت دید. پس از سرد شدن، ۴ میلی لیتر n-بوتانول به مخلوط اضافه شد و پس از به هم زدن به مدت ۱۰ دقیقه در دور ۳۰۰۰ سانتریفیوژ شد. سپس جذب نوری نمونه‌ها در طول موج ۵۳۵ نانومتر توسط دستگاه اتوآنالیزور (Alcyon, USA) اندازه‌گیری شد. غلظت‌های ماده حاصله از واکنش MDA با تیوباربیتوریک اسید (TBARS) با استفاده از منحنی استاندارد MDA محاسبه شد که بر حسب nmol/mg پروتئین بیان شده است (۸).

تجزیه و تحلیل آماری

داده‌های مربوط به سرعت شنا، مدت زمان یافتن سکو، مسافت شنا و میزان محصولات پروکسیداسیون لیپیدی (TBARS)، به صورت میانگین \pm خطای استاندارد میانگین (Mean \pm S.E.M) ارائه گردید و اختلاف معنی‌دار توسط آنالیز واریانس یک طرف (ANOVA) و آزمون تعقیبی Student-Newman-keuls به وسیله نرم افزار Instat3 مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت‌ها در سطح ($P < 0.05$) معنی‌دار تلقی شد.

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه تبریز با کد ۴۰۹ تایید شده است. روش‌های اخلاقی رفتار با حیوانات منطبق با اصول اخلاقی و بین‌المللی کار با حیوانات آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه تبریز رعایت گردیده است.

نتایج

نتایج حافظه فضایی


برای بررسی فرآیند یادگیری و حافظه فضایی در طی روزهای آزمایش، نتایج آماری حاصل از میانگین سرعت شنا، میانگین زمان سپری شده برای یافتن سکو و میانگین مسافت طی شده برای رسیدن به سکو در حیوانات گروه‌های مختلف طی روزهای آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. همان‌طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است، سرعت شنای حیوانات بین گروه‌های EB3R+D5F ($91/63 \pm 2/4$) و EB3R+D10F ($86/39 \pm 5/29$) با گروه EB3R ($80/16 \pm 3/75$) در طی آزمون ماز آبی موریس به صورت معنی‌داری افزایش یافته است ($P < 0.05$). سرعت

دوره تیمار، هر رت به مدت ۵ روز و هر روز یک نوبت (هر نوبت شامل ۴ تجربه) از ۴ ربع حوضچه به طور تصادفی تحت آزمایش قرار گرفت. فضای اطراف حوضچه با ۴ جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص شد تا ۴ موقعیت آلترناتیو برای شروع سنجش ماز آبی موریس فراهم شود. به هر رت ۶۰ ثانیه اجازه شنا برای یافتن سکو داده شد. اگر رت در پایان ۶۰ ثانیه موفق به یافتن سکو نمی‌شد از آب خارج می‌گردید و بر روی سکو قرار داده می‌شد. در پایان هر تجربه رت‌ها به مدت ۱۵ ثانیه بر روی سکو استراحت کردند. زمان سپری شده برای یافتن سکو و مسافت طی شده برای رسیدن به سکو، به‌عنوان پارامترهای ارزیابی یادگیری و حافظه فضایی ثبت گردید. لازم به ذکر است که سرعت شنای حیوانات نیز به عنوان شاخصه‌ای از توانایی حرکتی حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت (سنجش ماز آبی موریس همیشه در فاصله قبل از ظهر انجام می‌گرفت) (۲۴).


۲۴ ساعت بعد از آخرین روز سنجش ماز آبی موریس، تمامی رت‌ها با تزریق داخل صفاقی کتامین (100 mg/kg) و زایلازین (5 mg/kg) بیهوش شدند (۲۰). سپس سر توسط گیوتین جدا شد و بلافاصله مغز خارج گردید و بخش هیپوکامپ به دقت تشریح و جدا شد و توسط سالین ۰/۹٪ شستشو داده شد. هیپوکامپ جدا شده بلافاصله در نیتروژن مایع فریز گردید و تا زمان تهیه هموزن در فریزر -80°C درجه سانتی‌گراد نگهداری شد (۸، ۲۰). به منظور تهیه هموزن روی هر یک از نمونه‌ها محلول سرد KCL ۱/۱۵٪ با نسبت (۱:۱۰ w/v) اضافه گردید. سپس با استفاده از هموزنایزر مکانیکی هموزن بافت‌های هیپوکامپ تهیه گردید و بعد از سانتریفیوژ کردن در دور ۳۰۰۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، محلول رویی استخراج شد تا برای آنالیز بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گیرد (۸).

مالون‌دی‌آلدئید (MDA) حاصل تجزیه پلی‌اسیدهای چرب غیراشباع است. تولید این ماده به عنوان بیومارکری برای سنجش میزان پروکسیداسیون لیپیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۳ میلی‌لیتر اسیدفسفریک ۱٪ و ۱ میلی‌لیتر محلول

شنای حیوانات در گروه EB3R+D5F نسبت به EB3R+D10F ($P < 0/01$). بین سایر گروه‌ها اختلاف معنی‌داری مشاهده در روز چهارم آموزش افزایش معنی‌داری را نشان داده است. نشد.



نمودار ۱: مقایسه سرعت شنا بین گروه‌های کنترل، شاهد، EB3R، EB3R+D5F، EB3R+D10F.




نمودار ۲: مقایسه زمان سپری شده برای یافتن سکو بین گروه‌های کنترل، شاهد، EB3R، EB3R+D5F، EB3R+D10F.

بیانگر اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های EB3R+D5F با EB3R+D10F است. یک علامت ($P < 0/05$)، دو علامت ($P < 0/01$)، سه علامت ($P < 0/001$) (در هر گروه $n = 7$). نتایج به دست آمده از بررسی آماری نشان داد که شاخصه مسافت طی شده برای رسیدن به سکوی پنهان نیز در طی روزهای آموزش در تمامی گروه‌های آزمایشی کاهش یافته است ($P < 0/01$). با این حال، در روزهای چهارم و پنجم، گروه‌های کنترل ($899/81 \pm 35/65$) و شاهد ($885/94 \pm 29/56$) نسبت به گروه EB3R ($1022/44 \pm 53/29$) مسافت کمتری برای رسیدن به سکوی پنهان طی نمودند ($P < 0/001$). هم‌چنین گروه‌های EB3R+D5F ($842/03 \pm 38/05$) و EB3R+D10F

نمودار ۱ و ۲: مقایسه میانگین سرعت شنا حیوانات و زمان سپری شده برای یافتن سکو طی روزهای آموزش بین گروه‌های آزمایشی. گروه‌ها: Control: کنترل، Saline: شاهد، EB3R: آزمایشی. گروه‌ها: EB3R+D5F: اتیدیوم بروماید + عصاره فرولا اسزوویتسیانا با دوز $5 \mu\text{g}/\text{rat}\mu$ ، EB3R+D10F: اتیدیوم بروماید + عصاره فرولا اسزوویتسیانا با دوز $10 \mu\text{g}/\text{rat}\mu$. نتایج به صورت میانگین \pm خطای استاندارد میانگین بیان شده است. علامت \$ بیانگر اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های Control و Saline با EB3R است. علامت # بیانگر اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های EB3R با EB3R+D5F است. علامت * بیانگر اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های EB3R+D10F است و علامت &

بروماید را بهبود بخشیده و پارامتر بیوشیمیایی TBARS را به طور معنی داری به مقادیر طبیعی آن نزدیک کرد.

نتایج بیان می کنند که ریز تزریق عصاره فرولا اسزوویتسیانا به مدت سه روز، آسیب اکسیداتیو القاء شده توسط سم اتیدیوم



گروه های آزمایشی

نمودار ۴- نتایج سنجش میزان TBARS برای ارزیابی میزان پروکسیداسیون لیپیدی بین گروه های کنترل، شاهد، EB3R+D10، EB3R+D5F، EB3R

تشکیلات هیپوکامپی (CA₁) منجر به افزایش معنی دار محصولات پروکسیداسیون لیپیدی در مدل های تجربی MS می گردد. مطالعات دیگر نشان داده اند، تزریق مستقیم EB سبب القای استرس اکسیداتیو و افزایش میزان مالون دی آلدئید (MDA) که شاخص پروکسیداسیون لیپیدی است، می گردد؛ این افزایش نشان دهنده افزایش تولید رادیکال های آزاد در CNS است که با نتایج مطالعه ما موافق هستند (۹،۲۶،۲۷). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ریز تزریق عصاره فرولا اسزوویتسیانا اختلالات به وجود آمده در عملکرد یادگیری و حافظه فضایی را به صورت وابسته به دوز بهبود می بخشد. عصاره فرولا اسزوویتسیانا با دوز ۱۰g/ratq مدت زمان سپری شده و مسافت طی شده برای رسیدن به سکوی پنهان را به طور معنی داری کاهش داد. هم چنین میانگین سرعت شنا در طی روزهای آموزش بین گروه های آزمایشی به صورت معنی داری کاهش یافت، اما این کاهش در سرعت نسبت به مدت زمان سپری شده و مسافت طی شده، کمتر مشاهده شد. عصاره فرولا اسزوویتسیانا حاوی موادی آنتی اکسیدانی نظیر اوراپتن و آمبلی پرینین می باشد که این مواد به عنوان گیرنده رادیکال های آزاد، به ویژه آنیون های سوپر اکساید، عمل می کنند و سلول ها را از استرس اکسیداتیو حفاظت می کنند (۲۰، ۱۵). گیاه فرولا اسزوویتسیانا برای اولین بار است که بر روی CNS مورد مطالعه

نمودار ۴- نتایج سنجش میزان TBARS برای ارزیابی میزان پروکسیداسیون لیپیدی. گروه ها: I کنترل، II شاهد، III: اتیدیوم بروماید، IV: اتیدیوم بروماید + عصاره فرولا اسزوویتسیانا با دوز ۵g/ratq، V: اتیدیوم بروماید + عصاره فرولا اسزوویتسیانا با دوز ۱۰g/ratq. نتایج به صورت میانگین ± خطای استاندارد میانگین بیان شده است. علامت * بیانگر اختلاف معنی دار بین گروه های I و II با III است. علامت # بیانگر اختلاف معنی دار بین گروه های IV و V می باشد (در هر گروه، n = ۷، P < ۰/۰۰۱).

بحث

نتایج این تحقیق نشان داد که تزریق موضعی سم اتیدیوم بروماید به تشکیلات هیپوکامپی (CA₁)، باعث تخریب روند یادگیری، حافظه فضایی و القای استرس اکسیداتیو در مقایسه با گروه های کنترل شاهد می شود. هم چنین ریز تزریق عصاره فرولا اسزوویتسیانا به صورت کوتاه مدت، اختلالات یادگیری و حافظه و نیز افزایش بار اکسیداتیو ناشی از تزریق موضعی EB را بهبود می بخشد. نتایج مطالعه حاضر مبنی بر اختلال حافظه فضایی در مدل های تجربی MS، با نتایج به دست آمده از مطالعات انجام گرفته توسط Kim و همکاران (۷)، Ziehn و همکاران (۵) و Nizri و همکاران (۲۵) هم راستاست. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق موضعی EB به داخل

اختلالات تحلیل برنده مغزی نظیر MS مفید باشد. شایان ذکر است که مطالعه حاضر هیچ ادعایی مبنی بر بهبود روند رمیلیناسیون توسط عصاره فرولا اسزوویتسیانا ندارد. با این حال لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می‌شود. مطالعات موردی و اطلاعات کافی مربوط به گیاه فرولا اسزوویتسیانا در دسترس نبوده و همچنین در طول مطالعه، موانعی از جمله کمبود امکانات آزمایشگاهی و پرهزینه بودن تهیه لوازم مورد نیاز تحقیق، در کاهش سرعت پیشرفت آزمایشات تأثیر بسزایی داشته است.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج مقاله حاضر، ریزتزریق مستقیم سم EB سبب کاهش معنی‌دار عملکرد حافظه فضایی و افزایش بار اکسیداتیو در رت‌های نر بالغ به عنوان مدل‌های تجربی MS نسبت به گروه کنترل و شاهد گردید. از طرف دیگر ریزتزریق عصاره فرولا اسزوویتسیانا به صورت کوتاه مدت، اختلالات یادگیری و حافظه و نیز افزایش بار اکسیداتیو ناشی از تزریق موضعی EB را بهبود بخشید. همچنین ریز تزریق عصاره فرولا اسزوویتسیانا اختلالات به وجود آمده در عملکرد یادگیری و حافظه فضایی را به صورت وابسته به دوز بهبود بخشید.

سپاسگزاری

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و بدین وسیله از معاونت پژوهشی محترم دانشگاه تبریز در تأمین اعتبار لازم قدردانی می‌گردد.
تعارض در منافع: وجود ندارد.

قرار می‌گیرد اما با توجه به مطالعاتی که روی دیگر سیستم‌ها و بافت‌ها صورت گرفته و خواصی که از آن گزارش شده از جمله آنتی‌اکسیدانی، ضد التهاب، ضد سرطان، آنتی‌بیوتیک (۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳) و همچنین با توجه به مطالعاتی که در مورد مواد آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو صورت گرفته؛ این گیاه می‌تواند به عنوان یک گیرنده رادیکال‌های آزاد عمل کرده و استرس اکسیداتیو را که عامل انواعی از اختلالات تحلیل برنده CNS است، کاهش دهد (۲۸، ۲۹).

قسمت دیگری از نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصاره فرولا اسزوویتسیانا بیومارکر پروکسیداسیون لیپیدی در هیپوکامپ مدل‌های تجربی MS را به طور معنی‌داری تعدیل می‌کند. این یافته با بررسی دیگری که در آن سایر گیاهانی که خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند و باعث کاهش سطح محصولات پروکسیداسیون لیپیدی شدند، هم‌سو می‌باشد (۲۷). همچنین در مطالعات دیگری که ارتباط بین ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در مدل‌های تجربی MS صورت گرفته کاهش محصولات پروکسیداسیون لیپیدی مشاهده شده که با نتایج حاصل از این مطالعه هم‌سو می‌باشد (۲۲، ۲۷). به طور خلاصه می‌توان عنوان کرد که ریزتزریق کوتاه مدت عصاره الکلی فرولا اسزوویتسیانا می‌تواند به صورت وابسته به دوز، نقایص شناختی القاء شده توسط سم اتیدیوم بروماید در هیپوکامپ مدل‌های تجربی MS را بهبود بخشد. همچنین یافته‌های مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کنند که عصاره فرولا اسزوویتسیانا به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی استرس اکسیداتیو در نورون‌ها را مهار می‌کند و می‌تواند در درمان

References:

- 1-Bradley WG, Daroff RB, Marsden CD, Fenichel GM. *Neurology in Clinical Practice*. 4th ed. Philadelphia. Butterworth-Heinemann 2004; 1637-59.
- 2-Zhang H, Jarjour AA, Boyd A, Williams A. *Central nervous system remyelination in culture-A tool for multiple sclerosis research*. Exp Neurol 2011; 230:138-48.

- 3-Peyser JM, Rao SM, LaRocca NG, Kaplan E. *Guidelines for neuropsychological research in multiple sclerosis*. Arch Neurol 1990; 47: 94-7.
- 4-Benedict RH, Fischer JS, Archibald CJ, Arnett PA, Beatty WW, Bobholz J, et al. *Minimal neuropsychological assessment of MS patients a consensus approach*. Clin Neuropsychol 2002; 16(3): 381-97.
- 5-Ziehn MO, Avedisian AA, Tiwari-Woodruff S, Voskuhl RR. *Hippocampal CA1 atrophy and synaptic loss during experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE*. Lab Invest 2010; 90(5): 774-86.
- 6-Gilgun-Sherki Y, Melamed E, Offen D. *The role of oxidative stress in the pathogenesis of multiple sclerosis: the need for effective antioxidant therapy*. J Neurol 2004; 251: 261-8.
- 7-Kim D, Hao J, Liu R, Turner G, Shi FD, Rho JM. *Inflammation-Mediated Memory Dysfunction and Effects of a Ketogenic Diet in a Murine Model of Multiple Sclerosis*. PLoS One 2012; 7(5): 354-76.
- 8-Ghadroost B, Vafaei AA, Rashidy-Pour A, Hajisoltani R, Bandegi AR, Motamedi F, et al. *Protective effects of saffron extract and its active constituent crocin against oxidative stress and spatial learning and memory deficits induced by chronic stress in rats*. Eur J Pharmacol 2011; 677(1-3): 222-9.
- 9-Mazzanti CM, Spanevello R, Ahmed M, et al. *Pre-treatment with ebselen and vitamin E modulate acetylcholinesterase activity: interaction with demyelinating agents*. Int J Dev Neurosci 2009; 27: 73-80.
- 10- Abdel-Salam OME, Khadrawy YA, Mohammed NA, Youness ER. *The effect of gabapentin on oxidative stress in a model of toxic demyelination in rat brain*. J Basic Clin Physiol Pharmacol 2012; 23(2): 61-8.
- 11- Goudarzvand M, Javan M, Mirnajafi-Zadeh J, Mozafari S, Tiraihi T. *Vitamins E and D3 attenuate demyelination and potentiate remyelination processes of hippocampal formation of rats following local injection of ethidium bromide*. Cell Mol Neurobiol 2010; 30(2): 289-99.
- 12- Mazzanti CM, Spanevello R, Ahmed M, Schmatz R, Mazzanti A, Salbego F, et al. *Cyclosporine A inhibits acetylcholinesterase activity in rats experimentally demyelinated with ethidium bromide*. Int J Dev Neurosci 2007; 25(4): 259-64.
- 13- Soltanzad F, Samadishams S, Barar J, Nazemyieh H, Omidi Y. *Evaluation of cytotoxicity and anticancer effect of Ferula szowitsiana methanolic extract on lung cancer A549 cell-lines*. Res Pharm Sci 2012; 7.
- 14- Soltani F, Mosaffa F, Iranshahi M, Karimi G, Malekaneh M, Haghghi F, et al. *Auraptene from Ferula szowitsiana protects human peripheral lymphocytes against oxidative stress*. Phytother Res 2010; 24: 85-9.
- 15- Kohno S, Murata T, Sugiura A, et al. *Methyl galbanate, a novel inhibitor of nitric oxide production in mouse macrophage RAW264.7C*. J Nat Med 2011; 65: 353-9.
- 16- Ozek G, Ozek T, Iscan G, Baser KHC, Duran A, Hanzaoglu E. *Composition and antimicrobial*

- activity of the oils of *Ferula szowitsiana* DC from Turkey. *J Essent Oil* 2008; 20: 186-90.
- 17- Bazzaz BSF, Du AR, Iranshahi M, Naderinasab M, Karamodin MK. *Evaluating the potentiating effect of galbanic acid from Ferula szowitsiana on three common antibiotics against resistant hospital of Staphylococcus aureus*. *I J pharm* 2009; 8(3): 217-21.
- 18- Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA. *Cancer statistics*. *CH Cancer J Clin* 1999; 49: 8-31.
- 19- Mousavi SH, Tavakkol-Afshari J, Brook A, Jafari-Anarkooli I. *Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cells*. *Food Chem Toxicol* 2009; 47(8):1909-13. [Persian]
- 20- DiCarlo G, Wilcock D, Henderson D, Gordon M, Morgan D. *Intrahippocampal LPS injections reduce A β load in APP+ PS1 transgenic mice*. *Neurobiol Aging* 2001; 22(6): 1007-12.
- 21- Shati A, Elsaid F, Hafez E. *Biochemical and molecular aspects of aluminium chloride-induced neurotoxicity in mice and the protective role of Crocus sativus L. extraction and honey syrup*. *Neuroscience* 2011; 175: 66-74.
- 22- Hooshmandi Z, Rohani AH, Eidi A, Fatahi Z, Golmanesh L, Sahraei H. *Reduction of metabolic and behavioral signs of acute stress in male Wistar rats by saffron water extract and its constituent safranal*. *Pharm Biol* 2011; 49(9): 947-54.
- 23- Giralt A, Saavedra A, Carretón O, Xifró X, Alberch J, Pérez-Navarro E. *Increased PKA signaling disrupts recognition memory and spatial memory: role in Huntington's disease*. *Hum Mol Gen* 2011; 20(21): 4232-47.
- 24- Li Z, Wu CF, Pei G, Xu NJ. *Reversal of morphine-induced memory impairment in mice by withdrawal in morris water maze: possible involvement of cholinergic system*. *Pharmacol Biochem Behave* 2001; 68(3): 507-13.
- 25- Nizri E, Irony-Tur-Sinai M, Faranesh N, Lavon I, Lavi E, Weinstock M, Brenner T. *Suppression of neuroinflammation and immunomodulation by the acetylcholinesterase inhibitor rivastigmine*. *J Neuroimmunol* 2008; 203(1): 12-22.
- 26- Abdel-Salam OME, Khadrawy YA, Salem NA, Sleem AA. *Oxidative stress in a model of toxic demyelination in rat brain, the effect of piracetam and vinpocetine*. *Neurochem Res* 2011; 36(6): 1062-72.
- 27- Spanevello R, Mazzanti CM, Schmatz R, et al. *Effect of vitamin E on ectonucleotidase activities in synaptosomes and platelets and parameters of oxidative stress in rats experimentally demyelinated*. *Brain Res Bull* 2009; 80(1-2): 45-51.
- 28- Abe K, Saito H. *Effects of saffron extract and its constituent crocin on learning behaviour and long-term potentiation*. *Phytother Res* 2000; 14(3): 149-52.
- 29- Ghaffary sh, Hatami Nemati H, Dehghan Gh. *Protective effects of Short-term Administration of Saffron Extraction on Improvement of Cognitive Deficits and Decrement of Lipid Peroxidation Induced by Ethidium Bromide in Experimental Models of MS*. *Physiol Pharmacol* 2013; 17(3): 315-27. [Persian].

The effect of ethanolic extract of *Ferula szowitsiana* on cognitive deficits and lipid peroxidation induced by ethidium bromide in experimental model of MS

Somayeh Abdi¹, Homeira Hatami Nemati^{*2}, Roghayeh Khakpay³, Gholamreza Dehghan⁴

Original Article

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of short-term microinjection of *Ferula szowitsiana* extract on the process of spatial memory and lipid peroxidation in the hippocampus in an experimental model of Multiple Sclerosis (MS).

Methods: In this experimental study, 35 male Wistar rats were randomly divided into five groups. Each group has 7 rats. These groups were included control, sham, model of MS and MS groups with plant extract treatments. In the experimental model of MS groups, induction of MS was carried out by single injection of ethidium bromide (EB) into the hippocampus. One week after MS induction by EB (0.01 %), the MS groups were treated by *Ferula szowitsiana* extract (5 and 10 µg/rat) for 3 consecutive days. Finally following the treatment period, for measuring spatial memory, Morris Water Maze test was carried out and the hippocampus of both sides were dissected and used for measurement of Malondialdehyde (MDA).

Results: The results showed that in the experimental model of MS group travelled distance (1022.44±53.29) and escape latency (41.30±3.29) increased compared to travelled distance (885.94±29.56) and escape latency (36.26±0.65) in the control group (p<0.001). Short-term treatment by *Ferula szowitsiana* extract in this models decreased the travelled distance (838.39±24.16) and escape latency (39.87±1.24) (P<0.001). MDA increased in the experimental model of MS group (3.8±0.51) compared to the control group (0.68±0.13) (p<0.001) and in the *Ferula* treated group (0.34±0.04) decreased compared to the MS animals (P<0.001).

Conclusion: Treatment with *Ferula szowitsiana* extract is able to prevent memory and learning reduction, through inhibition of lipid peroxidation in an experimental model of MS.

Keywords: Hippocampus, Multiple sclerosis, Malondialdehyde, *Ferula szowitsiana*, Spatial memory, rat.

Citation: Abdi S, Hatami Nemati H, Khakpay R, Dehghan Gh. **The effect of ethanolic extract of *Ferula szowitsiana* on cognitive deficits and lipid peroxidation induced by ethidium bromide in experimental model of MS.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2019; 26(11): 1008-18

¹Department of Animal Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

²Department of Animal Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

³Department of Animal Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

⁴Department of Animal Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

*Corresponding author: Tel: 09144002603, email: h.hatami@tabrizu.ac.ir