

بررسی آستانه شنوایی در کارگران مجتمع کاشی میبد

دکتر سید جلیل میرمحمدی*^۱، دکتر فرناز بابا حاجی میبدی^۲، دکتر فروغ السادات نورانی^۳

چکیده

مقدمه: مواجهه کارگران با سروصدای بیش از حد و صدمات ناشی از آن یکی از مشکلات عمده صنعت کشور می‌باشد و این مطالعه به منظور تعیین آستانه وافت شنوایی در کارگران مجتمع کاشی میبد یزد طراحی و انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی است که بر روی ۳۷۱ کارگر کارخانه مجتمع کاشی میبد در تابستان و پاییز سال ۱۳۸۴ اجرا شد. مواجهه با سر و صدای توسط دستگاه سنجش صوت (Sound level) تخمین زده شد و برای هر یک از کارگران علاوه بر تکمیل کردن پرسشنامه، معاینات اتوسکوپییک و ادیومتری برای ارزیابی کاهش شنوایی در هر فرد انجام شد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS ver11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: سروصدای شغلی اثر افزایش بر میانگین آستانه شنوایی در همه فرکانس‌ها و به طور معنی داری در فرکانس‌های ۳ و ۴ کیلوهرتز هر دو گوش داشت. شیوع افت شنوایی در فرکانس‌های زیر و بم تا ۳۹/۲٪ و ۴۶/۵٪ می‌رسد. شیوع الگوی کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای شغلی Noise Induced Hearing Loss (NIHL) ۱۲/۹٪ بود، همچنین مواجهه با سر و صدای زیاد به مدت بیش از ۱۰ سال به صورت معنی داری احتمال NIHL را افزایش می‌دهد. افراد با وزوز گوش نسبت به کسانی که فاقد آن بودند به طور معنی داری در تمامی فرکانس‌های شنوایی هر دو گوش، آستانه شنوایی بدتری دارند.

نتیجه‌گیری: شیوع بالای افت شنوایی و NIHL در کارگران کارخانه بر ضرورت اجرای برنامه حفاظت شنوایی تأکید دارد.

واژه‌های کلیدی: سروصدا، کاهش شنوایی

مقدمه

ولی می‌توان تصور کرد ابعاد این مشکل در ایران نیز قابل توجه باشد. مواجهه با حدود غیرمجاز سروصدا می‌تواند مشکلات مختلف سلامتی ایجاد نماید. در رأس این اختلالات کاهش شنوایی ناشی از سروصدا (NIHL=Noise Induced Hearing Loss) است. NIHL به صورت کلاسیک ابتدا فرکانس‌های زیر (۳، ۴، ۶ کیلوهرتز) را درگیر کرده و سپس در صورت ادامه مواجهه به فرکانس‌های بم نیز گسترش می‌یابد.^(۳) نکته بسیار مهم آن است که کاهش شنوایی ناشی از سروصدا در عین حال که به سهولت قابل پیشگیری است، پس از ایجاد و تثبیت غیرقابل برگشت می‌باشد. زمانی که کاهش شنوایی ناشی از سروصدا فرکانس‌های بم (گفتاری) را درگیر می‌نماید، از طریق اختلال در

سروصدا به عنوان گسترده‌ترین آلاینده موجود در محیط‌های کاری محسوب می‌شود. براساس تخمین NOISH حدود ۳۰ میلیون شاغل آمریکایی در معرض سروصدای مضر می‌باشند.^(۱) این میزان در اتحادیه اروپا در حدود ۳۵ میلیون نفر است. به گونه‌ای که کاهش شنوایی شغلی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بیماری‌های شغلی اروپا محسوب می‌شود.^(۲) البته آمار چندان دقیقی از میزان مواجهه با سروصدا در ایران موجود نمی‌باشد،

* ۱- نویسنده مسئول: استادیار گروه طب کار - تلفن: ۷۲۵۸۷۷۰

Email: Jalilmirmohamadi@yahoo.com

۲- پزشک عمومی

۳- پزشک عمومی

۱، ۲، ۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۱/۲۲

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۶/۲۹

توجه به آنکه بر اساس تعریف NOISH به ازای هر ۳ دسی بل تفاوت در شدت صوت، مدت زمان مواجهه مجاز نصف یا دو برابر می شود. می توان مقدار سطح اکشن (که حدود آن برابر با نصف حد مجاز است) را برابر با ۸۲ دسی بل دانست.

ارزیابی شنوایی: آزمون شنوایی سنجی با همکاری ادیولوژیست در اتاقک اکوستیک استاندارد به وسیله دستگاه ادیومتری MEVOX مدل S.A15 به انجام رسید. در این آزمون آستانه شنوایی افراد بر اساس هدایت هوایی در هر گوش و در فرکانس های ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰ هرتز تعیین گردید. متوسط آستانه شنوایی افراد (HTL = Hearing Threshold level) در فرکانس های بسم (HTL-L) و فرکانس های زیر (HTL-H) بر اساس روابط زیر محاسبه شد.

$$HTL-H = (HTL 3000+4000+6000)/4$$

$$HTL-H = (HTL 500+1000+2000)/4$$

پیش از انجام آزمون شنوایی سنجی، تمامی افراد توسط پزشک کارخانه معاینه اتوسکوپیک شدند. در صورت ترشحات غلیظ داخل مجرای خارجی گوش، ابتدا شستشوی گوش انجام گرفت. انجام آزمون شنوایی سنجی منوط به تمیز بودن مجرای خارجی گوش بود.

بر اساس تعریف، آستانه شنوایی کمتر از ۲۰ دسی بل به عنوان افت شنوایی در نظر گرفته شد. وجود الگوی NIHL بر اساس تعاریف و شاخص های استاندارد مورد تشخیص و بررسی قرار گرفت.

اطلاعات پرسشنامه ای: اطلاعات این تحقیق بر اساس اطلاعات مرتبط با مشخصات فردی، سوابق کاری، مصرف سیگار، وزوز گوش، اشتغال به شغل دومی که فرد را در معرض سروصدا قرار دهد، سابقه حضور در جبهه، سابقه ابتلا به بیماری اورینون، مخرمک، سرخک و سابقه تروما به جمجمه که منجر به شکستگی شده باشد، توسط پرسشنامه ها که به صورت حضوری از کارگران توسط فرد محقق با مراجعه به هر پست کاری در هر شیفت و توجیه کارگران در مورد اهداف طرح جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری ver 11/5 SPSS استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی از آزمون

درک کلام دیگران، مشکلات شدید اجتماعی ایجاد خواهد نمود. البته هنوز سیستم واقعی تشخیص و پرداخت غرامت NIHL در ایران وجود ندارد، ولی قطعاً چنین سیستمی باید در کشورمان بنیان گذاری شود.

طبعاً هر مطالعه ای که به بررسی اثر سروصدا و دیگر عوامل مؤثر بر آن، در شاغلین کشور پردازد، می تواند در شناسایی اهمیت و دامنه مشکل در ایران اهمیت به سزایی داشته باشد چرا که اطلاعات کافی در مورد وضعیت شنوایی شاغلین و همین طور شیوع NIHL شغلی در ایران وجود ندارد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر سروصدا بر آستانه شنوایی شاغلین مجتمع کاشی در شهرستان میبد بود.

روش بررسی

مطالعه حاضر از نوع توصیفی و به روش مقطعی طراحی و اجرا شد. نمونه گیری به صورت سرشماری از کلیه کارگران شاغل در کارخانه کاشی میبد واقع در ۱۵ کیلومتری شهرستان میبد (۳۷۱ نفر) در تابستان و پاییز ۸۴ که حداقل سه سال سابقه کار داشتند، انجام شد. برای هر نفر علاوه بر انجام معاینات اتوسکوپیک، پرسشنامه مربوطه تکمیل و تست شنوایی سنجی نیز انجام شد. معیارهای خروج از مطالعه اشتغال به شغل پر سر و صدای دیگری قبل از کار در این کارخانه، وجود التهاب گوش میانی در معاینات، پارگی پرده گوش و سابقه جراحی گوش بود که بر این اساس ۲۹ نفر حذف شدند.

ارزیابی سروصدا: شدت سروصدای موجود در تمامی کارگاه های کارخانه با همکاری مهندس بهداشت حرفه ای در دو نوبت توسط دستگاه سنجش سطح صدا نوع cell مدل ۲۳۱ اندازه گیری شد و بر حسب دسی بل A به ثبت رسید. بر اساس تعریف، در این مطالعه مواجهه با سر و صدا برابر با سروصدای محیطی بیش از ۸۲ دسی بل A در کارگاه های محل کار و اشتغال حداقل ۳ سال در آن کارگاه در نظر گرفته شد. در مطالعات انجام شده و در سطح دنیا، میزان سروصدای مضر از ۸۰ تا ۹۰ دسی بل تعریف شده است. هر چند میزان مجاز سروصدا برای ۸ ساعت کار در روز ۸۵ دسی بل می باشد ولی در این میزان حدود ۸۰٪ از افراد دارای مواجهه با سروصدا، دچار کاهش شنوایی خواهند شد. با

T-test و برای مقایسه متغیرهای رتبه‌ای از آزمون کای اسکور استفاده گردید و نیز از ORs با حدود اطمینان ۹۵٪ برای ارزیابی رابطه بین اختلال شنوایی و واجهه با سر و صدا استفاده شد.

نتایج

۳۴۲ نفر با میانگین سنی $37/3 \pm 8/1$ (۶۶-۲۰ سال) و سابقه کار $10/6 \pm 6/9$ (۱۸-۳ سال) که همگی مرد بودند در این مطالعه حضور داشتند. از مجموع ۳۴۲ نفر، ۱۵۶ نفر (۴۵/۶٪) در کارگاه‌های پر سروصدا و ۱۸۶ نفر (۵۴/۴٪) در محیط کاری با شدت صوت قابل قبول مشغول به فعالیت بودند که تفاوت قابل قبول آماری بین این دو گروه از نظر سن، سابقه کار، وزور گوش، استعمال دخانیات، سابقه تروما به سر، سابقه بیماری ویروسی (اوریون، سرخک یا مخلک)، سابقه رزمنده بودن و عادت به شنیدن موسیقی با صدای بلند و استفاده از سمعک وجود نداشت.

در تمامی فرکانس‌ها میانگین آستانه شنوایی افراد در معرض سروصدای زیاد، بدتر از افرادی است که مواجهه ندارند. این تفاوت در فرکانس‌های دو هزار، سه هزار و چهار هزار هرتز گوش چپ و فرکانس‌های سه هزار و چهار هزار هرتز گوش راست معنی‌دار می‌باشد (جدول ۱). برای بررسی بهتر، میانگین آستانه شنوایی هر گوش بر حسب فرکانس‌های زیر و بم محاسبه شد که سروصدا باعث کاهش میانگین آستانه شنوایی در فرکانس‌های زیر و بم هر دو گوش شده است که این کاهش در فرکانس‌های زیر هر دو گوش $P=0/34$ گوش راست و $P=0/35$ گوش چپ) و بم گوش چپ معنی‌دار بوده است. تعداد موارد افت شنوایی یعنی آستانه شنوایی کمتر از ۳۰ دسی بل با مواجهه با سروصدا زیاد ارتباط داشت، به عبارتی مواجهه با سروصدای زیاد، باعث افزایش موارد کاهش شنوایی در فرکانس‌های زیر و بم هر دو گوش شده است که این اثر در گوش چپ معنی‌دار بوده است.

مواجهه با سر و صدای زیاد ریسک ایجاد افت شنوایی در فرکانس‌های زیر و بم گوش چپ را به ترتیب ۳۸٪ و ۲۲٪ افزایش

داد.

الگوی کاهش شنوایی ناشی از سروصدا (NIHL) در ۱۹/۶٪ افراد (۶۷ نفر) دیده شد که از این جمع ۴۴ نفر (۱۲/۹٪) در مواجهه با سروصدای بالا در محیط کار بودند. به عبارتی ۱۲/۹٪ افراد از (NIHL) شغلی رنج می‌برند.

بین آستانه شنوایی گوش چپ و راست کارگران با سنوات خدمت آنها از نظر مواجهه یا عدم مواجهه با سروصدای زیاد تفاوت معنی‌داری دیده نشد. به همین دلیل افراد بر اساس مدت اشتغال به کار یعنی مدت زمان مواجهه با سر صدای زیاد به دو گروه کمتر و گروه مساوی یا بیشتر از ۱۰ سال مواجهه با سروصدای شغلی در کارخانه مجتمع کاشی میبد دسته‌بندی شدند. بر این اساس مشخص گردید که مواجهه طولانی مدت کارگران با سروصدای زیاد در این کارخانه موجب بروز بیشتر NIHL بود [۱/۴۹-۱/۲۰ و ۹۵٪-CI و $OR = 1/23$].

افرادی که از وزوز گوش رنج می‌بردند آستانه شنوایی بالاتری نسبت به افرادی که چنین حسی نداشتند در هر دو گوش و در تمامی فرکانسها داشتند. این تفاوت در میانگین آستانه شنوایی در تمامی فرکانس‌های هر دو گوش معنی‌دار بوده است. مصرف بیش از ۱۰ pack year سیگار باعث کاهش میانگین آستانه شنوایی در تمامی فرکانس‌ها در هر دو گوش شد که این افت در فرکانس شش هزار هرتز گوش راست معنی‌دار بود. سابقه مثبت تروما به سر و استفاده از موتور سیکلت به عنوان وسیله نقلیه در کارگران مجتمع کاشی میبد با افت شنوایی ارتباط معنی‌داری نداشت. سابقه حضور در جبهه با افت شنوایی تنها در فرکانس‌های ۲۵۰ هرتز گوش چپ $P=0/28$ و $P=0/250$ (p=0/007) و ۵۰۰ و $P=0/014$ و ۸۰۰۰ و $P=0/140$ هرتز گوش راست ارتباط معنی‌داری داشت و سابقه بیماری‌های اوریون، مخلک و سرخک با افت شنوایی تنها در فرکانس شش هزار هرتز گوش چپ ارتباط معنی‌دار داشت ($P = 0/01$). عادت به شنیدن موسیقی با صدای بلند تنها در گوش چپ و فرکانس‌های ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز ارتباط معنی‌داری با افت شنوایی داشت

جدول ۱: مقایسه میانگین آستانه شنوایی در فرکانسهای مختلف در گوش راست و چپ به تفکیک مواجهه یا عدم مواجهه با سروصدای زیاد

P value	گوش چپ		P value	گوش راست		میانگین آستانه شنوایی شدت صوت (هرتز)
	مواجهه با شدت صوت قابل قبول	مواجهه با سروصدای زیاد		مواجهه با شدت صوت قابل قبول	مواجهه با سروصدای زیاد	
۰/۱۴	۲۲/۲۸±۱۲/۸۵	۲۴/۳۵±۱۳/۳۶	۰/۷۲	۲۴/۰۳±۱۳/۹۷	۲۴/۵۵±۱۳/۰۰	۲۵۰
۰/۵۱	۲۳/۷۰±۱۳/۶۸	۲۴/۶۷±۱۳/۸۹	۰/۶۹	۲۴/۱۱±۱۴/۵۷	۲۴/۷۱±۱۳/۶۲	۵۰۰
۰/۱۹	۲۳/۰۶±۱۱/۵۰	۲۴/۶۳±۱۰/۷۱	۰/۴۴	۲۲/۶۸±۱۲/۱۷	۲۳/۶۵±۱۰/۹۸	۱۰۰۰
۰/۲۰	۱۳/۳۶±۱۱/۶۸	۱۶/۳۲±۱۱/۷۳	۰/۷۰	۱۴/۷۵±۱۲/۵۳	۱۵/۲۵±۱۱/۹۳	۲۰۰۰
۰/۳۰	۱۵/۱۳±۱۳/۲۱	۱۸/۴۲±۱۴/۶۸	۰/۰۲	۱۴/۲۴±۱۴/۰۸	۱۷/۶۲±۱۴/۴۱	۳۰۰۰
۰/۱۰	۱۸/۴۶±۱۴/۸۱	۲۲/۷۲±۱۷/۱۶	۰/۰۴	۱۸/۰۱±۱۶/۷۵	۲۱/۶۹±۱۶/۹۲	۴۰۰۰
۰/۲۱	۲۰/۴۸±۱۶/۴۵	۲۲/۸۳±۱۸/۳۰	۰/۳۱	۲۱/۱۲±۱۸/۰۹	۲۳/۰۴±۱۶/۷۸	۶۰۰۰
۰/۵۰	۲۲/۵۹±۱۸/۶۲	۲۳/۹۴±۱۸/۸۸	۰/۵۰	۲۲/۳۹±۱۸/۸۷	۲۳/۷۵±۱۸/۱۹	۸۰۰۰

بحث

کاهش شنوایی ناشی از سروصدا (NIHL) یکی از شایع‌ترین مشکلات شنوایی در بزرگسالان است، به طوری که حدود ۳۰٪ از علل کاهش شنوایی را در این گروه شامل می‌شود. NIHL یکی از مهمترین بیماری‌های شغلی است که هر ساله تعداد زیادی از شکایات شغلی را تشکیل می‌دهد و علاوه بر ایجاد ناتوانی جسمی و روحی برای فرد مبتلا باعث پرداخت هزینه‌های زیادی بابت غرامت می‌شود و به همین دلیل بار اقتصادی زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند.^(۴) در این مطالعه مواجهه کارگران با سروصدای شغلی به عنوان عامل خطر کاهش شنوایی تلقی گردید که این یافته مطابق با بررسی Ahmed در سال ۲۰۰۱ بر روی ۲۶۹ کارگر مواجهه یافته با سروصدای زیاد در کشور عربستان می‌باشد^(۵) که براساس آن NIHL یک معضل گسترده در عربستان شناخته شده که به استراتژی‌های جدید در جهت بهبود محیط کار نیاز دارد. سروصدا باعث کاهش میانگین آستانه شنوایی به طور معنی‌داری در فرکانس‌های زیر شده بود که این یافته نیز با مطالعه Ahmed مشابهت دارد. با انجام محافظت‌های به موقع می‌توان از تأثیر مخرب صدا در طولانی مدت کاست^(۵). شیوع افت شنوایی در مطالعه حاضر در فرکانس‌های زیر و بم هر گوش تا ۳۹/۲٪ و ۴۶/۵٪ می‌رسد. این میزان شیوع به قدری اهمیت دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد. اگر چه مطالعه‌ای در مورد کارگران شاغل در کارخانه‌های کاشی دیده نشد اما در صنایع مختلف دیگر مطالعات بسیاری در زمینه میزان شیوع

کاهش شنوایی وجود دارد.

براساس تحقیقات Job شیوع کاهش شنوایی در فرکانس‌های زیر و بم جوانان شاغل فرانسوی (۲۴-۱۸ سال) به ترتیب ۱۵٪ و ۹٪ بود^(۶). این میزان در پرسنل نظامی سنگاپور ۳/۷٪ گزارش شده است^(۷).

میزان شیوع کاهش شنوایی در شاغلین عربستان در افرادی که با سروصدای زیاد مواجهه داشتند ۳/۳۸٪ و در افراد بدون مواجهه ۴/۵٪ بوده است^(۵) در مقایسه با مطالب ذکر شده میزان شیوع کاهش شنوایی در شاغلین کاشی میبید حتی در مقایسه با کشورهای همسایه از مقدار قابل توجهی برخوردار است. علت این امر به ویژه در مورد افت شنوایی در فرکانس‌های بم نیاز به بررسی‌های دقیق و تکمیلی دارد. البته اثر سروصدا به ویژه به فرکانس‌های زیر محسوس بوده و نیاز به اقدامات پیشگیرانه را مطرح می‌نماید.

یافته‌های حاصل از بررسی اثر سروصدا بر شنوایی تا حدود زیادی موافق با سایر تحقیقات بود که نشان داد NIHL به طور مشخص روی فرکانس‌های ۶-۴ کیلوهرتز تأثیر می‌گذارد^(۵،۹،۸). در ادامه مشخص گردید که الگوی NIHL با سروصدا ارتباط معنی‌داری داشت. از طرفی شیوع NIHL در صنایع مختلف متفاوت است. علت این تفاوت ناشی از میزان‌های مختلف سروصدا در صنایع گوناگون است و از سوی دیگر تفاوت در استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط مطرح می‌باشد. همانگونه که قبلاً ذکر شد،

شنوایی بود^(۱۱،۱۲،۱۳) به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ Mizaue گزارش نمود استعمال دخانیات باعث افزایش موارد کاهش شنوایی در فرکانس های زیر در کسانیکه با سروصدا ارتباط ندارند و همین طور کسانیکه با سروصدا مواجهه دارند، می-شود^(۱۱) در هر حال اثر مستقل ومضاعف سیگار با سروصدا در ایجاد افت شنوایی موضوعی است که با گذشت زمان شواهد قوی تری برای آن گزارش و منتشر می شود. این موضوع اهمیت بررسی مجزای این موضوع وتوصیه های لازم به شاغلین در معرض سروصدا را مشخص می نماید.

نتیجه گیری

مواجهه با صدای غیرمجاز شغلی مشکل رایج و جدی در صنایع کشور است. میزان شیوع افت شنوایی و NIHL در شاغلین کارخانه کاشی میبد از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت اجرای برنامه های محافظت را می طلبد. از این رو پیشنهاد می شود مسئولین امر برنامه ریزی هایی در جهت به حداقل رساندن کاهش شنوایی طراحی و اجرا نمایند.

مقاله ای در رابطه با میزان شیوع NIHL در صنعت کاشی یافت نشد. البته میزان کلی آن بر اساس مطالب مختلف در صنایع گوناگون از ۶۰٪ در مشاغل پر سروصدای صنایع ساختمانی ایالات متحده^(۱۰) تا ۳۸٪ در صنایع فلزی عربستان بوده است^(۵). میزان شیوع این الگو در این مطالعه ۱۹/۶٪ بوده که تنها ۱۲/۹٪ در مواجهه با سروصدای بالا در محیط کار بودند. موضوع بسیار مهمی که در نتایج این مطالعه ذکر شده است ارتباط معنی دار بین وزور گوش و کاهش شنوایی در تمامی فرکانس های هر دو گوش است. هرچند وزور گوش و اختلالات شنوایی به ویژه انواع حسی-عصبی قابل تردید نیست ولی وجود چنین ارتباط معنی داری اهمیت اخذ شرح حال دقیق در حین معاینات شاغلین را مطرح می نماید.

در مطالعه حاضر مصرف بیش از ۱۰ Pack year سیگار باعث کاهش میانگین آستانه شنوایی در تمامی فرکانس ها شد و این افت در فرکانس ۶ کیلوهرتز گوش راست معنی دار بود. نتایج تعدادی از مطالعات پیشین نیز نشانگر اثر سیگار بر کاهش آستانه

References

- 1- Franks JR, Stephenson MR, Merry CJ. *Preventing occupational hearing loss –A practical guide* -DHHS (NIOSH) Publication 2004; No. 96-110.
- 2- Sulkowski WJ, Szymczak W, Kowalska S, Sward-Matyja M. *Epidemiology of occupational noise-induced hearing loss (ONIHL) in Poland*. Otolaryngol Pol. 2004;58(1):233-6.
- 3- May JJ. *Occupational hearing loss*. Am J Ind Med. 2000 Jan;37(1):112-20.
- ۴- فامیلی غلامحسین، کرمی فرکیوان، فیاض امیرفرشید. کاهش شنوایی شغلی ناشی از صوت و ناتوانی حاصل از آن. مجله علمی پزشکی قانونی پاییز ۱۳۸۲؛ ۹(۳۱):۱۴۷-۱۵۳.
- 5- Ahmed HO, Dennis JH, Badran O, Ismail M, Ballal SG, Ashoor A and et al. *Occupational noise*

- exposure and hearing loss of workers in two plants in eastern Saudi Arabia*. Ann Occup Hyg. 2001 Jul;45(5):371-80.
- 6- Job A, Raynal M, Tricoire A, Signoret J, Rondet P. *Hearing status of French youth aged from 18 to 24 years in 1997: a cross-sectional epidemiological study in the selection centres of the army in Vincennes and Lyon*. Rev Epidemiol Sante Publique. 2000 Jun;48(3):227-37.
- 7- Toh ST, Lu P, Ong M, Seet B. *Prevalence of hearing disorders in Singapore military conscripts: a role for routine audiometry screening?* Singapore Med J. 2002 Dec;43(12):622-7.
- 8- Nixon JC, Glorig A. *Noise-Induced Permanent Threshold Shift at 2000 cps and 4000 cps*. The

- Journal of the Acoustical Society of America. 1961 July ; 33(7): 904-908 .
- 9- Mc Bride DI, Williams S. *Audiometric notch as a sign of noise induced hearing loss*. Occup & Environ Med. 2001 Jan; 58(1):46-51.
- 10- Hong O. *Hearing loss among operating engineers in American construction industry*. Int Arch Occup Environ Health. 2005 Aug;78(7):565-74.
- 11- Mizoue T, Miyamoto T, Shimizu T. *Combined effect of smoking and occupational exposure to noise on hearing loss in steel factory workers*. Occup Environ Med. 2003 Jan;60(1):56-9.
- 12- Uchida Y, Nakashimat T, Ando F, Niino N, Shimokata H. *Is there a relevant effect of noise and smoking on hearing? A population-based aging study*. Int J Audiol. 2005 Feb;44(2):86-91.
- 13- Ferrite S, Santana V. *Joint effects of smoking, noise exposure and age on hearing loss*. Occup Med (Lond). 2005 Jan;55(1):48-53.