

بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتریموکسازول علیه سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

مینا جوادی^۱، حسین سلطانی^۱، رسول شگری^{۲*}

مقاله پژوهشی

مقدمه: سالمونلا تیفی دسته بزرگی از باسیل‌های گرم منفی با خصوصیت انتروباکتریاسه و بیماری‌زای مشترک بین انسان و حیوان است که عامل اصلی بیماری حصبه در انسان می‌باشد. یکی از شایع‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان سالمونلا، کوتریموکسازول می‌باشد ولی به دلیل استفاده گسترده از آنتی‌بیوتیک‌ها، مقاومت باکتریایی، به وجود آمده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره و ترکیب آن با آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول به منظور تولید یک داروی ضد میکروبی مؤثرتر علیه سالمونلا تیفی بود. **روش بررسی:** در این مطالعه تجربی، حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) برای نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتریموکسازول بر اساس روش مایکرودیولوشن انجام شد. سپس اثر ضد میکروبی آن‌ها در مدل موش آلوده بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، SPSS version 16 مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمون $P < 0/05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

نتایج: MIC و MBC نانو ذرات نقره برای سالمونلا تیفی به ترتیب ۴ ppm و ۸ ppm، ترکیب نانو ذرات نقره با کوتریموکسازول برای سالمونلا تیفی ۶۲ ppm و ۱۲۵ ppm و کوتریموکسازول برای سالمونلا تیفی ۵۰۰ ppm و ۱۰۰۰ ppm بودند. مدل موشی برای بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره علیه عفونت سالمونلا تیفی تأیید شد. به طوری که نانو ذرات نقره بیشترین اثر ضد میکروبی و کوتریموکسازول کمترین اثر ضد میکروبی نسبت به سایر گروه‌ها داشتند. **نتیجه‌گیری:** نانو ذرات نقره در مقایسه با سایر گروه‌ها به ویژه کوتریموکسازول آنتی‌باکتریایی بسیار مؤثری است.

واژه‌های کلیدی: سالمونلا تیفی، نانو ذرات نقره، کوتریموکسازول، اثر ضد میکروبی

ارجاع: جوادی مینا، سلطانی حسین، شگری رسول. بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتریموکسازول علیه سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۴۰۲؛ ۳۱ (۵): ۸۲-۶۶۷۵.

۱- دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران.

۲- گروه میکروپشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۹۱۲۷۴۲۵۰۳۴، پست الکترونیکی: rsh.bio42@gmail.com، صندوق پستی: ۴۵۱۵۶۵۸۱۴۵

مقدمه

سالمونلا تیفی یک باکتری گرم منفی و مسئول تب حصبه که یک بیماری خاص برای انسان است. حصبه یک بیماری حاد است که اغلب با تب بالا، کسالت و درد شکمی مشخص می‌شود. در سطح جهانی، کودکان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، به ویژه در جنوب آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و جنوب آفریقا، جایی که بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی باعث تشدید عوارض و مرگ‌ومیر مرتبط با این بیماری می‌شود. عوارض جدی شامل سوراخ شدن روده، سپتی سمی و مننژیت است که بیشترین میزان بروز این موارد در کودکان و بیماران نقص ایمنی دیده می‌شود. این عوارض تهدیدکننده زندگی هستند و به مراقبت‌های پزشکی پیشرفته نیاز دارند که اغلب در مناطق آندمیک تیفوئید در دسترس نیست (۱،۲). سالمونلا تیفی با نفوذ مستقیم به بافت اپیتلیال به واسطه تنظیم‌کننده هدایت غشایی گذرنده سیستیک فیبروزیس (CFTR) یا از طریق سلول M، یک سلول اپیتلیال لنفوئیدی تخصصی، وارد ناحیه زیر مخاطی روده کوچک می‌شود. هنگامی که این باکتری وارد زیر مخاط می‌شود، باعث هیپرتروفی لکه‌های پیر می‌شود (۳،۴،۵). با پیشرفت بیماری، بیمار ممکن است دچار گیجی متناوب و یک بیحالی خاصی شود. با اینحال، درد شکمی در همه بیماران دیده می‌شود و می‌تواند از ماهیت منتشر تا دردی که شبیه آپاندیسیت است، متغیر باشد. بزرگ شدن کبد و طحال معمولاً در طول پیشرفت بیماری ایجاد می‌شوند (۳،۴). در تب روده‌ای و باکتریمی، آنتی‌بیوتیک‌ها نقش بسیار مهمی در درمان دارند. فلوروکینولون‌ها، کلرامفنیکل، آموکسی‌سیلین، آمپی‌سیلین، کوتریموکسازول و سفالوسپورین‌های نسل سوم، آنتی‌بیوتیک‌های مؤثری در درمان تیفوئید هستند. گونه‌های سالمونلا این توانایی را دارند که از راه‌های مختلف، مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی را کسب نمایند (۶). نقره، فلزی است که به دلیل طیف وسیع فعالیت خود در برابر باکتری‌ها، قارچ‌ها و برخی ویروس‌ها شناخته می‌شود و در قالب نانو ذرات خواص آن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. نانو ذرات نقره با گروه‌های

مولکولی حاوی گوگرد و فسفر موجود در غشا و درون سلول باکتری، میل ترکیبی دارند. این نانو ذرات یون‌های نقره را آزاد می‌کنند و به انتقال الکترون غشایی آسیب می‌رسانند و از تکثیر DNA جلوگیری می‌کنند (۷). با توجه به اینکه اثرات ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر روی باکتری‌های مختلف تأیید شده است، مطالعه حاضر با هدف سنجش میزان فعالیت نانو ذرات نقره به عنوان روش جدید مقابله با بیماری‌زایی حاصل از باکتری سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و در مدل حیوانی انجام شد. با توجه به اینکه اثرات ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر روی باکتری‌های مختلف تأیید شده است، مطالعه حاضر با هدف سنجش میزان فعالیت نانو ذرات نقره به عنوان روش جدید مقابله با بیماری‌زایی حاصل از باکتری سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی و در مدل حیوانی انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی، سویه سالمونلا تیفی PTCC 1609 از آزمایشگاه میکروبیولوژی انستیتو پاستور تهیه شده بود. نانو ذرات نقره با غلظت ۴۰۰۰ ppm، به قطر ۲۰ nm با نام تجاری NANOCOLLOID از شرکت NANO NASB PARS تهیه گردید. موش‌های سوری ماده شش‌الی هشت هفته‌ای (با وزن تقریبی 25 ± 5 گرم) از موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج خریداری شدند. ابتدا برای تهیه سوسپانسیون میکروبی در شرایط استریل، از کلنی‌های تک رشد کرده با استفاده از لوپ استریل وارد ۱۰ میلی لیتر سرم فیزیولوژی گردیده و به مدت ۱۰ دقیقه ورتکس شد. سپس جهت تایید غلظت نهایی سوسپانسیون مورد نظر به $10^8 \times 1/5$ CFU/ml کلنی در هر میلی‌لیتر معادل نیم مک فارلند، میزان جذب نوری سوسپانسیون میکروبی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۶۲۰ نانومتر تعیین گردید (۸). برای تعیین حساسیت سالمونلا تیفی به آنتی‌بیوتیک‌ها از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. سوسپانسیون میکروبی (معادل نیم مک فارلند) تهیه شده بر روی محیط کشت حاوی مولر هینتون آگار (از شرکت MERCK محصول کشور آلمان) کشت داده شد، سپس دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی بر روی محیط کشت قرار داده شد. جهت انجام

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال این تحقیق توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تایید شده است.

نتایج

یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که نتایج حاصل از تست دیسک دیفیوژن برای تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه سالمونلا تیفی با روش انتشار دیسک طبق جدول استانداردهای آزمایشگاه بالینی (CLSI) نسبت به ۱۰ آنتی‌بیوتیک در جدول ۱ نشان داده شده است. آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول به دلیل در دسترس بودن انتخاب شد. نتایج به دست آمده از تعیین MIC و MBC با روش مایکرودیولوشن در جدول ۲ نشان داده شده است که در غلظت‌های ۴۰۰۰ ppm- ۱ از نانو ذرات نقره، کوتریموکسازول و ترکیب آن‌ها در محیط مولر هینتون آگار انجام گردید. در مدل حیوانی، آنالیز آماری نتایج مربوط به بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره، آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول و اثر ترکیبی آن‌ها بر روی سالمونلا تیفی در موش‌های سوری ماده در جدول ۳ نشان داده شده است؛ که اختلاف معنی‌داری در بین گروه‌های تیماری مورد مطالعه وجود دارد ($P < 0/05$) یعنی هر سه دارو اثر ضد میکروبی متفاوتی بر روی سالمونلا تیفی دارد.

منفی تقسیم شدند. برای ایجاد عفونت تجربی در موش‌های انتخابی، سوسپانسیون باکتریایی با غلظت 5×10^5 CFU/ml در شرایط استریل به مقدار ۱۰۰ میکرولیتر به صورت داخل صفاقی به همه گروه‌های مورد نظر به غیر از گروه شاهد منفی تزریق شد و ۲۴ ساعت به موش‌ها فرصت ایجاد عفونت داده شد. در روز دوم، مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول با غلظت ۲ میکروگرم بر میلی‌لیتر به موش‌های گروه اول، مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از نانو ذرات نقره معادل با غلظت MBC مشخص شده به موش‌های گروه دوم، مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از ترکیب آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول و نانو ذرات نقره (به صورت ترکیبی) معادل با غلظت MBC مشخص شده به موش‌های گروه سوم به صورت درون صفاقی تزریق شد. بعد از گذشت هفت شبانه روز دوره درمان، هر یک از موش‌ها در دسیکاتور حاوی اتر کشته شدند و طحال موش‌ها در شرایط استریل خارج گردید و در ۱۰۰۰ میکرولیتر بافر فسفات سالین هموژنیزه گردیدند، سپس از سوسپانسیون هموژنیزه طحالی، با پورپلیت کردن بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند که در نهایت شمارش کلنی‌های سالمونلا تیفی با استفاده از شمارش گر کلنی انجام گردید (۱۱).

تجزیه و تحلیل آماری

به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، نرم‌افزار SPSS version 16 مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمون $P < 0/05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

جدول ۱: میزان مقاومت و حساسیت آنتی‌بیوتیک‌ها بر روی سالمونلا تیفی

نام آنتی‌بیوتیک	تترا سایکلین	بر حسب میلی‌متر ۱۳	نتیجه نیمه حساس
کلرامفنیکل	۲۱	حساس	
سیپروفلوکساسین	۳۲	حساس	
جنتامایسین	۱۷	حساس	
ایمی‌پنم	۲۱	نیمه حساس	
سفالوتین	۲۳	حساس	
سفتازیدیم	۱۹	نیمه حساس	
کوتریموکسازول	۳۴	حساس	
آمی سیلین	۱۸	حساس	
آمیکاسین	۲۳	حساس	

جدول ۲: میزان MIC و MBC نانو ذرات نقره و کوتریموکسازول و اثرات ترکیبی آن‌ها بر روی سالمونلا تیفی

غلظت	MIC	MBC
کوتریموکسازول	۵۰۰ ppm	۱۰۰۰ ppm
نانو ذرات نقره	۴ ppm	۸ ppm
نانو ذرات نقره و کوتریموکسازول	۶۲ ppm	۱۲۵ ppm

حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC)، حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC)

جدول ۳: میانگین و انحراف معیار شمارش کلنی و اثر مهاری نانو ذرات نقره و کوتریموکسازول و اثرات ترکیبی آن‌ها بر روی موش‌های سوری آلوده به سالمونلا تیفی

نتایج	شمارش کلنی (cfu/ml)
کوتریموکسازول	۲۶۶۰±۳۴۶/۰۹
نانو ذرات نقره	۴۱۱±۵۳/۴۷
نانو ذرات نقره و کوتریموکسازول	۱۷۷۳±۲۳۰/۶۸
کنترل مثبت	۲۶۶۶۰±۳۴۸/۶۶

بحث

تب حصبه یا تب روده عمدتاً توسط سالمونلا تیفی ایجاد می‌شود. حصبه بیشتر از طریق خوردن آب یا غذای آلوده منتقل می‌شود. پس از ورود به روده کوچک، باکتری‌ها از سد اپیتلیال روده عبور کرده و توسط ماکروفاژها فاگوسیتوز می‌شوند و به صورت سیستمیک پخش می‌شوند و بیماری حاد ایجاد می‌کنند. شایع‌ترین محل‌های عفونت ایلتوم، کبد، طحال، مغز استخوان و کیسه صفرا هستند. باکتری‌ها از طریق عروق یا مجاری که از کبد خارج می‌شوند به کیسه صفرا می‌رسند. در طول دهه گذشته، بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بین گونه‌های سالمونلا تیفی به‌طور چشمگیری در مناطق آندمیک افزایش یافته است. سویه‌هایی که تقریباً در برابر هر آنتی‌بیوتیک خط اول موجود مقاوم هستند، بازیابی شده‌اند و تا ۶۰ درصد از همه‌سویه‌های جداسازی شده مقاومت چند دارویی را نشان می‌دهند (۱،۲). با توجه به اهمیت این موضوع به‌نظر می‌رسد که ترکیبات آنتی‌بیوتیکی همراه با نانو ذرات فلزی جایگزین مناسبی برای این آنتی‌بیوتیک‌ها باشند. ولی تاکنون مطالعه چندانی بر روی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و اثر ترکیبی آن‌ها با آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول علیه عفونت ناشی از سالمونلا تیفی، به خصوص در مدل حیوانی نشده است. بر اساس مطالعه حاضر، اثر نانو ذرات

نقره به تنهایی بسیار مؤثرتر از سایر گروه‌ها به‌ویژه آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول است. ترکیب نانو ذرات نقره با آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول نیز اثر هم‌افزایی چشمگیری نسبت به خود آنتی‌بیوتیک داشته ولی نمی‌تواند جای نانو ذرات نقره را بگیرد ولی می‌توان با استفاده از آن، میزان استفاده از ضد میکروبی کاهش داد. در مطالعه حاضر نتایج تعیین MIC و MBC به روش مایکروداپلوشن نشان داد که نانو ذرات نقره نسبت به هر کدام از عوامل به تنهایی، دارای خاصیت ضد میکروبی بیشتری بر روی سالمونلا تیفی می‌باشد. این یافته‌ها با نتایج حاصل از سایر پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. هومبرتو و همکارانش (Hmberto et al)، در سال ۲۰۱۰ در مکزیک اثر مهاری نانو ذرات نقره را بر روی باکتری‌هایی که مقاومت دارویی زیادی از خود نشان می‌دهند مثل باکتری‌های سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیاکلی مقاوم به آمپی‌سیلین، استرپتوکوکوس پایوزنز مقاوم به اریترومايسين را نشان دادند آن‌ها مشاهده کردند که نانو ذرات نقره اثر باکتریوستاتیک قابل‌ملاحظه‌ای بر روی این باکتری‌ها دارند (۱۲). در سال ۲۰۰۹ نیلدا و همکارانش (Nilda et al) توانستند باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین را با استفاده از نانو ذرات نقره مهار نمایند. آن‌ها ثابت کردند فلز نقره در حالت نانو بودن اثر ضد میکروبی می‌تواند داشته باشد

(۱۳). هم‌چنین در مطالعات بهروان و همکارانش (Behravan et al)، در سال ۲۰۱۹ فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج به دست آمده نشان داد اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر باکتری‌های گرم منفی بیشتر از باکتری‌های گرم مثبت بود که با افزایش غلظت و تعداد نانو ذرات، مهار کامل رشد باکتری اتفاق افتاد. در باکتری گرم منفی اشرشیاکلی نانو ذرات نقره مانع از جذب و آزاد شدن فسفات، مانیتول، پرولین، گلوتامین و سوکسینات از سلول این باکتری می‌شوند تمایل زیاد ذرات نقره به گوگرد و فسفر در غشای سلولی دلیل اصلی خاصیت ضد باکتریایی آن است. نانو ذرات نقره با پروتئین‌های حاوی گوگرد در داخل یا خارج غشای سلول واکنش می‌دهند که بر بقای سلول‌ها تأثیر می‌گذارد (۱۴). نتایج مطالعه حاضر بر روی مدل حیوانی نشان می‌دهد که نانو ذرات نقره در موش‌های سوری ماده می‌تواند آثار ضد میکروبی خود را بر روی عفونت ناشی از سالمونلا تیفی حفظ کرده و به تنهایی دارای اثر ضد میکروبی می‌باشد. هم‌چنین آنالیز آماری نتایج مدل حیوانی نشان داد که نانو ذرات نقره دارای خاصیت ضد میکروبی بیشتری علیه عفونت‌های حاصل از سالمونلا تیفی نسبت به آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول می‌باشد. با افزایش غلظت نانو ذرات نقره، رشد میکروب کاهش یافته است لذا می‌توان گفت که اثر نانو ذرات نقره وابسته به دوز مصرفی است و با افزایش غلظت آن اثر ضد میکروبی آن نیز افزایش می‌یابد. در مطالعه حاضر با مقایسه نتایج مربوط به مدل حیوانی، مشخص شد تأثیر ضد میکروبی بین گروه‌های تیماری با نانو ذرات نقره، آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول و نانو ذرات نقره و آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول (به صورت ترکیبی)، اختلاف معنی‌داری بود. یافته‌های به دست آمده در این مطالعه با نتایج سلیم و همکارانش (Seleem et al)، در سال ۲۰۰۹ مطابقت دارد. آن‌ها در مطالعه نشان دادند که تعداد کلنی‌های باکتری سالمونلا انتریکا در طحال و کبد موش در صورت تزریق نانو ذرات سیلیکا کونژوگه شده با جنتامایسین در مقایسه با زمانی که تنها جنتامایسین آزاد به طحال و کبد موش تزریق می‌شود، کمتر است (۱۵). در مطالعه‌ای دیگر عزیزاده و

همکاران (Alizadeh et al)، در سال ۲۰۱۱ اثر هم‌افزایی نانو ذرات نقره با جنتامایسین را در مدل حیوان مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها در این مطالعه آنتی‌بیوتیک جنتامایسین را به نانو ذرات نقره به صورت توأم در مدل حیوانی مورد آزمایش قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که نانو ذرات نقره اثر هم‌افزایی شدیدی با جنتامایسین دارد (۱۱). هم‌چنین آرونا (Aruna) در سال ۲۰۱۱ خواص ضد باکتریایی نانو ذرات بر روی باکتری مقاوم سودوموناس آئروژینوزا بررسی و نتایج ضد باکتریایی نانو ذرات نقره گزارش نمود، این بررسی‌هایی که بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی انجام گرفته شد، مطابقت دارد (۱۶). نتایج حاصل از اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتریموکسازول در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی با نتایج این پژوهشگران مطابقت داشت.

نتیجه‌گیری

نانو ذرات نقره به تنهایی بسیار مؤثرتر از سایر گروه‌ها به ویژه آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول است. اثر ترکیبی نانو ذرات نقره با کوتریموکسازول تا حدی با اثر نانو ذرات نقره برابر بوده است و کاهش میزان رشد در این دو ماده بالا می‌باشد ولی جایگزین مناسبی در برابر نانو ذرات نقره نمی‌باشد. نانو ذرات نقره می‌تواند در آینده به عنوان عامل ضد میکروبی استفاده شده و تا میزان قابل قبولی رشد باکتری‌ها را کنترل نمود.

سپاس‌گزاری

این مطالعه ماحصل بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان بوده بدین‌وسیله از زحمات مسئولیت محترم مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

حامی مالی: ندارد.

تعارض در منافع: وجود ندارد.

References:

- 1-Levine MM, Black RE, Lanata C. *Precise Estimation of the Numbers of Chronic Carriers of Salmonella Typhi in Santiago, Chile, an Endemic Area.* J Infect Dis 1982; 146(6): 724-6.
- 2-Merselis JG Jr, Kaye D, Connolly CS, Hook EW. *Quantitative Bacteriology of the Typhoid Carrier State.* Am J Trop Med Hyg 1964; 13: 425- 9.
- 3-Crump JA, Sjölund-Karlsson M, Gordon MA, Parry CM. *Epidemiology, Clinical Presentation, Laboratory Diagnosis, Antimicrobial Resistance, and Antimicrobial Management of Invasive Salmonella Infections.* Clin Microbiol Rev 2015; 28(4): 901-37.
- 4- Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. *Typhoid Fever.* N Engl J Med 2002; 347(22): 1770-82.
- 5- Gebert A, Rothkötter HJ, Pabst R. *M Cells in Peyer's Patches of the Intestine.* Int Rev Cytol 1996; 167: 91-159.
- 6- Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. *Baily and Scott's Diagnostic Microbiology.* 12th ed. Mosby; 2007. p. 323-34.
- 7-Das Neves PB, Agnelli JA, Kurachi C, de Souza CW. *Addition of Silver Nanoparticles to Composite Resin: Effect on Physical and Bactericidal Properties in Vitro.* Braz Dent J 2014; 25(2): 141-5.
- 8-Ranković BR, Kosanić M. *Antimicrobial Activities of Different Extracts of Lecanora Atra Lecanora Muralis, Parmelia Saxatilis, Parmelia Sulcata and Parmeliopsis Ambigua.* PJB 2012; 44(1): 429-433.
- 9-Melvin P, James S, April M, Sharon K, Marcelo F, Romney M, Et al. *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing.* M100, 30th ed. Wayne: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020: 156-170.
- 10-Nasiri Semnani Sh, Rahnema M, Ghasempour H, Alizadeh H. *Evaluation of Antibacterial Effects of Lecanora Muralis SP. Extract on Staphylococcus Aureus and Salmonella Typhimurum in Vitro and in Animal Model.* JABS 2014; 4(3): 318-26. [Persian]
- 11-Alizadeh H, Salouti M, Shapouri R, Abdollahzadeh P, Nasseryan J. *Antibacterial Effects of Silver Nanoparticles on Brucella Melitensis 16M in an Animal Model in Vitro.* J Arak Uni Med Sci 2012; 14(7): 64-70. [Persian]
- 12-Lara HH, Ayala-Núñez NV, Ixtepan Turrent LD, Rodríguez Padilla C. *Bacterisidal Effect of Silver Nanoparticles against Multidrug-Resistant Bacteria.* World journal of microbiology & biotechnology 2010; 26(4): 615-21.
- 13-Ayala-Nunez NV, Lara Villegas HH, Del Carmen Ixtepan Turrent L, Rodriguez-Padilla C. *Silver Nanoparticles Toxicity and Bacterial Effect against Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus: Nanoscale Does Matter.* Nanobiotechnol 2009; 5(1): 2-9.
- 14-Behravan M, Panahi AH, Naghizadeh A, Ziaee M, Mahdavi R, Mirzapour A. (2019). *Facile Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Berberis Vulgaris Leaf and Root Aqueous Extract and its Antibacterial Activity.* International Journal of Biological Macromolecules 2019; 124: 148-54. [Persian]
- 15- Seleem MN, Munusamy P, Ranjan A, Alqublan H, Pickrell G, Sriranganathan N. *Silica-Antibiotic Hybrid Nanoparticles for Targeting Intracellular Pathogens.* Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(10): 4270-4.
- 16- Kora AJ, Arunachalam J. *Assessment of Antibacterial Activity of Silver Nanoparticles on Pseudomonas Aeruginosa and its Mechanism of Action.* World J Microbiol Biotechnol 2011; 27: 1209-16.

Antimicrobial Effect of Silver Nanoparticles and Combination with Cotrimoxazole against *Salmonella Typhi* in Vitro and in Animal Model

Mina Javadi¹, Hossein Soltani¹, Rasoul Shokri^{*2}

Original Article

Introduction: *Salmonella typhi* is a large group of gram-negative bacilli with Enterobacteriaceae and common pathogens between humans and animals, which is the main cause of typhoid fever in humans. One of the most common antibiotics in the treatment of Salmonella is cotrimoxazole, but due to the widespread use of antibiotics, bacterial resistance has developed. The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of silver nanoparticles and its combination with the antibiotic cotrimoxazole to produce a more effective antimicrobial drug against *Salmonella typhi*.

Methods: In this experimental study, the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) for silver nanoparticles and combination with cotrimoxazole, was performed based on microdilution method. Then, their antibacterial effects were investigated in infected mouse model. In order to analyze the results statistically, SPSS software version 16 was used. In this test, $P < 0.05$ was considered as a significant level.

Results: MIC and MFC of silver nanoparticles for *Salmonella typhi* were 4 ppm and 8 ppm respectively, composition of silver nanoparticles with cotrimoxazole for *Salmonella typhi* were 62 ppm and 125 ppm and cotrimoxazole for *Salmonella typhi* were 500 ppm and 1000 ppm. Mouse model to study the antibacterial effect of silver nanoparticles and combination with cotrimoxazole against *Salmonella typhi* infection was confirmed., Silver nanoparticles had the highest antibacterial effect and cotrimoxazole has the lowest antibacterial effect than other groups.

Conclusion: Silver nanoparticles are very effective compared to other groups, especially the antibacterial cotrimoxazole.

Keywords: *Salmonella typhi*, Silver nanoparticles, Cotrimoxazole, Antimicrobial effect.

Citation: Javadi M, Soltani H, Shokri R. Antimicrobial Effect of Silver Nanoparticles and Combination with Cotrimoxazole against *Salmonella Typhi* in Vitro and in Animal Model. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2023; 31(5): 6675-82.

¹Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

²Department of Microbiology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.

*Corresponding author: Tel: 09127425034, email: rsh.bio42@gmail.com