

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر نشانگرهای التهابی و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی بافت کلیه متعاقب سوء مصرف تستوسترون انانتات در موش‌های صحرائی نر

معصومه مهربانی^۱، یاسر کاظم‌زاده^{۱*}، علی گرژی^۲، سیدعلی حسینی^۳، سعید صداقتی^۴

مقاله پژوهشی

مقدمه: سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک می‌تواند منجر به آسیب بافت کلیه شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر نشانگرهای التهابی و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی بافت کلیه متعاقب سوء مصرف تستوسترون انانتات در موش‌های صحرائی نر بود.

روش بررسی: در این پژوهش تجربی، ۲۴ سر موش نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی به سه گروه (۱ کنترل، ۲ تمرین و ۳ تمرین + تستوسترون تقسیم شدند. موش‌های صحرائی گروه ۲ و ۳، پنج جلسه در هفته و به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی را اجرا کردند. همچنین گروه ۳، سه روز در هفته به میزان ۲۰ mg/kg تستوسترون انانتات به‌صورت تزریق عضلانی دریافت نمود. سطوح فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) به روش اسپکتروفتومتری و بیان ژن‌های اینترلوکین-۶ (IL ۶) و فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا (TNF- α) به روش Real Time PCR اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS version 16 آنالیز شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه استفاده شد ($P \leq 0/05$).

نتایج: تمرین مقاومتی موجب کاهش معنی‌دار میزان فعالیت GPx ($P=0/001$) نسبت به گروه کنترل شد. بیان ژن IL ۶ در گروه تمرین + تستوسترون به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه تمرین ($P=0/04$) و کنترل ($P=0/001$) بود. تمرین + تستوسترون موجب افزایش معنادار بیان ژن TNF- α نسبت به گروه تمرین ($P=0/02$) و کنترل ($P=0/008$) شد. همچنین میزان فعالیت GPx در گروه تمرین + تستوسترون به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل ($P=0/001$) بود، اما تفاوت معنی‌داری در گروه‌های تمرین + تستوسترون و گروه تمرین مشاهده نشد ($P=0/93$).

نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد سوء مصرف تستوسترون همراه با تمرین مقاومتی شدید با کاهش عملکرد سیستم آنتی‌اکسیدانی و افزایش نشانگرهای التهابی در بافت کلیه همراه است.

واژه‌های کلیدی: تستوسترون انانتات، IL - ۶، TNF- α ، سیستم آنتی‌اکسیدانی، تمرین مقاومتی

ارجاع: مهربانی معصومه، کاظم‌زاده یاسر، گرژی علی، حسینی سید علی، صداقتی سعید. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر نشانگرهای التهابی و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی بافت کلیه متعاقب سوء مصرف تستوسترون انانتات در موش‌های صحرائی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۴۰۲؛ ۳۱ (۷): ۸۴-۶۸۷۳.

۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

۴- گروه مدیریت ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۵۹۷۳، پست الکترونیکی: yaser.kazemzadeh@yahoo.com، صندوق پستی: ۳۳۱۴۷۷۶۵۳

مقدمه

استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک (Anabolic androgenic steroids ; AAS) ترکیبات مشتق شده از تستوسترون هستند که در دوزهای متعارف توسط پزشکان برای هیپوگنادیسم استفاده می‌شوند (۱). از بین انواع مشتقات AASها، تستوسترون انانتات یک طولانی‌اثر است که به دلیل ارزان و در دسترس بودن آن به‌طور گسترده توسط ورزشکاران رشته‌های قدرتی با اهداف افزایش توده عضلانی، افزایش قدرت و افزایش عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲). این نکته قابل ذکر است که محققین نشان داده‌اند که دوز مصرفی AASها توسط ورزشکاران حتی به ۱۰۰ برابر بیشتر از دوزهای درمانی رسیده است (۳). اطلاعات نشان می‌دهد که استفاده از AASها در دوزهای فوق فیزیولوژیک با عوارض جبران‌ناپذیر همراه است. به‌طوری که منجر به افزایش فشار خون، سکتة قلبی، ترومبوز، نارسایی قلبی، اختلالات رفتاری و اختلال در عملکرد کبد و کلیه می‌شود (۴-۵). محققین بر این باورند که تستوسترون انانتات در حله اول با اتصال به گیرنده‌های آندروژنی در توپول‌های کلوی در موش‌های صحرایی‌نر با افزایش استرس اکسیداتیو همراه است (۲) و منجر به افزایش کراتینین سرم، نارسایی حاد کلیه به دنبال عارضه رابدومیولیز (rhabdomyolysis)، تغییرات بافتی کلیه مانند فیبروز، آتروفی توپولی و اختلالات نفرونی و افزایش التهابی در بافت کلیه می‌شود (۶-۷). با توجه به ماهیت عملکرد کلیه در دفع مواد سمی بدن، این بافت به‌طور مداوم در معرض سطوح بالایی از اکسیدان‌های درون‌زا و برون‌زا قرار می‌گیرد (۸). گونه‌های فعال اکسیژن (Reactive Oxygen Species; ROS) که در اثر فعالیت میتوکندری‌ها، NADPH اکسیدازها (NOX) و منابع دیگر تولید می‌شوند، زمانی که سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی نتوانند به‌طور متناسب این مولکول‌ها را خنثی کنند، می‌توانند باعث استرس اکسیداتیو شوند (۴،۹). این اتفاق منجر به پراکسیداسیون لیپیدی، اکسایش DNA و پروتئین‌ها می‌شود و در نهایت همه این موارد با بروز التهاب و آپوپتوز به اختلال در اعمال حیاتی سلول همراه است (۸). مطالعات قبلی

نشان دادند که مصرف دوزهای بالای AASها با اختلال در ردوکس سلولی منجر به فعال‌سازی سلول‌های ایمنی شده و در نتیجه با افزایش ترشح سایتوکین‌های التهابی همراه است (۱). علاوه بر این به‌نظر می‌رسد دوزهای فرافیزیولوژیک تستوسترون مستقیماً در تولید فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا (Tumor necrosis factor alpha: TNF- α) اینترلوکین-۱ بتا (Interleukin-1 beta: IL-1 β) و اینترلوکین-۶ (Interleukin-6: IL-6) در بافت کلیه نقش داشته باشد (۶). علاوه بر این اطلاعات موجود نشان می‌دهند که، افزایش-TNF α و IL-6 با افزایش فعالیت گیرنده‌های آندروژن، سمیت گلوومرول‌ها، کاهش آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت کلیه می‌شود همراه است (۱۰، ۱۱-۶). بررسی مطالعات نشان داده است که مصرف AASها بیشتر با تمرینات شدت بالا همراه است. در حالیکه اثربخشی این تمرینات بسته به نوع تمرین، شدت تمرین، حجم تمرین، تعداد تکرار متفاوت است (۱۲). به‌طوری که تمرینات مقاومتی با شدت کم تا متوسط، فشار اکسایشی، عوامل التهابی و آسیب سلولی را در افراد جوان تمرین کرده کاهش می‌دهد (۱۳)؛ اما، تمرینات مقاومتی طولانی‌مدت شدید عوامل التهابی مانند IL-1 β ، TNF- α و IL-6 را در طول و به دنبال ورزش افزایش می‌دهد. و به‌طور خاص، با ایجاد اختلال در تعادل اکسیدان/آنتی‌اکسیدان، منجر به فشار اکسایشی می‌شود و در نتیجه وضعیتی به نام اختلال عملکرد ایمنی ناشی از ورزش را ایجاد می‌کند (۱۴). شواهد تجربی نشان می‌دهد که هم تجویز AAS و هم فعالیت ورزشی شدید، میزان آسیب کلوی را در پاسخ به آسیب سمیت کلوی افزایش می‌دهد (۱۱). با توجه به شیوع روزافزون استفاده بی‌رویه از AASها توسط ورزشکاران منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر در عملکرد فیزیولوژیک بسیاری از اندام‌ها به ویژه کلیه می‌گردد. بنابراین کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اثر تمرین مقاومتی شدید و سوء‌مصرف تستوسترون انانتات می‌تواند به پیشگیری از آسیب‌های کلوی در این قشر جامعه منجر شود. با توجه به محدودیت اطلاعات در رابطه با اثرات مخرب کلوی ناشی از سوء‌مصرف AAS به‌ویژه در ورزشکاران

گروه تمرین + تستوسترون سه روز در هفته به میزان mg/kg ۲۰ تستوسترون انانتات (ساخت شرکت ایران هورمون، کشور ایران با شماره سریال ساخت ۰۰۶۹) را به صورت تزریق عضلانی دریافت نمودند (۱۶). در پژوهش حاضر پروتکل تمرین مقاومتی شامل پنج روز تمرین در هفته (چهار نوبت شش تایی با استراحت ۶۰ الی ۹۰ ثانیه) به صورت صعود از نردبان ۱ متری با ۲۶ پله و بستن وزنه به دم موش‌ها که در آن وزنه‌ها، هفته اول ۶۰ درصد وزن بدن موش‌های صحرایی بود و هر هفته ۲۰ درصد وزن بدن، به وزنه‌ها اضافه می‌شد و دو جلسه در هفته وزن کشی انجام می‌شد و در هفته پنجم شدت تمرین به منظور جلوگیری از بیش تمرینی و فرصت بازیافت مناسب به حیوانات جهت اجرای تمرینات سنگین در سه هفته پایانی با شدت هفته چهارم انجام شد. شیوه تمرینی با اندکی تغییر از منابع معتبر اخذ شده است (۱۵). ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی و مصرف تستوسترون، موش‌ها پس از ۱۲ ساعت ناشتایی با ترکیب زایلانین (سه تا پنج میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) و کتامین (۳۰ تا ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) بیهوش شدند. سپس بافت کلیه حیوانات به سرعت برداشته شده و در سرم فیزیولوژیک شست‌وشو داده شدند، سپس بلافاصله با استفاده از ازت مایع منجمد شده و برای سنجش متغیرهای پژوهش به فریزر با دمای ۷۰- منتقل شدند.

اندازه گیری متغیرهای وابسته: اندازه‌گیری فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی GPX و SOD به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از کیت (Randox Laboratories Ltd, UK)، ساخت کشور انگلستان و مقیاس U/mg protein ارزیابی شد. اندازه‌گیری فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD: Superoxide dismutase) مطابق با روش ولیامز و همکاران (۱۷) و اندازه‌گیری فعالیت گلوکوتایون پراکسیداز (GPX: Glutathione peroxidase) بر اساس روش ناکامورا و هوسادا (۱۸) تعیین گردید. برای اندازه‌گیری بیان ژن‌های ۶-IL و TNF- α از کیت تجاری تری پیور (Roche, Cat No.11667165001)، به منظور جداسازی RNA کل از

قدرتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیرات یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تجویز تستوسترون بر برخی نشانگرهای سیستم آنتی‌اکسیدانی، TNF- α و IL-6 در بافت کلیه موش‌های صحرایی در معرض تستوسترون انانتات بود.

روش بررسی

در این پژوهش تجربی ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن ۸ هفته و میانگین وزنی 13 ± 220 گرم از انستیتو پاستور ایران خریداری شدند. از بین این موش‌های صحرایی آنهایی که کاملاً سالم بودند و توان انجام فعالیت بدنی را داشتند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. هم‌چنین مشاهده مشکلات ظاهری مانند اختلال در حفظ تعادل، بیشتر بودن سن موش‌های صحرایی از ۱۰ هفته و عدم توان انجام تمرین از ملاک‌های خروج نمونه‌ها در این تحقیق بود. در ابتدا حیوانات به مدت یک هفته با شرایط آزمایشگاه سازگار شدند. در تمام دوره پژوهش، حیوانات در قفسه‌های پلی کربنات با قابلیت شستشو و در شرایط استاندارد (رطوبت ۴۵ تا ۵۵ درصد، چرخه نور تاریکی ۱۲:۱۲ ساعت و دمای 23 ± 2 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. گفتنی است که در این پژوهش آب و غذا به وفور در اختیار حیوانات گذاشته شد و آن‌ها به طور آزادانه به آن دسترسی داشتند. برای اطمینان از شرایط محیطی مناسب و حفظ رطوبت، دما و تهویه مناسب از دستگاه تهویه هوا و از دماسنج و رطوبت سنج برای پایش تغییرات شبانه روزی دما و رطوبت استفاده شد. پس از یک هفته آشناسازی با محیط آزمایشگاه، تمرینات آشناسازی نیز به مدت یک هفته برای آشناسازی موش‌های صحرایی با بالا رفتن از نردبان مخصوص تمرینات مقاومتی جوندگان انجام شد. سپس موش‌های صحرایی به صورت تصادفی به سه گروه ۸ تایی شامل (۱) گروه کنترل، (۲) گروه تمرین و (۳) تمرین + تستوسترون تقسیم شدند. موش‌های صحرایی گروه‌های تمرین و تمرین + تستوسترون به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته تمرینات مقاومتی را انجام می‌دادند. این نکته قابل ذکر است که این پروتکل تمرینی بر اساس راهنمای عملی و علمی از مطالعه گریزی و همکاران انجام شد (۱۵). هم‌چنین موش‌های صحرایی

روش Ct مقایسه‌ای برای تعیین سطح بیان نسبی ژن‌های هدف استفاده شد (۱۹).

تجزیه و تحلیل آماری

برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. در ادامه برای بررسی تفاوت بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه استفاده شد. سپس برای تعیین محل تفاوت بین گروهی از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. داده‌های تحقیق حاضر با استفاده از نرم‌افزار version 16 SPSS تجزیه و تحلیل شدند. برای ترسیم نمودارها از نرم‌افزار اکسل ۲۰۱۹ استفاده شد. هم‌چنین سطح معنی‌داری برای تمام داده‌ها ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی

این پژوهش تجربی در کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تصویب شد و با توجه به راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجام شد (IR.IAU.TMU.REC.1400.133).

نمونه‌های بافتی، مطابق با راهنمای شرکت سازنده استفاده شد. برای تعیین کیفیت و کمیت RNAهای استخراج شده، چگالی نوری (OD) همه نمونه‌ها با دستگاه نانودراپ اندازه‌گیری شد. پس از آن، سنتز DNA مکمل (cDNA) توسط کیت سنتز cDNA تاکارا (TAKARA Cat No. 6130) و مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد. تجزیه و تحلیل کمی توسط دستگاه real time PCR مدل استپ وان پلاس (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) انجام شد. کمیت نسبی سطح بیان mRNA، IL-6 و TNF- α از نمونه‌های بافت کلیه سنجش شد که برای این کار از پرایمرهای اختصاصی ژن (IL-6 و TNF- α) و مسترمیکس سایبرگرین (TAKARA Cat No. RR820W) استفاده شد. از سطح بیان ژن GAPDH (ژن خانه داری) جهت نرمال کردن سطح بیان ژن‌های هدف استفاده شد. پرایمرها (جدول ۱) با استفاده از نرم‌افزار الیگو ۷ طراحی شدند و برای اختصاصیت و دقت همه پرایمرها در وب سایت NCBI بلاست می شوند. میانگین نمرات مقادیر تکراری Ct برای هر نمونه اندازه‌گیری شد و از

جدول ۱: پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر

نام ژن	طول قطعه	(5'→3') توالی پرایمر
GAPDH	۹۹	Forward: CTCTCTGCTCCTCCCTGTTCT Reverse: CAAATCCGTTACACCCGACCT
TNF- α	۱۴۵	Forward: CAACACATCTCCCTCCGAAA Reverse: CACAGACACCGCCTGGAGTTC
IL-6	۱۱۴	Forward: AGCTCATCTGTCTCGAGCCC Reverse: GTCCCAAGAAGGCAACTGGC


معنی‌داری در گروه‌های تمرین و کنترل مشاهده نشد ($P=0/08$). علاوه بر این مقادیر IL-6 در گروه تمرین + تستوسترون به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه تمرین بود ($P=0/04$) (شکل ۱). نتایج آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه نشان داد تفاوت معنی‌داری در مقادیر TNF- α ($P=0/09$) و ($F=7/87$) در گروه‌های تحقیق وجود دارد. نتایج نشان داد

نتایج

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه نشان داد تفاوت معنی‌داری در مقادیر IL-6 ($P=0/001$ و $F=12/77$) در گروه‌های تحقیق وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد مقادیر IL-6 در گروه تمرین + تستوسترون به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود ($P=0/001$)؛ اما تفاوت


مقادیر GPx در گروه تمرین + تستوسترون ($P=0/001$) و تمرین ($P=0/001$) به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. اما تفاوت معنی داری در گروه های تمرین + تستوسترون و گروه تمرین مشاهده نشد ($P=0/93$) (شکل ۳). نتایج آزمون آنالیز واریانس یک راه نشان داد تفاوت معنی داری در مقادیر SOD ($F=10/97$ و $P=0/62$) در گروه های تحقیق مشاهده نشد (شکل ۴).

مقادیر TNF- α در گروه تمرین + تستوسترون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود ($P=0/008$)؛ اما تفاوت معنی داری در گروه تمرین و کنترل مشاهده نشد ($P=0/68$). اما گروه های تمرین + تستوسترون به طور معنی داری بیشتر از گروه تمرین بود ($P=0/02$) (شکل ۲). نتایج آزمون آنالیز واریانس یک راه نشان داد تفاوت معنی داری در مقادیر GPx ($F=19/56$ و $P=0/001$) در گروه های تحقیق وجود دارد.




نمودار ۱: مقایسه تغییرات سطوح بیان ژنی IL-6 در بافت کلیه موش های صحرایی در گروه های تحقیق.

*** $P=0/001$ افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل # $P=0/05$ افزایش معنی دار نسبت به گروه تمرین




نمودار ۲: مقایسه تغییرات سطوح بیان ژنی TNF- α در بافت کلیه موش های صحرایی در گروه های تحقیق.

** $P=0/01$ افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل # $P=0/05$ افزایش معنی دار نسبت به گروه تمرین



نمودار ۳: مقایسه تغییرات مقادیر GPx در بافت کلیه موش های صحرایی در گروه های تحقیق.

*** $P=0/001$ کاهش معنی دار نسبت به گروه کنترل



نمودار ۴: مقایسه تغییرات مقادیر SOD در بافت کلیه موش‌های صحرایی در گروه‌های تحقیق

هفته تمرین مقاومتی باعث کاهش در $TNF\alpha$ و $IL-6$ در بیماران مزمن کلیوی شد (۲۵). در پژوهشی دیگر یزدخواستی و همکاران (۱۴۰۱) نیز گزارش کردند که ۱۲ هفته تمرین مقاومتی تناوبی باعث کاهش سطح سرمی $IL-6$ در مردان چاق شد، اما بر سطوح $TNF-\alpha$ تأثیر معنی‌داری نداشت (۲۶). مطالعات نشان می‌دهند که مدت و شدت فعالیت ورزشی، متغیرهای مهمی در پاسخ دستگاه دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن به فعالیت ورزشی هستند (۲۷-۲۸). لذا به نظر می‌رسد تمرین و فعالیت ورزشی، همانگونه که قادر به تقویت دستگاه دفاع آنتی‌اکسیدانی هستند، به همان نحو نیز می‌تواند منجر به افزایش تولید ROS از منابع مختلف و در نتیجه تضعیف سیستم آنتی‌اکسیدانی شوند (۲۷، ۲۹). به طوری که در هنگام فعالیت‌های ورزشی کلیه‌ها به علت توزیع بیشتر خون به عضلات فعال، محیطی هایپوکسی را تجربه می‌کنند، که می‌تواند از علل افزایش فشار اکسایشی باشند؛ زیرا، در اثر کم‌خونی ناشی از ورزش در بافت‌ها، تولید رادیکال‌های آزاد افزایش می‌یابد (۲۷). بر اساس برخی از یافته‌های پژوهش‌ها علت کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بر هم خوردن هموستاز ردوکس (اکسیدان-آنت اکسیدان) می‌باشد، زیرا فعالیت‌های مقاومتی می‌تواند از طریق سازوکارهایی مانند تغییر هموستاز کلسیم، مسیر گزانتین اکسیداز، افزایش اکسیداسیون کاتکول آمین موجب افزایش تولید رادیکال‌های آزاد شود (۳۰). از دلایل اختلاف نتایج پژوهش حاضر با پژوهش‌های ذکر شده می‌توان به تفاوت بین بازه‌های زمانی برای نمونه‌گیری اشاره کرد زیرا بدیهی است که زمان نمونه‌گیری در رابطه با آخرین

بحث

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تجویز تستوسترون بر شاخص‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی و سایتوکین‌های التهابی ($IL-6$ و $TNF-\alpha$) بافت کلیه در موش‌های صحرایی نر بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی موجب کاهش معنادار سطوح GPx نسبت به گروه کنترل شده است. اما تأثیر معناداری بر بیان ژن $TNF-\alpha$ ، $IL-6$ و میزان فعالیت SOD نسبت به گروه کنترل نداشت. هر چند که هشت هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش غیرمعنادار در بیان ژن‌های $IL-6$ و $TNF-\alpha$ شد. در این زمینه مطالعاتی انجام شده است. به عنوان مثال غیائی و همکاران (۲۰۱۵) گزارش کردند اجرای تمرینات مقاومتی به مدت ۴ ماه تأثیر معناداری بر روی آنزیم آنتی‌اکسیدانی SOD بافت قلب موش‌های صحرایی نداشت (۲۰). همچنین پژوهشی نشان داد که انجام یک دوره تمرینات مقاومتی فشرده منجر به کاهش سطوح GPx در زنان وزنه بردار می‌شود (۲۱). چیمبا و همکاران (۲۰۱۱) نشان دادند که تمرین مقاومتی منجر به افزایش معنی‌دار $TNF-\alpha$ در بیماران کلیوی می‌گردد (۲۲). همچنین واتسون و همکاران (۲۰۱۷) گزارش دادند که انجام تمرینات مقاومتی منجر به افزایش قابل‌توجهی در $TNF-\alpha$ در بیماران کلیوی می‌گردد (۲۳). از طرفی عزآبادی و همکاران (۲۰۱۹) نشان دادند که چهار هفته تمرین مقاومتی منجر به افزایش معنی‌دار سطوح SOD، CAT و کاهش MDA بافت مخچه موش‌های صحرایی مسموم شده با دیازینون می‌گردد (۲۴). در مقابل، گادل‌ها و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که ۲۴

جلسه تمرینی مهم است. نزدیک بودن به آخرین جلسه تمرینی ممکن است نشان دهنده تأثیرات حاد ورزش بر التهاب باشد تا اثرات ناشی از سازگاری با فعالیت ورزشی باشد و همچنین می‌توان به روش مورد استفاده برای اندازه‌گیری سایتوکاین‌ها (الایزا در مقابل فلوسیتومتری)، نمونه‌های متفاوت و پروتکل‌های تمرین و فعالیت ورزشی (به ویژه شدت) اشاره کرد (۲۸). احتمالاً در مطالعه حاضر شدت فعالیت ورزشی به اندازه‌ای بوده است که منجر به افزایش سایتوکاین‌های التهابی و راه اندازی مسیرهای سیگنالینگ التهابی (۳۱) پس از فعالیت ورزشی شده باشد. یافته مهم پژوهش حاضر این است که مصرف هشت هفته تستوسترون به همراه تمرین مقاومتی موجب افزایش معنادار بیان ژن $TNF-\alpha$ و $IL-6$ نسبت به گروه تمرین و کنترل شد. همچنین مقادیر GPx در گروه تمرین+تستوسترون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری داشت. با این حال تفاوت معناداری در مقادیر SOD در بین گروه‌های تحقیق مشاهده نشد. همسو با مطالعه حاضر ریزو و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند که مصرف استروئیدهای آنابولیک به همراه تمرینات ورزشی شدید موجب کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون پراکسیداز می‌شود که منجر به کاهش توانایی حذف رادیکال‌ها در کلیه می‌شود (۱۱). همچنین کارا و همکاران (۲۰۱۸)، گزارش کردند که مصرف استروئیدهای آنابولیک موجب افزایش سطح پروتئین کربونیل ($Protein\ carbonyl: PC$) و کاتالاز ($Catalase: CAT$) در بافت قلب می‌شود (۳۲). مایادا و همکاران (۲۰۱۵) نشان دادند که تزریق AAS باعث ایجاد تغییرات ساختاری و عملکردی، افزایش استرس اکسیداتیو و واسطه‌های آپوپتوز مانند ROS ، $p53$ و $TNF-\alpha$ در کبد شد (۳۳). همچنین گومز و همکاران (۲۰۱۶) نیز گزارش کردند که هشت هفته مصرف ناندرون دکانوات به همراه تمرین مقاومتی منجر به افزایش سطوح $IL-6$ ، IRF ، $NF-KB$ و $TNF-a$ و نیتریک اکساید ($Nitric\ oxide: NOX$) در بافت پروستات موش‌های صحرائی می‌شود (۱۲). این در حالی است که در پژوهشی دیگر نشان داده شد که مصرف دوزهای بالای

تستوسترون انانات در موش‌های صحرائی‌نر که تحت تمرین استقامتی قرار دارند با کاهش فعالیت SOD و CAT به سیستم‌های دفاعی و آنتی‌اکسیدانی آسیب می‌رساند (۳۴). لیما و همکاران (۲۰۲۰) نیز گزارش کردند که مصرف ناندرون موجب افزایش استرس اکسیداتیو هم در پروتئین‌ها و هم در لیپیدها و به دنبال آن کاهش فعالیت SOD می‌شود (۳۵). در ارتباط با سازوکارهای احتمالی گزارش شده است که مصرف طولانی‌مدت دوزهای بالای AAS منجر به افزایش متابولیسم سیتوکروم مونواکسیژناز و اختلال در زنجیره انتقال الکترونی می‌شود که این به نوبه خود موجب افزایش تولید ROS و استرس اکسیداتیو می‌شود (۳۶،۴). همچنین تستوسترون می‌تواند مستقیماً و به طور غیر مستقیم از طریق فعال سازی سیستم رنین- آنژیوتانسین- آلدوسترون و اندوتلین (از طریق افزایش $NADPH$ اکسیداز) باعث ایجاد استرس اکسیداتیو شود (۶). استرس اکسیداتیو پارامتر مهمی است که آسیب اندام را افزایش می‌دهد، و این اختلال متابولیک یا با افزایش گونه‌های اکسیژن واکنش پذیر یا کاهش در سیستم آنزیمی آنتی‌اکسیدان مشخص می‌شود (۳۷). در پژوهش حاضر، کاهش فعالیت آنتی‌اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز احتمال دارد ناشی از استفاده زیاد آن‌ها برای کاهش ROS باشد و از طرف دیگر به علت محدود شدن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی توسط گونه‌های فعال اکسیژن باشد و ممکن است وضعیت اکسایشی-کاهش را به سمت استرس اکسیداتیو تغییر دهد (۳۸،۳۹). در توجیه کاهش فعالیت GPx در موش‌های مصرف کننده تستوسترون به نظر می‌رسد افزایش ROS از دلایل کاهش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها باشد. شواهد نشان می‌دهد بیشتر ROS ها و مشتقات فعال ($Redox$) به عنوان مولکوهای آسیب‌رسان شناخته می‌شوند که می‌توانند مسیرهای پیام‌رسانی التهابی مانند عامل رونویسی هسته‌ای کاپا بتا ($nuclear\ factor$ $Kappa\ B: NF-kB$) را میانجی‌گری کنند (۴۰) در ادامه $NF-kB$ پس از فعال شدن، از سیتوپلاسم به هسته منتقل می‌شود، جایی که $NF-kB$ روی پروموتور ژن‌های $IL-6$ و $TNF-\alpha$ می‌نشیند و با القا بیان آن‌ها موجب افزایش التهاب می‌شود (۱۳).

اطمینان بیشتر از نتایج ارزیابی شود. به‌طور کلی باتوجه به یافته‌های پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد سوء‌مصرف تستوسترون همراه با تمرین مقاومتی شدید احتمالاً با افزایش رادیکال‌های آزاد منجر به فعال‌سازی مسیر بیان سایتوکاین‌های التهابی همراه است و در انتها تمرین مقاومتی با شدت‌های بالا هم به تنهایی و هم همراه با مصرف دوز فوق فیزیولوژیک تستوسترون منجر به کاهش عملکرد سیستم آنتی‌اکسیدانی و افزایش نشانگرهای التهابی در بافت کلیه همراه است.

سپاس‌گزاری

این پژوهش برگرفته از رساله دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر است. از تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند سپاس‌گزاری می‌شود.
حامی مالی: ندارد.
تعارض در منافع: وجود ندارد.

از سویی دیگر، واسطه‌های پیش‌التهابی مانند TNF- α ، IL-1 و IL-6 نیز می‌توانند منجر به تولید ROS شوند و سپس NF-kB و عامل القایی آپوپتوزی - 1 (Apoptosis induced factor-1: AP-1) را فعال می‌کنند (۴۱).

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد برای تایید یافته‌های پژوهش حاضر بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت نیز مورد نیاز باشد که از محدودیت‌های این پژوهش به شمار می‌رود. بنابراین پیشنهاد می‌شود. در پژوهش‌های آتی برای اطمینان بیشتر از نتایج، تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت نیز ارزیابی شود. هم‌چنین با توجه به نقش محوری NF-kB در افزایش سایتوکاین‌ها و اهمیت ROSها در ارزیابی توان آنتی‌اکسیدانی، عدم ارزیابی این دو مسیر نیز از دیگر محدودیت‌های مطالعه حاضر است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آتی این دو متغیر برای

References:

- 1-Magalhães SC, de Oliveira KA, Freiras PA, Moreira Gomes MD, Pereira LM, Boa LF, et al. *High-dose Nandrolone Decanoate Induces Oxidative Stress and Inflammation in Retroperitoneal Adipose Tissue of Male Rats*. J Steroid Biochem Mol Biol 2020; 203: 105728.
- 2-Karbasi S, Zaeemi M, Mohri M, Rashidlamir A, Moosavi Z. *Outcomes of Testosterone Enanthate on Kidney of Male Wistar Rats Subjected to Resistance Training*. Science & Sports 2017; 32(3): e107-e110.
- 3-Arazi H, Rahmati S, Ghafoori H. *The Interaction Effects of Resistance Training and Sustanon Abuse on Liver Antioxidant Activities and Serum Enzymes in Male Rats*. Interv Med Appl Sci 2017; 9(3): 178-83.
- 4-Frankenfeld SP, Oliveira LP, Ortenzi VH, Rego-Monteiro IC, Chaves EA, Ferreira AC, et al. *The Anabolic Androgenic Steroid Nandrolone Decanoate Disrupts Redox Homeostasis in Liver, Heart and Kidney of Male Wistar Rats*. PloS One 2014; 9(9): e102699.
- 5-Agahi MR, Mosallanejad Z, Salehi OR. *The Effects of Resistance Training and Spirulina on the Performance of the Antioxidant System with Emphasis on Mir125b, Mir146a and Cognitive Function in Stanzolol-Induced Neurotoxicity in Rats*. Chem Biol Interact 2022; 366: 110112.
- 6-Davani-Davari D, Karimzadeh I, Khalili H. *The Potential Effects of Anabolic-Androgenic Steroids and Growth Hormone as Commonly Used Sport Supplements on The Kidney: A Systematic Review*. BMC Nephrol 2019; 20(1): 198.
- 7-Albano GD, Amico F, Cocimano G, Liberto A, Maglietta F, Esposito M, et al. *Adverse Effects of*

- Anabolic-Androgenic Steroids: A Literature Review.* Healthcare (Basel) 2021; 9(1): 97.
- 8-Dornelles GL, Bueno A, de Oliveira JS, da Silva AS, França RT, da Silva CB, et al. *Biochemical and Oxidative Stress Markers in the Liver and Kidneys of Rats Submitted to Different Protocols of Anabolic Steroids.* Mol Cell Biochem 2017; 425(1-2): 181-9.
- 9-Sottero B, Rossin D, Poli G, Biasi F. *Lipid Oxidation Products in The Pathogenesis of Inflammation-Related Gut Diseases.* Curr Med Chem 2018; 25(11): 1311-26.
- 10- Culig Z. *Androgen Receptor Cross-Talk with Cell Signalling Pathways.* Growth factors 2004; 22(3): 179-84.
- 11- Riezzo I, Turillazzi E, Bello S, Cantatore S, Cerretani D, Di Paolo M, et al. *Chronic Nandrolone Administration Promotes Oxidative Stress, Induction of Pro-Inflammatory Cytokine and TNF- α Mediated Apoptosis in The Kidneys of CD1 Treated Mice.* Toxicol Appl Pharmacol 2014; 280(1): 97-106.
- 12- Gomes FC, Chuffa LG, Scarano WR, Pinheiro PF, Fávoro WJ, Domeniconi RF. *Nandrolone Decanoate and Resistance Exercise Training Favor the Occurrence of Lesions and Activate the Inflammatory Response in the Ventral Prostate.* Andrology 2016; 4(3): 473-80.
- 13- Tofas T, Draganidis D, Deli CK, Georgakouli K, Fatouros IG, Jamurtas AZ. *Exercise-Induced Regulation of Redox Status in Cardiovascular Diseases: The Role of Exercise Training and Detraining.* Antioxidants (Basel) 2019; 9(1): 13.
- 14- Koozehchian MS, Daneshfar A, Fallah E, Agha-Alinejad H, Samadi M, Kaviani M, et al. *Effects of Nine Weeks L-Carnitine Supplementation on Exercise Performance, Anaerobic Power, And Exercise-Induced Oxidative Stress in Resistance-Trained Males.* J Exerc Nutrition Biochem 2018; 22(4):7-19.
- 15- Gorzi A, Rajabi H, Gharakhanlou R, Dehkhoda MR, Hedayati M. *The Effects of 8 Weeks of Resistance Training on Total and A12 Acetyl Cholinesterase Activity in Slow Twitch Muscles of Rats.* RSMT 2017; 15(13):9-16. [Persian]
- 16- Joksimović J, Selaković D, Jakovljević V, Mihailović V, Katanić J, Boroja T, et al. *Alterations of the Oxidative Status in Rat Hippocampus and Prodepressant Effect of Chronic Testosterone Enanthate Administration.* Mol Cell Biochem 2017; 433(1-2): 41-50.
- 17- Woolliams JA, Wiener G, Anderson PH, McMurray CH. *Variation in the Activities of Glutathione Peroxidase and Superoxide Dismutase and in the Concentration of Copper in the Blood in Various Breed Crosses of Sheep.* Res Vet Sci 1983; 34(3): 253-6.
- 18- Nakamura W, Hosada S, Hayashi K. *Purification and Properties of Rat Liver Glutathione Peroxidase.* Biochim Biophys Acta 1974; 358(2): 251-61.
- 19- Pfaffl MW. *A New Mathematical Model for Relative Quantification in Real-Time RT-PCR.* Nucleic Acids Res 2001; 29(9): e45.
- 20- Ghiasi R, Mohammadi M, Ashrafi Helan J, Jafari Jozani SR, Mohammadi S, Ghiasi A, et al. *Influence of Two Various Durations of Resistance Exercise on Oxidative Stress in the Male Rat's Hearts.* J Cardiovasc Thorac Res 2015; 7(4): 149-53.

- 21- Liu JF, Chang WY, Chan KH, Tsai WY, Lin CL, Hsu MC. *Blood Lipid Peroxides and Muscle Damage Increased Following Intensive Resistance Training of Female Weightlifters*. Ann N Y Acad Sci 2005; 1042(1): 255-61.
- 22- Cheema BS, Abas H, Smith BC, O'Sullivan AJ, Chan M, Patwardhan A, et al. *Effect of Resistance Training during Hemodialysis on Circulating Cytokines: A Randomized Controlled Trial*. Eur J Appl Physiol 2011; 111: 1437-45.
- 23- Watson EL, Viana JL, Wimbury D, Martin N, Greening NJ, Barratt J, et al. *The Effect of Resistance Exercise on Inflammatory and Myogenic Markers in Patients with Chronic Kidney Disease*. Front Physiol 2017; 8: 541.
- 24- Ezabadi A, Peeri M, Azarbayjani MA, Hosseini SA. *The Effects of Resistance Training and Berberine Chloride Supplementation on Oxidative Stress Markers in the Cerebellum Tissue of Diazinon-Poisoned Rats*. MEJRHS 2019; 6(3): e92870.
- 25- Gadelha AB, Cesari M, Corrêa HL, Neves RVP, Sousa CV, Deus LA, et al. *Effects of Pre-Dialysis Resistance Training on Sarcopenia, Inflammatory Profile, and Anemia Biomarkers in Older Community-Dwelling Patients with Chronic Kidney Disease: A Randomized Controlled Trial*. Int Urol Nephrol 2021; 53(10): 2137-47.
- 26- Yazdkhasti E, Seifi-Skishahr F, Farzizadeh R. *The Effect of Interval Resistance Training with Different Intensity on Interleukin-6, Tumor Necrosis Factor- α and NRG-4 in Obese Men*. JME 2022; 12(2): 1-20. [Persian]
- 27- Gorzi A, Ekradi S. *The Effect of Intake Duration of Curcumin Supplementation during Strenuous Endurance Training on GPX Activity and MDA Levels of Liver, Heart and Skeletal Muscle in Male Wistar Rats*. Sport Physiology 2020; 12(46): 139-56. [Persian]
- 28- Azizbeigi K, Azarbayjani MA, Atashak S, Stannard SR. *Effect of Moderate and High Resistance Training Intensity on Indices of Inflammatory and Oxidative Stress*. Res Sports Med 2015; 23(1): 73-87.
- 29- Delavar R, Mogharnasi M, Khoobkhahi N. *The Effects of Combined Training on Oxidativestress and Antioxidant Defense Indicators*. IJBSM 2017; 2(1): 29-32.
- 30- Mohammadjafari H, Arazi H, Nemati N, Bagherpoor T, Suzuki K. *Acute Effects of Resistance Exercise and the Use of GH or IGF-1 Hormones on Oxidative Stress and Antioxidant Markers in Bodybuilders*. Antioxidants (Basel) 2019; 8(12): 587.
- 31- Mehrabi M, Kazemzadeh Y, Gorzi A, Hosseini SA, Sedaghati S. *The Effect of Eight Weeks of Testosterone Enanthate Consumption on Antioxidant Activity and NF-KB and Cyclooxygenase-2 Genes Expression of Kidney Tissue in Resistance Trained Male Rats*. KAUMS Journal (FEYZ) 2022; 26(6): 666-75.
- 32- Kara M, Ozcagli E, Kotil T, Alpertunga B. *Effects of Stanozolol on Apoptosis Mechanisms and Oxidative Stress in Rat Cardiac Tissue*. Steroids 2018; 134: 96-100.
- 33- Mayada RF, Taghred MS, Haytham AA. *Boldenone-Induced Apoptotic, Structural, and*

- Functional Alterations in the Liver of Rabbits.* World Rabbit Sci 2015; 23(1): 39-46.
- 34- Sadowska-Krępa E, Kłapcińska B, Nowara A, Jagsz S, Szoltysek-Bołdys I, Chalimoniuk M, et al. *High-Dose Testosterone Supplementation Disturbs Liver Pro-Oxidant/Antioxidant Balance and Function in Adolescent Male Wistar Rats Undergoing Moderate-Intensity Endurance Training.* PeerJ 2020; 8: e10228.
- 35- Lima EM, Cassaro KODS, Silva CLD, Silva MA, Poltronieri MP, Nascimento AMD, et al. *Eight Weeks of Treatment with Nandrolone Decanoate in Female Rats Promotes Disruption in the Redox Homeostasis and Impaired Renal Function.* Life Sci 2020; 242: 117227.
- 36- Arazi H, Mohammadjafari H, Asadi A. *Use of Anabolic Androgenic Steroids Produces Greater Oxidative Stress Responses to Resistance Exercise in Strength-Trained Men.* Toxicol Rep 2017; 4: 282-6.
- 37- Ara N, Nakkanong K, Lv W, Yang J, Hu Z, Zhang M. *Antioxidant Enzymatic Activities and Gene Expression Associated with Heat Tolerance in the Stems and Roots of Two Cucurbit Species (“Cucurbita Maxima” and “Cucurbita Moschata”) and Their Interspecific Inbred Line “Maxchata”.* Int J Mol Sci 2013; 14(12): 24008-28.
- 38- Dousdampanis P, Trigka K, Fourtounas C, Bargman JM. *Role of Testosterone in the Pathogenesis, Progression, Prognosis and Comorbidity of Men with Chronic Kidney Disease.* Ther Apher Dial 2014; 18(3): 220-30.
- 39- Gorzi A, Ekradi S, Rahmani A. *The Effect of High Intensity Endurance Training on Antioxidant Defense and Lipid Peroxidation of Male Wistar Rats.* Journal of Sport Biosciences 2018; 10(3): 333-45. [Persian]
- 40- Kabe Y, Ando K, Hirao S, Yoshida M, Handa H. *Redox Regulation of NF-Kb Activation: Distinct Redox Regulation Between the Cytoplasm and the Nucleus.* Antioxid Redox Signal 2005; 7(3-4): 395-403.
- 41- Sallam N, Laher I. *Exercise Modulates Oxidative Stress and Inflammation in Aging and Cardiovascular Diseases.* Oxid Med Cell Longev 2016; 2016: 7239639.

Effect of Eight Weeks of Resistance Training on Inflammatory Markers and Antioxidant Indices of Kidney Tissue Following Testosterone Enanthate Abuse in Male Rats

Masoumeh Mehrabi¹, Yaser Kazemzadeh¹, Ali Gorzi², Seyed Ali Hosseini³, Saeid Sedaghati⁴

Original Article

Introduction: Abuse of anabolic steroids can lead to kidney tissue damage. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of resistance training on inflammatory markers and antioxidant indices of kidney tissue of male rats following testosterone enanthate abuse.

Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly divided into three groups: 1) Control, 2) Training and 3) Training + Testosterone. Rats in groups 2 and 3 performed resistance training five sessions a week for eight weeks. Moreover, group 3 received 20 mg/kg of testosterone enanthate intramuscularly three days a week. The activity levels of Superoxide dismutase (SOD) and Glutathione peroxidase (GPx) were measured by spectrophotometric method and the gene expression of Interleukin-6 (IL-6) and Tumor necrosis factor alpha (TNF- α) were measured by Real Time PCR method. The data were analyzed using SPSS version 16 software. To analyze the findings, one-way analysis of variance was used ($P \geq 0.05$).

Results: Resistance training caused a significant decrease in GPx activity ($P=0.001$) compared to the control group. IL-6 gene expression in the training + testosterone group was significantly more than the training group ($P=0.04$) and the control group ($P=0.001$). Training + testosterone caused a significant increase in TNF- α gene expression compared to the training group ($P=0.02$) and the control group ($P=0.008$). Furthermore, the level of GPx activity in the training + testosterone group was significantly lower than the control group ($P=0.001$), but no significant difference was observed in the training + testosterone groups and the training group ($P=0.93$).

Conclusion: It seems that testosterone abuse along with intense resistance training is associated with a decrease in the function of the antioxidant system and increase in inflammatory markers in the kidney tissue.

Keywords: Testosterone Enanthate, IL-6, TNF- α , Antioxidant System, Resistance Training.

Citation: Mehrabi M, Kazemzadeh Y, Gorzi A, Hosseini S.A, Sedaghati S. **Effect of Eight Weeks of Resistance Training on Inflammatory Markers and Antioxidant Indices of Kidney Tissue Following Testosterone Enanthate Abuse in Male Rats.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2023; 31(7): 6873-84.

¹Department of Exercise Physiology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.

²Department of Sport Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

³Department of Exercise Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

⁴Department of Sport Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.

*Corresponding author: Tel: 09122205973, email: yaser.kazemzadeh@yahoo.com