

بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق

^۰ علی اکبر ملکی راد^۱، دکتر منصور بیرامی^۲، سپری راهزانی^۳، دکتر سید محمدعلی شریعت زاده^۴، ابوالفضل عیسی آبادی بی‌چلویی^۵

حکیمہ

مقدمه: رادیکال های آزاد، اتم ها یا مولکول هایی هستند که به خاطر وجود الکترون تک، بسیار واکنش پذیر بوده و آسیب های فراوانی را به ماکرو ملکول های بدن جانداران وارد می سازند. سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی با جلوگیری از تشکیل رادیکال ها، ترمیم صدمات ناشی از فعالیت رادیکال ها، افزایش دفع مولکول های صدمه دیده و به حداقل رساندن جهش های سلولی با آسیب های ناشی از این رادیکال ها مقابله می کنند. سبک های مختلف زندگی و تعذیبه ای، فاکتور های محیطی و ژنتیکی می توانند باعث افزایش غیر طبیعی تولید رادیکال های آزاد یا تضعیف سیستم دفاع آنتی اکسیدانی شده و تعادل بین تولید و دفع رادیکال های آزاد را بر هم زده و همچنین در پدیده پیری ایجاد و پیشرفت تعداد زیادی از سمار بهنا نقش داشته باشد. به این اساس بخواهیم مرتبط با ظرفت آنتی اکسیدانه تام باقی برسی شد.

روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود. نمونه‌گیری به روش چند مرحله‌ای انجام گرفت. افراد تحت مطالعه ۷۲۰ نفر (۳۹۵ دختر، ۳۲۵ پسر) از افراد ۱۵-۱۷ ساله شهر اراک بودند. افراد پرسشنامه‌ای در خصوص اطلاعات مربوط به عوامل دموگرافیک و رژیم غذایی، که روایی آن توسط متخصصین فن، تأیید شده بود را پر کردند و سپس ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق آنها با روش FRAP (اندازه‌گیری شد. جهت تجهیزه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (تی تست و ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد.

نتایج: میانگین و انحراف معیار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق پسرها بالاتر از دخترها بود ($P=0.0002$) همچنین بین مصرف شیر، تحصیلات مادر، پدر و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت و $p < 0.05$ به ترتیب عبارت بودند از: ($P=0.024$ ، $P=0.045$ ، $P=0.087$ ، $P=0.076$). بین وضعیت اقتصادی، مصرف گوشت قرمز و سفید، چربی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی معنی داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تحصیلات والدین و رعایت رژیم غذایی با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق همبستگی مثبت و معنی داری دارد که به نظر می‌رسد دادن آگاهی‌های لازم و آموزش‌های تغذیه‌ای می‌تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو و پیشگیری از بیماری‌های مختلف گردد.

واژه‌های کلیدی: رادیکالهای آزاد، آنتی اکسیدان، استرس اکسیداتیو، بزاق، رژیم غذایی

مقدمه

الکتروولیت‌ها، ملکول‌های کوچک‌آلی و ترکیبات منتقل شده از خون می‌باشد(۱). پروتئین‌های بزاق در حدود ۳٪ پروتئین‌های پلاسماست و اغلب این پروتئین‌ها دارای خواص ضد باکتریایی می‌باشند(۲). همچنین بزاق دارای ایمنوگلوبولین A، لیزوژیم، لاکتوفیبرین و آکسیداز می‌باشد(۳). نوت: وفاها حیث است:

بزاق یک مایع هتروژن تشکیل شده از پروتئین‌ها، گلیکوپروتئین‌ها،

* - نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز
تلفن: ۰۴۱-۰۹۱۸۸۴۰۰۳۸ - امیر: ۰۹۱۸۸۴۰۰۳۸۶۱ - تاریخ: ۲۴۲۲۳۳۴۱ -

• ۸۹-۴۳۴۴۴

۳- استادیار گروه ادبیات اسلامی - دانشگاه قم

۱- اسناد پیار تروه روان سیاسی - دانسکاه ببریز
۲- دانشجویی، دکترای، دوستادع، عضوه هشتادم دانشگاه علم و تکنیک اراک

۴- دانشگاه اسلامی پرست شناس - دانشگاه آزاد

۵- کارشناس ارشد علوم اجتماعی - دانشگاه بیام نور کمیجان

شده، بین میزان آنتی اکسیدان‌های تام بزاق و سرم ارتباط مستقیم وجود دارد و می‌تواند بیانگر وضعیت آنتی اکسیدان‌های سیستم گردش خون و بدن باشد(۱۰، ۱۵). از آنجا که امروزه بیش از یک چهارم جمعیت جهان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند و درصد آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، به دلیل آسیب پذیری نوجوانان، تأکید زیادی بر سلامت جسمی و روانی آنان شده است، بنابراین توصیه می‌شود نیازهای بهداشتی این گروه شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد(۱۶). بر این اساس به بررسی رابطه بین رژیم غذایی و عوامل دموگرافیک با ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق افراد ۱۵-۱۷ ساله پرداختیم.

روش بررسی

این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود و جمعیت مورد مطالعه افراد ۱۵-۱۷ ساله شهر اراک بودند که نمونه‌های مورد مطالعه از میان آنها به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند مراحل نمونه‌گیری به این ترتیب بود که از نواحی یک و دو آموزش و پرورش تعدادی نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی با تخصیص متناسب (بر اساس نسبت هر پایه از دانش آموزان در جمعیت اصلی در هر ناحیه) انتخاب شدند. سپس از مدارس مختلف هر ناحیه به روش خوشه‌ای برخی دیبرستان‌ها انتخاب و سپس از بین دیبرستان‌های هر خوشه تعدادی دیبرستان دخترانه و پسرانه به روش طبقه‌بندی ساده انتخاب شدند و در هر دیبرستان دانش آموزان بر اساس مقطع تحصیلی طبقه‌بندی شده (طبقه‌بندی ساده) و از میان سطوح مختلف برخی کلاس‌ها و از میان کلاس‌ها نیز برخی دانش آموزان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تعداد ۷۲۰ نفر (۳۹۵ دختر با میانگین سنی $16/27 \pm 0/98$ و ۳۲۵ پسر با میانگین سنی $16/25 \pm 0/79$) از افرادی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به روش تصادفی چند مرحله‌ای وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل کسانی بودند که در گروه سنی ۱۵-۱۷ سال قرار داشتند، سابقه هیچ نوع اختلالات متابولیکی نظیر اختلالات کبدی و کلیوی نداشته، بیماری دیابت،

بردن باکتریها در دهان تولید رادیکالهای آزاد می‌کنند که عمدتاً توسط آنتی اکسیدان‌ها خنثی می‌گردند. از طرف دیگر مراحلی از جویدن غذا باعث ایجاد پراکسیداسیون لیپیدی می‌شود که بزاق می‌تواند به عنوان یک خط دفاعی در برابر رادیکالهای آزاد ایجاد کننده استرس اکسیداتیو عمل نماید(۴). بزاق منبع غنی آنتی اکسیدانی بوده و به طور عمده شامل اسید اوریک، آلبومین، آسکوربات، گلوتاتیون، لاکتوفرین و سرولوپلاسمین می‌باشد. همچنین گزارش شده که آنتی اکسیدان اصلی بزاق، اسید اوریک می‌باشد(۵) بزاق می‌تواند در کاهش پراکسیداسیون لیپیدی غذایی بلع شده نقش داشته باشد(۴). سیستم آنتی اکسیدانی با جلوگیری از تشکیل رادیکالهای آزاد، ترمیم صدمات ناشی از فعالیت رادیکالها، افزایش دفع مولکول‌های صدمه دیده و به حداقل رساندن جهش‌های سلولی با آسیب‌های ناشی از رادیکالهای آزاد مقابله می‌کند(۶). به طور کلی در حالت معمول فیزیولوژیکی بین تولید رادیکال‌های آزاد در بدن و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی توازن برقرار می‌باشد، اما مواجهه با عواملی همچون آلایندگهای محیطی، داروها، سموم، گازهای بیهوشی، اشعه‌ها و غیره باعث افزایش تولید رادیکالهای آزاد در بدن و عدم تعادل بین تولید و دفع آنها می‌شود و حالتی به نام استرس اکسیداتیو به وجود می‌آورد که می‌تواند زمینه ساز بیش از یکصد نوع بیماری گردد(۷، ۸، ۹) افزایش تولید رادیکالهای آزاد می‌تواند در پدیده پیری، سرطان، بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت و عفونی نقش داشته باشد(۱۱، ۱۰). سبک‌های مختلف زندگی و تغذیه‌ای، فاکتورهای محیطی و ژنتیکی می‌توانند باعث افزایش غیرطبیعی در تولید رادیکالهای آزاد یا تضعیف سیستم دفاع آنتی اکسیدانی شده و تعادل بین تولید و دفع رادیکالهای آزاد را برهمنم بزند(۱۲). این تضعیف سیستم دفاع آنتی اکسیدانی می‌تواند در پدیده پیری و ایجاد و پیشرفت تعداد زیادی از بیماریها نقش داشته باشد(۱۳). بررسی آنتی اکسیدان‌های تام بزاق از دو بعد حائز اهمیت است، اول اینکه این سیستم به عنوان اولین خط دفاع آنتی اکسیدانی است و کاهش آنتی اکسیدان‌های دهان با سرطان‌های دهان ارتباط دارد و بررسی آن به منظور بررسی سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن است(۱۴) و دوم اینکه طبق مطالعات انجام

شرکت مرک آلمان) کمپلکس آبی رنگ TPTZ-Fe+2 با مراکزیم جذب ۵۹۳ nm ایجاد می‌کند. میزان قدرت احیا کنندگی بزاق از طریق افزایش غاظت کمپلکس فوق توسط Unvisible 7800 مدل Jasco دستگاه اسپکتروفوتومتری مدل ۱۷(۱). محاسبات آماری پس از جمع آوری داده‌ها و با استفاده از برنامه Spss و آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (تی‌تست و ضریب همبستگی اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است که شرکت کلیه افراد در این پژوهش آگاهانه بوده و محققین در کلیه مراحل پژوهش متعهد به رعایت اصول اخلاق پژوهش بودند.

نتایج

یافته‌ها نشان داد که در این افراد میانگین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق (بر اساس $mean \pm SD$) 0.065 ± 0.053 میکرومول در میلی لیتر بود. این میانگین در پسرها 0.071 ± 0.064 و در دخترها 0.059 ± 0.042 میکرومول در میلی لیتر بود. استفاده از آزمون T-Test افزایش معنی‌داری را در پسرها نسبت به دخترها نشان داد ($P < 0.001$). طبق جدول ۱ و ۲ استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که از میان عوامل بررسی شده از جمله تحصیلات پدر و مادر، وضعیت اقتصادی، کشیدن سیگار، مصرف شیر، میوه، سبزی، گوشت قرمز و سفید، همبستگی معناداری میان میزان آنتی‌اکسیدانهای تام بزاق و تحصیلات پدر و مادر، کشیدن سیگار ($r = 0.39$) درصد از نمونه‌های مورد مطالعه سیگاری بودند) و مصرف شیر وجود داشت.

تیروئید، سرطان، فشار خون و قلبی - عروقی نداشته و سابقه مصرف هر نوع دارو و آنتی‌اکسیدان را نداشته باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول برآورد نسبت‌ها و با $\alpha = 0.05$ ، $d = 0.180$ ، $Design effect = 0.6$ این زمینه تهیه شد که روایی آن توسط متخصصین فن، مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. پس از اخذ رضایت نامه و تکمیل پرسشنامه در خصوص وضعیت رژیم غذایی (بررسی مصرف هر یک از مواد غذایی، از جمله هیدرات‌های کربن، چربیها، پروتئین‌های قرمز و سفید، لبیات، میوه و سبزی بر اساس اطلاعات حاصله از واحدهای مورد پژوهش در خصوص مصرف مواد مذکور طی یک هفته گذشته طبق پرسشنامه ای که توسط محققین بر اساس کتاب علوم تغذیه تنظیم شده و روایی آن توسط اساتید مربوطه تائید شده بود صورت گرفت و میزان مصرف در هر دسته از مواد غذایی به سه گروه کم، متوسط و زیاد طبقه‌بندی شد) و وضعیت اقتصادی (که بر اساس میزان درآمد ماهیانه خانواده، تعداد افراد خانواده و نوع منزل و در صورت استیجاری بودن میزان کرایه منزل) مشخص شد. فاکتورهای محیطی در طی ۱۲ ماه گذشته و عوامل دموگرافیک، از افرادی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند در ساعت معینی (۸ صبح، بدون نیاز به ناشتا بودن) ۱۰۰ بزاق گرفته شد و با روش FRAP از نظر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق مورد ارزیابی قرار گرفتند. این روش مبتنی بر توانایی بزاق در احیای یونهای فریک (Fe+3) به فرو (Fe+2) در حضور ماده‌ای به نام TPTZ (Tripyridyl-s-Triazine) به عنوان معرف است. در این روش واکنش Fe+2 با معرف TPTZ ساخت

جدول ۱: همبستگی بین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق با مصرف میوه و سبزی، گوشت قرمز و سفید، وضعیت اقتصادی، تحصیلات پدر و مادر و کشیدن سیگار و مصرف شیر

مصرف گوشت	صرف گوشت	صرف	صرف	وضعیت	صرف	وضعیت آنتی‌اکسیدانی تام
سفید	قرمز	سبزی	سبزی	میوه	اقتصادی	میوه
-۰/۰۱۴	-۰/۰۲۲	۰/۰۱۹	۰/۰۴۶	۰/۰۲۶	-۰/۰۶۹	-۰/۰۷۶
۰/۰۸۷	۰/۰۸۷	۰/۰۱۱	۰/۰۱۱	۰/۰۷۶	۰/۰۷۶	۰/۰۷۶
P	۰/۰۴۵	۰/۰۰۴	۰/۰۰۲	۰/۰۷۰	۰/۲۶۲	۰/۶۱۰
					۰/۲۳	۰/۷۲۱
						۰/۶۵۳

جدول ۲: توزیع فراوانی نسبی مصرف میوه، سبزی، برنج، گوشت قرمز، شیر و چربی در گروه مورد مطالعه

نوع ماده غذایی	کم	متوسط	زیاد	میوه
R=/.۰۱۹	٪۱۱/۲۳	٪۳۱/۴۲	٪۵۷/۲۳	میوه
P=/.۶۱۰				
R=/.۰۲۲	٪۲۳/۲۸	٪۴۴/۱۷	٪۳۰/۵۳	سبزی
P=/.۵۶۶				
R=/.۰۶۳	٪۲۸/۲۱	٪۲۲/۱۵	٪۴۹/۶۲	برنج
P=/.۰۹۷				
R=/.۰۱۴	٪۱۰/۴۴	٪۵۲/۹۹	٪۳۶/۵۵	گوشت قرمز
P=/.۷۲۱				
R=/.۰۱۷	٪۷/۶۰	٪۵۹/۵۵	٪۳۲/۸۳	گوشت سفید
P=/.۶۵۳				
R=/.۰۸۷	٪۷/۸۵	٪۷۳/۹۴	٪۱۸/۱۹	شیر
P=/.۰۲۰				
R=/.۰۶۱	٪۸/۴۴	٪۶۱/۰۳	٪۳۰/۵۱	چربی
P=/.۱۰۸				

بحث

سیگاری و غیر سیگاری گزارش کردند که در افراد سیگاری ظرفیت آنتی اکسیدان های Tam پلاسمما کاهش یافته است(۲۱). همچنین ترکیبات پراکسیدان همانند نیکوتین در افراد سیگاری از طریق تغییر LDL (لیپوپروتئین با دانسته پایین) در آتروفی نقش دارند(۲۰). نتایج مطالعه ما با این مطالعات مطابقت دارد، به نظر می رسد که در هر ۱۰۰ دود سیگار ۰/۳ تا ۳/۳ بیلیون ذره با بیش از ۴۰۰۰ جزء شامل ۴۳ ماده سرطان زای شناخته شده وجود دارد(۲۱) که منبع غنی از رادیکالهای آزاد می باشد و احتمالاً در تخریب فibre های الاستیکی، ایجاد آمفیزم و سرطان دخالت دارد. دود سیگار حاوی اکسیدهای نیتروژن از جمله NO₂ می باشد که این ماده خود یک نوع رادیکال آزاد است(۲۲). لذا در افراد سیگاری تولید رادیکال آزاد افزایش می یابد و به این ترتیب سیستم دفاع آنتی اکسیدانی تضعیف می گردد.

در این مطالعه وضعیت اقتصادی همبستگی معنی داری با ظرفیت آنتی اکسیدانی Tam بزرگ نشان نداد. Rozowski و همکاران در سال ۲۰۰۱ در مطالعه ای تحت عنوان اختلاف در میزان آنتی اکسیدان های Tam پلاسمای زنان اسکاتلنڈ بر اساس سطح اجتماعی- اقتصادی که بر روی ۸۱ نفر انجام گرفت، گزارش کردند که میزان آنتی اکسیدان های افراد با سطح

در این مطالعه میانگین ظرفیت آنتی اکسیدانی Tam بزرگ پسرها بالاتر از دخترها بود. Woo و همکاران در سال ۱۹۹۷ در مطالعه ای تحت عنوان ظرفیت آنتی اکسیدانی Tam پلاسمای جمعیت هنگ کنگ که بر روی ۷۲۸ نفر صورت گرفت، گزارش کردند که ظرفیت آنتی اکسیدانی Tam مردان بالاتر از زنان می باشد(۱۸). در مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۳ توسط Sculley و همکاران تحت عنوان ارتباط کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی بزرگ و افزایش اکسیداسیون پروتئین ها و بیماری های لشه ای صورت گرفت، گزارش شد که میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی مردان بالاتر از زنان می باشد(۱۹). نتایج مطالعات ما با این مطالعات مطابقت دارد. به نظر می رسد که در زنان عوامل مختلفی از قبیل استرس های فیزیولوژیک، تماس با UV و مصرف تنباکو کمتر از مردان باشد و همچنین عوامل هورمونی از جمله هورمون استروژن زنان را در برابر استرس اکسیداتیو تا حدودی محافظت می کند که مجموع این عوامل باعث تفاوت ظرفیت آنتی اکسیدانی Tam مردان و زنان شده است(۲۰).

در مطالعه حاضر مصرف سیگار با آنتی اکسیدان های Tam بزرگ همبستگی منفی نشان داد. رنجر و همکاران در سال ۱۳۸۳ در مطالعه ای تحت عنوان مقایسه میزان استرس اکسیداتیو در افراد

رابطه علت و معلولی نیاز به مطالعه مداخله‌ای باشد و در این خصوص رژیم غذایی افراد نیز باید کنترل گردد.

در این مطالعه مصرف شیر با ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق همبستگی مثبت معنی‌داری نشان داد. با توجه به اینکه شیر دارای ویتامین‌های A و C و عناصر آهن، روی و سلنیوم می‌باشد که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی هستند(۲۶).

Silvestre و همکاران در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۸ گزارش کردند که نقش آنتی‌اکسیدانی شیر به علت وجود BLакتو گلوبولین است که پروتئین اصلی شیر است و تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد از پروتئین‌های کل شیر را تشکیل می‌دهد(۲۷). Liu و همکاران در مطالعه‌ای تحت عنوان BLاكتو گلوبولین شیر گاو به عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی گزارش کردند که شیر دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی است و در حرارت ۶۳ درجه به مدت ۶۰ دقیقه مقدار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آن تغییر نمی‌کند(۲۸).

Chen و همکاران در سال ۲۰۰۳ در مطالعه‌ای تحت عنوان اندازه‌گیری ظرفیت آنتی‌اکسیدانی شیر گاو با استفاده از روش‌های اسپکترومتری و آمپرومتری گزارش کردند که شیر به خاطر داشتن ترکیباتی همچون ویتامین E و کارتوئیدها به عنوان آنتی‌اکسیدان‌های محلول در چربی و ویتامین C به عنوان آنتی‌اکسیدان محلول در آب همراه با آهن و لاکتو فرین دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی است(۲۹). پس شیر به علت داشتن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی می‌تواند باعث افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بدن و در نهایت بزاق گردد.

نتیجه‌گیری

بر اساس مطالعه حاضر بین سطح آنتی‌اکسیدان‌های تام بزاق و جنس، میزان تحصیلات والدین و رعایت رژیم غذایی ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می‌گردد که جهت تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی علاوه بر دادن آموزش‌های تغذیه‌ای و آگاهی‌های لازم از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی بیشتری استفاده شود تا از ایجاد بیماری در افراد سالم جلوگیری نموده و در بیماران نیز با تقویت این سیستم از عوارض ناشی از بیماری و پیشرفت آن پیشگیری نمود.

اجتماعی- اقتصادی پایین کمتر از افراد با سطح اجتماعی اقتصادی بالا می‌باشد(۲۳).

نتایج مطالعه حاضر با مطالعه Rozowski همخوانی ندارد با توجه به اینکه مطالعه ما در سطح وسیع تر و با تعداد نمونه بیشتر بر روی دو جنس صورت گرفته عدم همخوانی منطقی به نظر می‌رسد. شاید بتوان با انجام مطالعات مشابه در این خصوص یا مطالعات علت و معلولی با قطعیت بیشتری در این زمینه اظهار نظر نمود.

در این مطالعه ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام بزاق با سطح تحصیلات والدین ارتباط مثبت معنی‌داری داشت. Uusitalo و همکاران در سال ۲۰۰۸ در مطالعه‌ای تحت عنوان ارتباط ویژگی‌های سبک زندگی و عوامل دموگرافیک اجتماعی با جذب آنتی‌اکسیدان و مصرف منابع آنتی‌اکسیدانی در دوره بارداری گزارش کردند که از یک طرف مصرف سبزیجات با میزان تحصیلات والدین ارتباط دارد و از طرف دیگر زنان جوان با تحصیلات پایین جذب آنتی‌اکسیدان کمتری دارند(۲۴). Mendelson و همکاران در مطالعه‌ای تحت عنوان استفاده از مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی و ارتباط آن با عملکرد شناختی در یک گروه سالخورده روسیایی گزارش کردند که افراد دارای تحصیلات بالا آنتی‌اکسیدان بیشتری مصرف می‌کردند(۲۵). مطالعه حاضر با مطالعات مذکور همخوانی دارد، به نظر می‌رسد افزایش سطح تحصیلات و آگاهی والدین عامل مؤثری در رعایت رژیم غذایی و بالا رفتن میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام باشد.

در مطالعه حاضر مصرف میوه و سبزی، گوشت قرمز و سفید همبستگی معنی‌داری با میزان آنتی‌اکسیدان‌های تام بزاق نشان نداد. Lesgards و همکاران در مطالعه تأثیرات سبک زندگی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی افراد سالم که در سال ۲۰۰۲ انجام گرفت، گزارش کردند که مصرف بالای میوه، سبزی و ماهی و مصرف پایین گوشت قرمز باعث افزایش سطح آنتی‌اکسیدانی افراد می‌شود(۲۰). نتایج مطالعه حاضر با این مطالعه مغایرت دارد، از آنجایی که مطالعه ما یک مطالعه توصیفی می‌باشد و رژیم غذایی افراد تحت کنترل نبوده است به نظر می‌رسد جهت پی بردن به

Reference

- 1- Working Group 10, CORE. *Saliva: its role in health and disease*. International dental Journal 1992; 42,(4Suppl 2):287-304.
- 2- Edgar WM. *Saliva: its secretion composition and functions*. British dental Journal 1992;172,305-12.
- 3- Tenovuo J, Lehtonen OP, Althonen AS, Vilja P, Tuohimaa P. *Antimicrobial factors in whole saliva of human infants*. Infection and Immunity 1986; 51, 49-53.
- 4- Terao J, Nagao A. *Antioxidative effect of human saliva on lipid peroxidation*. Agricultural Biological chemistry 1991; 55:869-72.
- 5- Moore S, Calder K, Miller NJ, Rice-Evans CA. *Antioxidant activity of saliva and periodontal disease*. Free Radical Res 1994; 21: 417-25.
- 6- Wu BJ, kathir K, Witting PK, Bech K, Choy K, li C, et al. *Antioxidants protect from atherosclerosis by a heme oxygenase -1. pathway that is independent of free radical scavenging*. JEXP Med 2006 ;203(4):1117-27.
- 7- Juranek I, Bezek S. *Controversy of free radicals hypothesis : reactive oxygen species cause or consequence of tissue injury?* Gen physiol Biophys 2005;24(3):263-78.
- 8- Malekiran AA, Ranjbar A, Rahzani K, Kadkhodee M, Rezaie A, Taghavi B, et al. *Oxidative stress in operating room personnel: occupational exposure to anesthetic gases*. Human & Experimental Toxicology 2005;24:1-5.
- 9- Malekiran AA, Ranjbar A. Rahzani K, Pilehvarian AA, Rezaie A, Zamani MJ, et al. *Oxidative stress in radiology staff*. Environmental toxicology and pharmacology 2005;20:215-18.
- 10- ملکی راد علی اکبر، شریعت زاده سید محمدعلی، فانی علی، رنجبر اکرم. مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم و بزاق در بیماران مبتلا به دیابت نوع II با گروه کنترل. دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره ۷، شماره ۳ / پائیز ۱۳۸۴ - ۶۹-۷۴
- 11- ملکی راد علی اکبر، فانی علی، شریعت زاده سید محمدعلی، رنجبر اکرم. مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم و بزاق در بیماران مبتلا به دیابت نوع I دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد ۷، شماره ۲ و ۱ / پائیز و زمستان ۱۳۸۴ / ۹۳-۸۹
- 12- Moller P, Wallin K, Knudsen LE. *Oxidative stress associated with exercise, psychological stress and lifestyle factors*. Chem Biol Interact 1996; 102:17-36.
- 13- Bourdon E, Loreau N, Blache D. *Glucose and free radicals impair the antioxidant properties of serum albumin*. FASEB J 1999; 13:233-44.
- 14- Hershkovich D, Shafat I, Nagler RM. *Age-Related Changes in Salivary Antioxidant Profile: Possible Implications for Oral Cancer*. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 2007; 62:361-6.
- 15- Reznick AZ, Shehadeh N, Shafir Y, Nagler RM. *Free radicals related effects and antioxidants in saliva and serum of adolescents with Type 1 diabetes mellitus*. Arch Oral Biol 2006;51(8):640-8.
- 16- Kotdawala P, Salvi V, krishnausha VR. *Adolescent girl- anupdate .New Delhi-110029*. JAPEE. Brothers 2004: 1-2-7.
- 17- Iris F, Benzi F, Strain S. *Ferric reducing antioxidant assay*. Meth. Enzymol 1999;292,15-27.
- 18- Woo J, Leung SS, lam CW, Ho SC, lam TH, Janus ED. *Plasma total antioxidant Capacity in an adult Hong kong Chinese population*. Clin Biochem 1997;30(7):553-7.
- 19- Sculley DV, Langley- Evans SC. *Periodontal disease is associated with lower antioxidant capacity in whole saliva and evidence of increased protein oxidation*. Clinical science 2003;105:167-72.
- 20- Lesgards JF, Durand P, Lassarre M, Stocker P, Lesgards G, Lanteaume A, et al. *Assessment of*

- lifestyle Effects on the overall Antioxidant capacity of Healthy subjects.*** Environmental Health perspectives 2002; 110(5): 479-86.
- ۲۱- رنجبر اکرم، رجبیان هاجر، ژند یحیی، میرزا زاده الهه، اسماعیلی اکرم، قاسمی نژاد سارا و همکاران. مقایسه میزان استرس اکسیدانتیو در افراد سیگاری و غیر سیگاری. دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی ، سال هفتم ، شماره سوم ، پائیز ۱۳۸۳ ، ۷-۱۱ .
- ۲۲- Prjorw A, Lightsenj GW. *Mechanism of no reactions initiation of lipid peroxidation and the production of Hno2.* Science 1981; 214, 435-40.
- ۲۳- Rozowski J, Cuevas A, Castillo O, Marin PP, strobel P, Perez DD, et al. *Differences in plasma antioxidant according to socioeconomic level in Chilean women.* Rev Med chil 2001;129(1):43-50,24.
- ۲۴- Uusitalo L, Uusitalo U, Ovaskainen ML, Niinistö S, Kronberg-Kippilä C, Marjamäki L, et al. *Sociodemographic and lifestyle characteristics are associated with antioxidant intake and the consumption of their dietary sources during pregnancy.*

- Public Health Nutr 2008;11(12):1379-88.
- ۲۵- Mendelsohn AB, Belle SH, Stoehr GP, Gangulim. *Use of antioxidant supplements and its association with cognitive function in a rural elderly cohort : The Movies project.* American journal of epidemiology 1998, 48(1):38-44.
- ۲۶- راینسون کارین اچ، وایگلی اما اس، مولر دانا اچ. *اصول تغذیه راینسون.* ترجمه ناهید خلدی؛ زیر نظر علی کشاورز. تهران: نشر سالمی، ۱۳۷۸ .
- ۲۷- Silvestre D, Miranda M, Muriach M, Almansa I, Jareño E, Romero FJ. *Antioxidant capacity of human milk: effect of thermal conditions for the pasteurization.* Acta Paediatr 2008;97(8):1070-4.
- ۲۸- Liu HC, Chen WL, Mao SJ T. *Antioxidant Nature of Bovine Milk B-Lactoglobulin.* J Dairy Sci 2007;90:547-55.
- ۲۹- Chen j, Lindmark-Masson, Gorton L, Akesson B. *Antioxidant capacity of Bovine Milk assayed by spectrophotometric and Amperometric method.* International dairy Journal 2003;13:927-35.