

اثر محافظت قلبی اولئوروپین در برابر استرس اکسیداتیو در موش صحراایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

^{۱*} شاهین کاشفی مهر^۱، محمد رضا نصیرزاده^{۲*}

مقاله پژوهشی

مقدمه: دیابت شایع‌ترین اختلال اندوکرینی است که مشخصه آن هیپرگلیسمی است. افزایش استرس اکسیداتیو و تغییر میزان آنتی‌اکسیدان‌ها نقش مهمی در پاتوژنی دیابت ایفا می‌کند. بیشتر داروهای پائین‌آورنده قند خون که برای درمان دیابت، مورد استفاده قرار می‌گیرند در دراز مدت عوارض جانبی دارند. بنابراین، امروزه برای کنترل دیابت و عوارض آن، استفاده از داروهای گیاهی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر اولئوروپین بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان بافت قلب و فاکتورهای التهابی سرم را در موش‌های صحراایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی کردیم.

روش بررسی: در این مطالعه تعداد ۳۰ سر رت نر نژاد ویستان با وزن ۳۰ ± ۳۰ گرم به صورت تصادفی انتخاب و به ۳ گروه ($n = 10$) تقسیم شدند. گروه کنترل: رت‌های سالم دستنخورده، گروه دیابتی: رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین و گروه تیمار: رت‌های دیابتی شده که عصاره اولئوروپین با دوز ۶۰ میلی‌گرم به ازاء کیلوگرم وزن در هر روز بدن از طریق گاواز به مدت ۳۰ روز دریافت کردند. در پایان دوره مطالعه، غلظت سرمی گلوکز و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان بافت قلب اندازه‌گیری شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 - Duncan و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون‌های تعقیبی post hoc مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: نتایج نشان داد که غلظت سرمی گلوکز در گروه تیمار نسبت به گروه دیابتی به طور معنی‌داری کاهش یافته است ($p < 0.0001$). همچنین، فعالیت آنزیم‌های SOD TAC و GPX در گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتی به طور معنی‌داری افزایش یافت ($p < 0.0001$). **نتیجه‌گیری:** نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اولئوروپین قادر است از افزایش قند خون در موش‌های صحراایی دیابتی شده جلوگیری نماید و سیستم آنتی‌اکسیدانی بافت قلب را تقویت کند.

واژه‌های کلیدی: اولئوروپین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، قلب، دیابت، رت

ارجاع: کاشفی مهر شاهین، نصیرزاده محمد رضا. اثر محافظت قلبی اولئوروپین در برابر استرس اکسیداتیو نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بزد ۱۳۹۸؛ ۲۷ (۳): ۸۰-۸۲. ۱۳۷۲-۸۰.

۱-دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

۲-استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران.

*نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۹۱۴۰۱۵۱۰۸، پست الکترونیکی: mr.nasirzadeh@iau.ac.ir، کد پستی: ۵۱۵۶۹۷۳۵۵۶

از قبیل پروفایل لیپیدی، فشارخون و متابولیسم گلوکز را بهبود می‌بخشد (۹) اطلاعاتی وجود دارد که اولئوروپین اثر محافظت قلبی دارد Manna و همکاران طی مطالعه‌ای نشان داده‌اند که اولئوروپین آسیب میوکاردی ایجاد شده توسط ایسکمی را بهبود می‌بخشد (۱۰). افزایش استرس اکسیداتیو باعث افزایش سیتوکین‌های التهابی می‌گردد و با افزایش سیتوکین‌ها نیز تولید رادیکال‌های آزاد افزایش می‌یابد (۱۱). همچنین نشان داده شده است که اولئوروپین اثرات آنتی‌اکسیدان، ضدالتهابی و ضدسرطانی دارد و قادر است در شرایط invitro از اکسیداسیون لیپیدی جلوگیری نماید (۲،۱۲). براین اساس، هدف مطالعه حاضر تعیین اثرات آنتی‌اکسیدانی اولئوروپین بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان بافت قلب در رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می‌باشد.

روش بررسی

در این مطالعه تعداد ۳۰ سر رت نر نژاد ویستار با وزن 30 ± 190 گرم به صورت تصادفی انتخاب و به ۳ گروه ($n = 10$) تقسیم می‌شوند رتهای هر ۳ گروه در شرایط یکسان با دسترسی آزاد به آب و غذا و در سطحی با دمای 22 ± 2 و چرخه نوری $12/12$ روشنایی - تاریکی و به صورت پنج حیوان در هر قفس نگهداری خواهند شد.

گروه یک (کنترل): موش‌های صحرایی سالم دست‌خورده، دسترسی آزاد به آب و جیره پایه.

گروه دو (دیابتی): موش‌های صحرایی دیابتی شده. برای ایجاد دیابت حیوانات این گروه داروی استرپتوزوتوسین با دز $0.5\text{ml}/\text{kg}$ به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی دریافت کردند (۱۳). دسترسی آزاد به آب و جیره پایه.

گروه سه (تیمار): موش‌های صحرایی دیابتی شده به همراه تجویز عصاره اولئوروپین. حیوانات این گروه عصاره را با دز $60\text{ml}/\text{kg}$ به ازاء کیلوگرم وزن در هر روز از طریق گاواز به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند (۱۴). دسترسی آزاد به آب و جیره پایه. در پایان دوره مطالعه نمونه خون و بافت قلب از حیوانات گروه‌های مختلف اخذ و سطح سرمی قند خون شاخص

مقدمه

دیابت شایع‌ترین اختلال اندوکرینی است که مشخصه آن هیپرگلیسمی است. هر چند عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد به دیابت دارد اما مکانیسم آن هنوز ناشناخته است. امروزه محققین به طور ویژه‌ای بر نقش استرس اکسیداتیو متوجه شده‌اند (۱،۲) افزایش استرس اکسیداتیو و تغییر میزان آنتی‌اکسیدان‌ها نقش مهمی در پاتولوژی دیابت ایفا می‌کند (۳). در بیماری دیابت به دنبال ایجاد اختلال در متابولیسم کربوهیدرات‌ها، ساخت رادیکال‌های آزاد افزایش می‌یابد (۴). تولید بیش از حد رادیکال‌های آزاد باعث آسیب بیومولکول‌هایی مانند لیپیدها، پروتئین‌ها و DNA می‌شود. آسیب اکسیداتیو این مولکول‌ها به تدریج به بیماری‌های مزمن از قبیل دیابت، تصلب شرائین، پیری و سرطان منجر می‌شود. وضعیت آنتی‌اکسیدانی سلول تعیین کننده حساسیت سلول به آسیب اکسیداتیو است که معمولاً در پاسخ به استرس اکسیداتیو تغییر می‌کند (۲).

آسیب DNA و پراکسیداسیون چربی مرحله آغازی بسیاری از فرایندهای پاتولوژیکی است. اخیرا آنتی‌اکسیدان‌های فراوانی جهت محافظت از سلول‌ها در برابر این آسیب استفاده شده است (۲). دیابت باعث افزایش لیپید و لیپوپروتئین‌های خون از جمله تری‌گلیسیرید، LDL و کاهش HDL می‌گردد. عدم کنترل دیابت منجر به عوارض دیابت می‌شوند که عامل افزایش هزینه‌های پزشکی و کاهش کیفیت زندگی هستند. دیابت ملیتوس یکی از مهم‌ترین عواملی است که به طور وسیعی میزان ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی با منشاء آرتروواسکلروتیک را افزایش می‌دهند (۶،۵). امروزه استفاده از داروهای گیاهی به دلیل تاثیر مثبت، عوارض جانبی کمتر و هزینه نسبتاً پایین رو به گسترش است. بنابراین جستجو برای جایگزین‌های جدید ضد دیابت از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در دنیا اهمیت فراوانی پیدا کرده است (۷). اولئوروپین که یک ترکیب فنلی است به لحاظ فارماکولوژیکی فعال‌ترین بخش روغن زیتون می‌باشد (۸). روغن زیتون که به وفور در زیم مدیترانه‌ای استفاده می‌شود. فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی

اندازه گیری گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز واکنش اکسیداسیون گلوتاتیون (GSH) را توسط کومن هیدروپراکسید کاتالیز می نماید. در حضور آنزیم گلوتاتیون ردکتاز و NADPH، گلوتاتیون اکسید شده (GSSG) مجدداً به گلوتاتیون احیاء تبدیل می شود که این احیاء با اکسیداسیون همزمان به ADPH تبدیل می شود که این احیاء با اکسیداسیون همزمان NADP⁺ همراه است. در این واکنش کاهش جذب نوری در طول موج ۳۴۰ نانومتر اندازه گیری می شود. این فاکتور با استفاده از کیت آزمایشگاهی RANSEL (Randox انگلستان) اندازه گیری شد (۱۷).

اندازه گیری مالون دی آلدئید (MDA)

این روش بر پایه واکنش با تیو باریتوریک اسید (TBARS)، اندازه گیری جذب با روش اسپکترو فتو متري و مقاييسه با منحنی استاندارد می باشد (۱۷).

اندازه گیری ظرفیت قام آنتی اکسیدانی (TAC)

2, 2-Azino-di-{3-ethylbenzthiazoline sulfonate} با يك پراکسیداز و آب اکسیژنه مجاور می شود تا رادیکال های ABTS⁺ تولید نماید. اين ماده، رنگ آبی - سبز دارد که در طول موج ۶۰۰ نانومتر اندازه گیری می شود. آنتی اکسیدان های موجود در نمونه تولید اين رنگ را تضعيف می کنند. اين فاکتور با استفاده از کیت آزمایشگاهی Randox (Randox انگلستان) TotalAntioxidant (TotalAntioxidant Capacity) اندازه گیری شد (۱۸).

تجزیه و تحلیل آماری

در اين مطالعه داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 و روش آماري آناليز واريانس يك طرفه (ANOVA ورژن ۲۲) و آزمون های تعقيبي post hoc -Duncan مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی دار در اين مطالعه $P < 0.05$ در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی

پروپوزال اين تحقیق توسط کميته اخلاق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز تایید شده است (کد اخلاق IR.IAU.TABRIZ.REC.1396,104).

پراکسیداسیون چربی و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بافت قلب اندازه گیری شد.

طرز تهیه اولئوروپین

برای تهیه اولئوروپین، ابتدا دانه های میوه زیتون رقم کنسروی ماری برداشت شد. پس از هسته گیری و شستشوی كامل در آب مقطر قرار داده شد و بعد از ۲۴ ساعت، آب به دست آمده توسط لیوفیلیزاتور خشک گردید. با استفاده از HPLC پرپراتیو (preparative) نسبت به ریتنشن تایم (Retention Time) ۱۸ به صورت اتوماتیک جداسازی و خالص سازی شد. خلوص آن با استفاده از استاندارد اولئوروپین (سیگما آلدريش) مورد سنجش قرار گرفت. آماده کردن نمونه بافتی: پس از شستشوی نمونه بافتی با استفاده از بافر فسفات (PBS, PH=7.4) ۱ گرم از بافت قلب در ۵ میلی لیتر بافر سرد (1mM Tris-Hcl 50 mM , PH=7.5, EDTA 5mM, DTT) هموزنیزه شد. سپس محلول حاصل با سرعت ۱۰,۰۰۰ دور به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوز گردید. مایع رویی حاصل برای ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و شاخص پراکسیداسیون چربی بافت قلب مورد استفاده قرار گرفت (۱۵).

مطالعه بیوشیمیایی

اندازه گیری قند خون: مقادیر سرمی قند خون ناشتا هم در ابتدای مطالعه و هم در پایان دوره مطالعه با استفاده از دستگاه گلوکومتر (AccuChek, USA) اندازه گیری شد. برای اطمینان از القای دیابت ۷۲ ساعت پس از تزریق استریپتوز تو سین سطح سرمی گلوکز اندازه گیری شد و حیواناتی که قند خون بالای ۳۰۰ mg/dl داشتند، به عنوان مدل دیابت انتخاب شدند (۱۶).

اندازه گیری سوپراکسید دسموتاز (SOD)

در اين روش از گزانتین و گزانتین اکسیداز جهت تولید رادیکال های سوپراکسید استفاده می شود. اين رادیکال ها با 3-(4-nitrophenol)-5-phenyltetrazolium chloride I.N.T ۲-(iodophenyl)-2 واکنش می دهند و رنگ قرمز فور مازون تولید می کنند که در طول موج ۵۰۵ nm اندازه گیری می شود. اين فاکتور با استفاده از کیت آزمایشگاهی RANSOD (Randox انگلستان) اندازه گیری شد (۱۷).

نتایج

میانگین میزان MDA بین گروه دیابت با گروههای تیمار و کنترل نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم در گروه دیابت به طور معنی‌داری افزایش یافته است ($p < 0.001$). همچنان مشخص گردید بین گروه تیمار با گروه کنترل نیز اختلاف معنی‌داری وجود دارد ($p = 0.000$) (جدول ۲). همچنان مقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان SOD، GPX و TAC بین گروه دیابت با گروههای تیمار و کنترل نشان داد که میزان فعالیت این آنزیم‌ها در گروه دیابت به طور معنی‌داری کاهش یافته است ($p < 0.001$). همچنان مشخص گردید بین گروه تیمار با گروه کنترل نیز اختلاف معنی‌داری وجود دارد ($p < 0.001$). (جدول ۲).

بررسی آماری داده‌های مربوط به میانگین وزن حیوانات در آغاز مطالعه نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین حیوانات در گروههای متفاوت وجود ندارد. ($p = 0.178$) در حالی که در انتهای دوره وزن حیوانات دیابتی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی‌داری کاهش یافته است ($p < 0.001$). همچنان مشخص گردید بین گروه تیمار و دیابتی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ($p = 1$) (جدول ۱). آنالیز داده‌های مربوط به گلوکز خون نشان داد که میانگین گلوکز خون در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری افزایش یافته است ($p < 0.001$). همچنان بین گروه دیابتی با تیمار نیز تفاوت معنی‌داری وجود دارد ($p < 0.001$). مقایسه

جدول ۱: میانگین وزن، سطح گلوکز موش‌های صحرایی نر در گروههای مختلف مورد مطالعه (انحراف معیار ± میانگین).

گروه	فاکتور	کنترل	دیابتی شده	تیمار
وزن بدن (گرم) ابتدای دوره		۱۶۷/۷۵±۲/۴۸a	۱۷۳/۲۰±۲/۱۶a	۱۶۶/۶۰±۳/۰۵a
وزن بدن (گرم) انتهای دوره		۱۸۴/۳۵±۴/۱۱a	۱۴۳/۲۵±۳/۹۴b	۱۶۱/۴۰±۳/۰۴ab
گلوکز(میلی گرم/دسی لیتر)	ابتدای دوره	۸۷/۲۵±۲/۲۶a	۸۶/۲۵±۳/۲۴۵a	۸۴/۲۰±۳/۱۴a
گلوکز(میلی گرم/دسی لیتر) انتهای دوره		۸۲/۷۰±۳/۰۳c	۳۷۵/۷۵±۱۰/۲۷a	۲۱۴/۳۰±۹/۰۲b

حروف نامشابه در هر ردیف نشانگر اختلاف معنی‌دار بین گروه‌ها می‌باشد، که براساس آزمون آماری One Way ANOVA و post hoc - Duncan تعیین شدند.

جدول ۲: میانگین میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان بافت قلب موش‌های صحرایی نر در گروههای مختلف مورد مطالعه (انحراف معیار ± میانگین).

گروه	فاکتور	کنترل	دیابتی شده	تیمار
مالون دی‌الدید(نانومول/میلی گرم پروتئین)		۲/۱۳±۰/۰۲c	۳/۵۶±۰/۱۴a	۲/۶۳±۰/۰۷b
سوپراکسیدسموتاز(واحد/میلی گرم پروتئین)		۵/۶۹±۰/۰۸a	۴/۴۱±۰/۱۲c	۵/۰/۴±۰/۰۴b
گلوتاتیون پراکسیداز(واحد/میلی گرم پروتئین)		۴۸/۹۰±۰/۱۱a	۴۶/۹۱±۰/۲۵c	۴۷/۸۳±۰/۱۴b
ظرفیت تمام آنتی اکسیدانی(میلی مول/میلی گرم)		۳/۳۴±۰/۰۵a	۲/۵۲±۰/۰۷c	۲/۹۶±۰/۰۶b

حروف نامشابه در هر ردیف نشانگر اختلاف معنی‌دار بین گروه‌ها می‌باشد، که براساس آزمون آماری One Way ANOVA و post hoc - Duncan تعیین شدند.

پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش معنی‌دار میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان SOD و GPX و نیز TAC در مقایسه با گروه کنترل شد. به خوبی شناخته شده است که استرپتوزوسین با تخریب سلول‌های بتا موجب افزایش قند خون می‌شود. این نتایج با پژوهش‌های قبلی مطابقت دارد (۱۹، ۲۰، ۲۱). در

بحث

یافته‌های این پژوهش نشان داد القای دیابت با استرپتوزووسین موجب افزایش معنی‌دار قند خون و کاهش وزن در حیوانات گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل گردید. علاوه بر این، دیابت باعث افزایش معنی‌دار میزان شاخص

اکسیداسیون لیپیدی کاهش می‌یابد (۱۲). همچنین افزایش گلیکوزیلاسیون غیرآنژیمی به دنبال هیپرگلیسمی شاید دلیل احتمالی عوارض عروقی در بیماری دیابت باشد (۲۳). S. Jemaei.H and Sayadi طی مطالعه‌ای اثرات اولئوروپین بر هیستوپاتولوژی و جنبه‌های اکسیداتیو دیابت را در بافت قلب گزارش کردند، نشان داده‌اند که همراه با افزایش میزان شاخص پراکسیداسیون تغییرات بافتی نیز در رت‌های دیابتی شده مشاهده می‌گردد (۶). MDA فراورده اصلی پراکسیداسیون است و افزایش میزان MDA شاخص مهم پراکسیداسیون چربی است (۲).

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان MDA بافت قلب در رت‌های گروه دیابتی به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. اما، اولئوروپین توانسته است شاخص پراکسیداسیون را در رت‌های گروه تیمار به‌طور معنی‌داری در مقایسه با گروه دیابتی کاهش دهد. این یافته‌ها با نتایج S. Jemaei.H and Sayadi طبیعت دارد (۶). کاهش شاخص پراکسیداسیون چربی در گروه تیمار را می‌توان به نقش آنتی‌اکسیدانی اولئوروپین نسبت داد. این اثر را می‌توان به تجزیه رادیکال‌های آزاد با خنثی کردن گونه‌های واکنشی اکسیژن وبا به دام انداختن رادیکال‌ها قبل از رسیدن به سلول‌های هدف شان نسبت داد (۲). همچنین نتایج این پژوهش مشخص نمود که در رت‌های دیابتی شده میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان SOD,GPX و TAC در بافت قلب در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش یافته است. گزارش شده است که دیابت فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان را پائین می‌آورد که احتمالاً به‌دلیل افزایش درگیری آن‌ها در مقابله با استرس اکسیداتیو بیش از حد در موش‌های صحرابی دیابتی می‌باشد (۲۴). در حالی که تجویز خوراکی اولئوروپین با دز ۶۰ میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در گروه تیمار باعث افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان SOD ،GPX ،TAC نسبت به گروه دیابتی شده است. این نتایج موافق یافته‌هایی است که نشان می‌دهند هیپرگلیسمی با استرس اکسیداتیو همراه است (۶).

حالی که تیمار حیوانات دیابتی با اولئوروپین موجب کاهش معنی‌دار غلظت سرمی گلوكز نسبت به گروه دیابتی گردید. این یافته با نتایج مطالعات قبلی سازگاری دارد. در این مطالعات نشان داده شده است که تیمار موش‌های صحرابی دیابتی شده با استرپتوزوسمین با ترکیبات آنتی‌اکسیدان به‌طور معنی‌داری قند خون حیوانات را در مقایسه با گروه دیابتی کاهش داده است (۲۰، ۲۱). مشخص شده است که استرس اکسیداتیو موجب کاهش سنتز و ترشح انسولین می‌گردد (۶). بنابراین، اثر هیپوگلیسمیک اولئوروپین، شاید به‌دلیل اثرات آنتی‌اکسیدانی آن در محافظت از سلول‌های بتای جزاير لانگرهانس و افزایش ترشح انسولین باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که وزن حیوانات گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش یافته است. کاهش وزن در حیوانات دیابتی در مقایسه با گروه کنترل نشان می‌دهد که از دست دادن وزن نتیجه تجزیه بیش از حد پروتئین‌های بافتی است و تجزیه چربی‌ها به‌دلیل عدم دسترسی به کربوهیدرات‌ها به عنوان منبع انرژی باشد (۲۰، ۲۲). احمدوند و همکاران در سال ۲۰۱۶ نشان داده‌اند که اولئوروپین می‌تواند با بهبود فاکتورهایی از قبیل پروفایل چربی و شاخص آتروواسکلروزیس در بیماران مبتلا به نفروتوكسی خطر مرگ و میر قلبی- عروقی را کاهش دهد. همچنین، مطالعات قبلی احمدوند و همکاران اثرات محافظتی اولئوروپین بر استرس اکسیداتیو ناشی از آسیب طناب نخاعی را نیز نشان داده است (۱۳، ۲۳). اخیراً شواهدی مبنی بر فراوانی شیوع اختلالات و آسیب‌های قلبی در بیماران دیابتی گزارش شده است. در حقیقت دیابت یک فاکتور خطر مستقلی برای نارسایی قلبی محسوب می‌شود (۶).

مطالعات چندی گزارش کرده‌اند که اولئوروپین اثرات آنتی‌اکسیدانی دارد. نکوئیان و همکاران در سال ۲۰۱۴ گزارش کرده‌اند که اولئوروپین اثرات محافظت قلبی دارد که شاید بخشی از این اثرات ناشی از فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن باشد (۱۴). در بیماری دیابت آنتی‌اکسیدان‌ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان به‌دلیل گلیکوزیلاسیون یا افزایش فراورده‌های

سپاس‌گزاری

بدین وسیله نویسنندگان مقاله از کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی تشكر و قدردانی می‌نمایند. هزینه این تحقیق که مستخرج از پایان‌نامه دانشجویی است توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دانشجو تامین شده است.

تعارض در منافع: وجود ندارد.

محدودیت‌های ما در این مطالعه بررسی نشدن تغییرات پاتولوژیکی بافت قلب بود.

نتیجه گیری

به‌طور خلاصه، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اولتوروپین قادر است از افزایش قند خون در موش‌های صحرایی دیابتی شده جلوگیری نماید و سیستم آنتی‌اکسیدانی بافت قلب را تقویت کند. هرچند برای مشخص شدن مکانیسم اثر و تعمیم نتایج در انسان به مطالعات بیشتری نیاز است.

References:

- 1-Risbridger G, Wang H, Young P, Kurita T, Wang YZ, Lubahn D, et al. *Evidences That Epithelial And Mesenchymal Estrogen Receptor-Alpha Mediates Effects Of Estrogen On Prostatic Epithelium.* Dev Biol 2001; 229(2): 432-42.
- 2- Karabag-Coban F, Hazman O, Bozkurt MF, Ince S. *Antioxidant Status And Anti-Inflammatory Effects Of Oleuropein In Streptozotocin-Induced Diabetic Nephropathy In Rats.* Eur J Med Plants 2017; 18(2): 1-10.
- 3-Baynes JW, Thorpe SR. *Role Of Oxidative Stress In Diabetic Complications: A New Perspective On An Old Paradigm.* Diabetes 1999; 48(1): 1-9.
- 4-Meyer K, Deutscher J, Anil M, Berthold A, Bartsch G, Kiess W. *Serum Androgen Levels In Adolescents With Type I Diabetes: Relationship To Pubertal Stage And Metabolic Control.* J Endocrinol Invest 2000; 23: 362-8.
- 5-Kumar S, Malhotra R, Kumar D. *Antidiabetic And Free Radical Scavenging Potential Of Euphorbia Hirta Flower Extract.* Indian J Pharm Sci 2010; 72(4): 533-7.
- 6-Jemai H, Sayadi S. *Heart Histopathology And Oxidative Features In Diabetic Rats And Protective Effects Of Oleuropein.* Advances in Bioscience and Biotechnology 2015; 6(6): 383-9.
- 7-Anup KM, Smriti T, Zabeer A, Ram K S. *Antidiabetic and antihyperlipidemic effect of Euphorbia hirta in Streptozotocin induced diabetic rats.* Scholars Research Library 2012; 4 (2):703-7.
- 8-Omar SH. *Oleuropein in olive and its pharmacological effects.* Sci Pharm 2010; 78(2):133-54.
- 9-Al Jamal AR, Ibrahim A .*Effects Of Olive Oil On Lipid Profiles And Blood Glucose In Type2 Diabetic Patients.* Int J Diabetes Metab 2011; 19:19-22.
- 10- Manna C, Migliardi V, Golino P, Scognamiglio A, Galletti P, Chiariello M,et al. *Oleuropein Prevents Oxidative Myocardial Injury By Ischemia And Reperfusion.* J Nutr Biochem 2004; 15(8): 461-6.

- 11-** donate-correa J, Martín-Núñez E, Muros-de-Fuentes M, Mora-Fernandez C, Navarro-González JF. *Inflammatory Cytokines In Diabetic Nephropathy.* J Diabetes Res 2015; 2015.
- 12-** Elmarakby AA, Sullivan JC. *Relationship Between Oxidative Stress And Inflammatory Cytokines In Diabetic Nephropathy.* Cardiovasc Ther 2012; 30(1): 49-59.
- 13-** Ahmadvand H, Noori A, Dehnoo MG, Bagheri S, Cheraghi R. *Hypoglycemic, Hypolipidemic And Antiatherogenic Effects Of Oleuropein In Alloxan-Induced Type 1 Diabetic Rats.* Asian Pac J Trop Dis 2014; 4: S421-S425.
- 14-** Sangi SM A, Sulaiman MI, El-Wahab MF, Ahmedani EI, Ali SS. *Antihyperglycemic Effect Of Thymoquinone And Oleuropein, On Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus In Experimental Animals.* Pharmacogn Mag 2015; 11(2): S251-57.
- 15-** Naderi R, Mohaddes G, Mohammadi M, GhaznaviR, Ghayasi R, Vatankhah AM. Voluntary Exercise Protects Heart From Oxidative Stress In Diabetic Rats. Adv Pharm Bull 2015; 5(2): 231-6.
- 16-** Nekooeian AA, Khalili A, Khosravi M. *Oleuropein Offers Cardioprotection In Rats With Simultaneous Type 2 Diabetes And Renal Hypertension.* Indian J Pharmacol 2014; 46(4): 398-403.
- 17-** Somi MH, Hajipour B, Asl NA, Estakhri R, Azar AN, Zade MN, et al. *Pioglitazone Attenuates Ischemia/Reperfusion-Induced Liver Injury In Rats.* Transplant Proc 2009; 41(10): 4105-9.
- 18-** Kurcer Z, Oguz E, Ozbilge H, Baba F, Aksoy N, Celik H, et al. *Melatonin Protects From Ischemia/Reperfusion-Induced Renal Injury In Rats: This Effect Is Not Mediated By Proinflammatory Cytokines.* J Pineal Res 2007; 43(2): 172-8.
- 19-** Nasirzadeh MR, Nourazar A, Khalili-Moghadam S, Mohammadiani M. *Effect Of Alcoholic Extract Ofeuphorbia Cyparissias On The Brain Antioxidant Enzymes In Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats.* Feyz 2014; 18(3): 194-200. [Persian]
- 20-** Alimohammadi S, Hobbenaghi R, Javanbakht J, Kheradmand D, Mortezaee R, Tavakoli M, et al. *Protective And Antidiabetic Effects Of Extract From Nigella Sativa On Blood Glucose Concentrations Against Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetic In Rats: An Experimental Study With Histopathological Evaluation.* Diagn Pathol 2013; 8:137.
- 21-** Gandhi GR, Sasikumar P. *Antidiabetic Effect Of Merremia Emarginata Burm. F. In Streptozotocin Induced Diabetic Rats.* Asian Pac J Trop Biomed 2012; 2(4): 281-6.
- 22-** Afaf DA, Abou Salem ME, A Salaam. *The potential effect of garlic extract against complication accompanied with induced diabetes in rats.* Benha Veterinary Medical J 2017; 32(1): 99- 103.
- 23-** Ahmadvand H , Bagheri S , Tamjidi-Poor A , Cheraghi M , Azadpour M , Ezatpour B, et al. *Biochemical Effects Of Oleuropein In Gentamicin-Induced Nephrotoxicity In Rats.* ARYA Atheroscler 2015; 12(2): 87-93.

- 24- Kondeti VK, Badri KR, Maddirala DR, Thur SK, Fatima SS, Kasetti RB, et al. *Effect Of Pterocarpus Santalinus Bark, On Blood Glucose, Serum Lipids, And Plasma Insulin And Hepatic*

Carbohydrate Metabolic Enzymes In Streptozotocin Induced Diabetic Rats. Food Chem Toxicol 2010; 48(5): 1281-7.

Oleuropein cardioprotection effect against oxidative stress in Streptozotocin-induced diabetic male rats

Shahin Kashefimehr¹, Mohammadreza Nasirzadeh^{*2}

Original Article

Introduction: Diabetes is the most common endocrine disorder characterized by hyperglycemia. Increasing the oxidative stress and changing the amount of antioxidants play important roles in pathogenesis of diabetes. Nowadays to control diabetes and its complications, the use of herbal drugs is considered widely. In this study, we investigated the effect of oleuropein on antioxidant enzymes activity of heart tissue in Streptozotocin induced diabetic male rats.

Methods: In this study, 30 adult male Wistar rats with a weight range of 190 ± 30 gr were randomly divided into 3 groups($n=10$ in each group): 1) control group or intact rats, 2) diabetic rats, and 3) treatment group, which received 60 mg/kg oleuropein for 30 days by gastric gavage. Diabetes was induced by injection of streptozotocin (60 mg/kg) intraperitoneally. At the end of the treatment, serum concentrations of blood glucose and heart tissue antioxidant enzymes activity were determined. The obtained data were analyzed using SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18, statistical method of one way variance analysis and post hoc-Duncan test .

Results: The results showed that serum concentration of glucose decrease significantly in treatment group compared with the diabetic group ($p=0.000$). Also, TAC, SOD and GPX activity increased significantly in the treatment group compared with the diabetic group ($p=0.000$).

Conclusion: This study showed that oleuropein can prevent blood glucose increasing and reinforce antioxidant system of cardiac tissue in diabetic rats.

Keywords: Oleuropein, Antioxidant activity, Diabetes, Heart, Rat.

Citation: Kashefimehr SH, Nasirzadeh MR. **Oleuropein cardioprotection effect against oxidative stress in Streptozotocin-induced diabetic male rats.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2019; 27(3): 1372-80

¹Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

²Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

*Corresponding author: Tel: 09141015108, email: mr.nasirzadeh@yahoo.com