

## بررسی میزان تداوم و علل مرتبط با قطع روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان یزد

نرجس حسینی<sup>۱</sup>، دکتر سیدسعید مظلومی<sup>۲\*</sup>، دکتر حسین فلاح زاده<sup>۳</sup>، دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد<sup>۴</sup>

### چکیده

**مقدمه:** از سنین بلوغ تا سنین یائسگی، زنان به صورت مداوم با نگرانی‌هایی در ارتباط با بارداری و حاملگی‌های ناخواسته مواجهند که تنها راه پیش روی آنها، اجتناب از تماس جنسی و پیشگیری از بارداری می‌باشد. با توجه به اهمیت بهداشت باروری لازم است زوجین روش‌هایی را به کار ببرند که با وجود آمیزش جنسی، لقاح و آبستنی انجام نگیرد. کنترل مؤثر باروری، ضمن تأمین سلامت مادر و کودک و کنترل رشد بی‌رویه جمعیت برای توانا سازی زنان بسیار اساسی و حیاتی است. در این راستا با توجه به اهمیت قطع روش‌های پیشگیری از بارداری و عوارض حاصله از آن، بر آن شدیم که میزان تداوم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری (IUD, OCP)، کاندوم و آمپول) و علل قطع این روش‌ها را با توجه به نظر خود مراجعین تعیین و بررسی نماییم.

**روش بررسی:** این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بوده است. از بین مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد ۶ مرکز از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند و اطلاعات زنان متأهل ۱۵-۴۹ ساله‌ی مراجعه کننده به این مراکز که از روش‌های پیشگیری از بارداری (IUD, OCP)، کاندوم و آمپول) استفاده می‌نمودند، از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش آماری کاپلان مایر و آزمون آنالیز واریانس استفاده شد.

**نتایج:** بیشترین میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری (IUD, OCP، کاندوم و آمپول) در زنان، در گروه سنی ۲۵-۳۴ سال بوده است (۵۷٪)، میانگین مدت استفاده از چهار روش فوق به روش کاپلان مایر ۲۷/۹۸ ماه و میانه آن ۲۴ ماه بود نتایج نشان داد، که در مجموع ۸۶/۳٪ زنان بعد از ۶ ماه و ۶۲/۵٪ بعد از ۱۸ ماه و ۳۹/۹٪ بعد از ۳۰ ماه و تنها ۳/۷٪ زنان تا ۳۶ ماه از چهار روش مذکور استفاده نموده بودند. همچنین نتایج بیانگر این است که میانگین طول مدت استفاده قرص‌ها کمتر از همه روش‌ها بود (P=0.048)، از عوامل مؤثر بر قطع روش‌ها در مورد قرص‌ها، بیماری (۱۵/۶ درصد) در مورد IUD، خونریزی (۲۷ درصد) در مورد کاندوم، حاملگی ناخواسته (۲۱/۸ درصد) و در مورد آمپول دپوپروورآ نیز بیماری (۷۵ درصد) بوده است.

**نتیجه‌گیری:** با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می‌گردد علاوه بر آموزش زنان، مشاوره انگیزشی کامل در خصوص روش‌های پیشگیری از بارداری در هنگام تشکیل پرونده تنظیم خانواده صورت بگیرد این آموزش و مشاوره در درجه اول باید برای زنانی که متقاضی به کارگیری قرص‌های پیشگیری از بارداری هستند به کار گرفته شود.

### واژه‌های کلیدی: روش‌های پیشگیری از بارداری، میزان تداوم، علل قطع روش

#### مقدمه

با توجه به جوان بودن جمعیت کشورمان، باید همواره نگران افزایش جمعیت کشور به خصوص در سالهای آینده باشیم. از عوارض رشد جمعیت بی‌کاری، فقر، سوء تغذیه، اضطراب و شیوع انواع بیماری‌ها می‌باشد. (حاملگی‌های ناخواسته یکی از معضلات بهداشتی و اجتماعی در زمینه برنامه‌های تنظیم خانواده

۱- کارشناس بهداشت عمومی - دانشکده بهداشت

\* ۲- نویسنده مسئول: دانشیار گروه مبارزه با بیماریها - دانشکده بهداشت  
تلفن- ۰۳۵۱-۶۲۴۰۶۹۱، نمابر

Email: Mazloomi-S@yahoo.com

۳- استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی - دانشکده بهداشت

۴- استادیار گروه مبارزه با بیماریها - دانشکده بهداشت

۱، ۲، ۳، ۴- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد  
تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۵/۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۱۱/۱۱

مطالعه‌ای که توسط نقیبی در مورد بررسی طول مدت استفاده علل قطع و عوارض ناشی از مصرف قرص‌های خوراکی (OCP) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اسلام شهر در سال ۱۳۸۱ انجام گرفت. ۳۰/۷ درصد نمونه‌ها طول مدت استفاده از قرص در آنها ۳-۰ ماه بود. در ۳۰ درصد نمونه‌ها شایع‌ترین عوارض و شکایت ناشی از مصرف قرص ناراحتی عصبی در ۲۱/۴ درصد از نمونه‌ها، ناراحتی عصبی علت قطع قرص بوده است.<sup>(۶)</sup>

در گزارش هابر و همکاران (۲۰۰۶) مهمترین علت قطع قرص را عوارض پزشکی عنوان نموده بود.<sup>(۷)</sup>

مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۴ توسط «فرمین» با عنوان روش‌های پیشگیری از بارداری هورمونی غیرروزانه، توجه در انتخاب و مشاوره با بیمار انجام گرفت. بسیاری از زنان در گروه‌های جمعیتی از روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی غیرروزانه استفاده نموده‌اند و راحتی و توانایی آن را درک کرده‌اند. بالاترین میزان کارآیی در نمونه‌ای که استفاده کرده بودند از دپوپرورآ بوده است.<sup>(۸)</sup> با عنایت به جوانی جمعیت و درصد بالای حاملگی‌های ناخواسته و در نتیجه عوارض رشد بی رویه جمعیت، لازم دانستیم مطالعه‌ای در زمینه نحوه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری (کاندوم، آمپول، OCP و IUD) و همچنین تعیین عواملی که باعث قطع روش‌های مورد مصرف در شهر یزد می‌گردد را داشته باشیم. تا با به دست آوردن تصویر دقیق تری از علل مرتبط با قطع روش‌های پیشگیری از بارداری پیشنهادات متناسبی در خصوص ارتقاء استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری ارائه نماییم.

### روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بوده است، جمعیت مورد مطالعه زنان ۴۹-۱۵ ساله همسر دار بوده‌اند که از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۲ یکی از چهار روش پیشگیری از بارداری (IUD، OCP، کاندوم و آمپول) استفاده نموده و بنا به دلایلی روش مورد استفاده را قطع کرده بودند. تعداد نمونه ۵۰۰ نفر محاسبه شد اما تعدادی از پرسشنامه‌ها ناقص تکمیل شده بود و در کل ۴۶۴ نفر از زنان، پرسشنامه را کامل تکمیل نموده بودند. استفاده کنندگان از روش‌های پیشگیری از بارداری به

می‌باشد) براساس اطلاعات به دست آمده در سال ۱۳۷۹، ۲۴/۸ درصد حاملگی‌های ناخواسته در مناطق شهری ایران گزارش شده است<sup>(۱)</sup> بنابراین برای حصول به اهداف تنظیم خانواده لازم است مجموعه کاملی از روش‌های مؤثر و مطمئن جلوگیری از بارداری در دسترس زوجین قرار گیرد تا با برنامه ریزی و انتخابی آگاهانه و برخوردار از اطلاعات کافی فاصله گذاری مناسب را بین فرزندانیشان و تعداد دلخواه فرزند داشته باشند.

براساس بررسی‌های انجام شده در کل کشور (روستاها)، پوشش روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری در سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۲ به میزان ۵۱٪ افزایش یافته است. (از ۴۳/۷ به ۶۶/۲) ولی تغییر این پوشش نیز از سال ۱۳۷۸ به بعد بسیار کند و ناچیز بوده است (۶۴/۵ در سال ۷۸ به ۶۶/۱ در سال ۸۲) علت توقف شاخص‌ها و کند شدن روند آن از تب و تاب افتادن برنامه‌های کاهش موالید، تبلیغات، آموزشها می باشد.<sup>(۲)</sup>

سالانه تعداد ۸ تا ۳۰ میلیون حاملگی به دلیل شکست بعضی از روشها یا عدم استفاده مستمر و ناصحیح از وسایل پیشگیری از حاملگی اتفاق می افتد.<sup>(۳)</sup> مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۵ توسط محمدزاده و همکاران با عنوان علل قطع استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری در زنان روستایی استان اصفهان انجام گرفت، میانگین طول مدت استفاده از IUD با اختلاف معنی دار (P=۰/۰۰۱) بیش از انواع دیگر روش‌ها بود. عارضه جسمی یا روانی حدود یک چهارم علل منجر به قطع روش را تشکیل می‌داد. ۹/۸٪ از علل قطع مربوط به حاملگی ناخواسته گزارش شده است.<sup>(۴)</sup>

مطالعه‌ای که در پایان سال ۱۳۷۹ در شهر زاهدان توسط رخشانی و همکاران با عنوان بررسی میزان تداوم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و علل قطع آن انجام گرفت، متداول ترین روش مورد استفاده OCP با ۷۱/۲٪ و پس از آن آمپول ۱۲/۹٪ بود. با استفاده از روش کاپلان مایر بیشترین تداوم طی سال اول مربوط به قرص LD (۹۲٪) و پس از آن نورپلانت (۸۶٪) و IUD (۸۲٪) بود. در پایان سال سوم تداوم استفاده LD (۷۰٪)، آمپول (۴۴٪)، IUD (۶۰٪) بود. بیشترین علت قطع OCP و آمپول تغییر روش و بیشترین علت قطع IUD عوارض جانبی بود.<sup>(۵)</sup>

روش‌های پیشگیری برحسب تحصیلات زنان و تعداد فرزند به ترتیب با  $(P=0.002)$ ،  $(P=0/006)$  از لحاظ آماری معنی دار می‌باشد میانگین طول مدت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری برحسب روش مورد استفاده در استفاده کنندگان از IUD،  $11/66 \pm 26/34$  ماه و در استفاده کنندگان از کاندوم  $7/37 \pm 23/11$  ماه و در مورد قرص‌ها میانگین طول مدت استفاده  $12/46 \pm 21/61$  ماه بود (جدول ۲).

علل قطع روش استفاده از قرص به شرح زیر بود: ۱۵/۶ درصد به علت بیماری، ۷/۲ درصد به علت حاملگی ناخواسته، ۴/۸ درصد به علت چاقی و ۹/۶ درصد خونریزی و لکه بینی روش مورد استفاده را ترک کرده بودند. در استفاده کنندگان از روش IUD شایع‌ترین علت قطع  $(30/2)$  درصد خواهان فرزند دیگری بودند. ۲۷ درصد به علت خونریزی، ۱۷/۵ درصد به دستور پزشک، ۴/۷ درصد حاملگی ناخواسته، ۱۱ درصد خروج IUD و یا تمام شدن مهلت آن را علت قطع روش بیان نمودند.

در استفاده کنندگان از کاندوم ۴۵/۵ درصد تمایل به داشتن فرزند، ۲۱/۸ درصد حاملگی ناخواسته و ۱۱/۹ درصد مخالفت همسر و ۸ درصد درخواست روش طولانی مدت مثل IUD و یا استفاده از روش‌های دائمی را علت قطع مصرف عنوان نموده‌اند. در مصرف کنندگان آمپول دپوپروورا ۷۵ درصد به علت بیماری و ۲۵ درصد به علت کمبود آمپول، قطع روش داشتند (جدول ۳).

میزان تداوم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری (OCP، IUD، کاندوم و آمپول) براساس روش کاپلان مایر ۸۶/۳ درصد به مدت ۶ ماه و ۷۲/۸ درصد به مدت ۱۲ ماه و ۶۲/۵ درصد تا ۱۸ ماه و ۴۷/۹ درصد تا ۲۴ ماه و ۳۹/۹ درصد به مدت ۳۰ ماه و ۳۷ درصد تا ۳۶ ماه (سه سال) از وسایل مذکور استفاده نموده‌اند (جدول ۴).

طور مجزا: OCP (۳۰/۱۷)٪، IUD (۲۰/۶۸)٪، کاندوم (۴۶/۹۸)٪ و ۲/۱۵٪ از روش آمپول استفاده کرده بودند. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای بوده است بدین نحو که ابتدا ۶ مرکز بهداشتی درمانی از بین مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انتخاب گردید و سپس از طریق سرشماری از بین مراجعه کنندگان به این ۶ مرکز پرسشنامه‌ها توسط پرسشگران تکمیل گردید.

ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است این پرسشنامه تعداد ۱۲ سؤال داشته است که روایی آن از طریق نظر سنجی از متخصصین تأمین شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ تعیین شده است.

اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آنالیز واریانس و کاپلان مایر تجزیه و تحلیل گردید.

## نتایج

۱۹/۹ درصد زنان استفاده کننده از روش‌های پیشگیری از بارداری در گروه سنی ۲۴-۱۵ سال، ۵۷ درصد در گروه سنی ۳۴-۲۵ سال، ۱۲ درصد زنان در گروه سنی ۴۴-۳۵ سال و ۱/۷ درصد در گروه سنی ۴۹-۴۵ سال بودند.

میانگین مدت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری (IUD، OCP، کاندوم و آمپول) در زنان ۲۴-۱۵ سال  $11/63 \pm 18/68$  و در گروه سنی ۳۴-۲۵ سال،  $11/81 \pm 22/67$  ماه و در گروه سنی ۴۴-۳۵ سال،  $10/49 \pm 29/6$  ماه بود که با افزایش سن مدت زمان استفاده از روش‌ها نیز افزایش داشت که از نظر آماری  $(P=0.001)$  معنی دار می‌باشد (جدول ۱).

میانگین استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری بر حسب شغل زن و شغل همسر و تحصیلات همسر به ترتیب با  $(P=0.41)$  و  $(P=0/85)$  و  $(P=0.12)$  که از لحاظ آماری معنی دار نبوده، همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میانگین مدت استفاده از

جدول ۱: میانگین و میانه طول مدت استفاده در گروه‌های سنی زنان در جامعه مورد بررسی

طول مدت استفاده گروه‌های سنی	میانگین (ماه)	میانه	تعداد	انحراف معیار
۱۵-۲۴	۱۸/۶۸	۱۵/۵	۹۲	۱۱/۶۳
۲۵-۳۴	۲۲/۶۷	۲۴	۲۶۱	۱۱/۸۱
۳۵-۴۴	۲۹/۶	۳۶	۹۹	۱۰/۴۹
۴۵-۴۹	۳۲/۱۲	۳۶	۸	۱۰/۹۶
جمع	۲۳/۵۳	۲۴	۴۶۰	۱۲/۰۶

P.value=0.0001

جدول ۲: میانگین و میانه طول مدت استفاده براساس روشهای پیشگیری از بارداری در جامعه مورد بررسی

طول مدت استفاده روش مورد استفاده	میانگین (ماه)	میانه	تعداد	انحراف معیار
OCP	۲۱/۶۱	۲۴	۱۴۰	۱۲/۴۶
IUD	۲۶/۳۴	۳۲	۹۶	۱۱/۶۶
کاندوم	۲۳/۴۶	۲۴	۲۱۸	۱۲
آپول	۲۳/۱۱	۲۴	۱۰	۷/۳۷
جمع	۲۳/۴۹	۲۴	۴۶۴	۱۲/۰۸

P.value = 0.046

جدول ۳: توزیع فراوانی علل قطع روشهای پیشگیری از بارداری (OCP, IUD, کاندوم و آپول دپو) برحسب استفاده از این روشها در جامعه مورد بررسی

روش مورد استفاده علل قطع روش	قرص		IUD		کاندوم		آپول		جمع
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد درصد
بیماری	۱۳	۱۵/۶	۵	۸	۱	۱	۳	۷۵	۲۲ ۸/۸
حاملگی ناخواسته	۶	۷/۲	۳	۴/۸	۲۲	۲۱/۸			۳۱ ۱۲/۴
چاقی	۴	۴/۸							۴ ۱/۶
خونریزی و لکه بینی	۸	۹/۶	۱۷	۲۷	۱	۱			۲۶ ۱۰/۴
مخالفت همسر	۲	۲/۴	۱	۱/۶	۱۲	۱۱/۹			۱۵ ۶
دستور پزشکی	۱۲	۱۴/۵	۱۱	۱۷/۵					۲۳ ۹/۲
خواستار فرزند	۳۴	۴۱	۱۹	۳۰/۲	۴۶	۴۵/۵			۹۹ ۳۹/۴
سایر موارد	۱	۱/۲			۸	۸	۱	۲۵	۱۰ ۴
درخواست IUP یا روش دائمی	۳	۳/۶			۸	۸			۱۱ ۴/۴
استفاده از قرص					۳	۳			۳ ۱/۲
خروج IUD و یا تمام شدن مهلت آن	۷	۱۱/۱							۷ ۲/۸
جمع	۸۳	۱۰۰	۶۳	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۰	۴	۱۰۰	۲۵۱ ۱۰۰

جدول ۴: درصد نگهداری وسایل پیشگیری از بارداری در ماههای مختلف با استفاده از روش کاپلان مایر

مدت استفاده به ماه	درصد
۶ ماه	۸۶/۳
۱۲ ماه	۷۲/۷
۱۸ ماه	۶۲/۵
۲۴ ماه	۴۷/۹
۳۰ ماه	۳۹/۹
۳۶ ماه	۳۷

## بحث

یافته‌های این پژوهش از نظر توزیع سنی نشان داد که اکثر زنان استفاده کننده از روش‌های پیشگیری از بارداری (۵۷ درصد) در گروه سنی ۲۵-۳۴ بودند. با افزایش سن زنان، طول مدت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری افزایش یافته بود،

که از نظر آماری معنی دار می‌باشد ( $P=0.0001$ ). همچنین زوجینی که دارای ۴ فرزند و بیشتر بودند میانگین طول مدت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در آنها طولانی‌تر بود که از نظر آماری ( $P=۰/۰۰۲$ ) معنی دار می‌باشد. در مطالعه‌ای مشابه میانگین سن زنان مورد بررسی  $۲۷ \pm ۶$  و میانگین تعداد فرزند  $۲ \pm ۲/۸$  بود<sup>(۵)</sup>.

در مطالعه‌ی مشابه دیگری میانگین مدت استفاده از IUD با اختلاف معنی دار ( $P=۰/۰۰۱$ ) بیش از میانگین مدت استفاده از روش‌های دیگر بوده است<sup>(۴)</sup>.

میانگین طول مدت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری براساس روش کاپلان مایر  $۲۷/۹۸$  ماه و میانه آن ۲۴ ماه بود. علت قطع در مصرف کنندگان قرص،  $۱۵/۶$  درصد به علت بیماری

مربوط به قرص LD (۹۲٪)، IUD (۸۲٪) بود. در پایان سال سوم تداوم استفاده LD (۷۰٪)، آمپول (۴۴٪) و IUD (۶۰٪) بوده است<sup>(۵)</sup>. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که میزان تداوم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری نسبتاً با درصد بالایی ادامه می‌یابد و بیشترین میزان استفاده در گروه سنی ۲۵-۳۴ سال (۵۱/۷ درصد) می‌باشد و در پایان سال اول میزان تداوم استفاده از چهار روش پیشگیری از بارداری ۷۲/۷٪ بوده است. مطالعات مشابه نیز بیانگر این است که روش IUD بیشتر از سایر روش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است<sup>(۱۰،۱۱)</sup>.

در مورد علل قطع روش‌ها به طور کلی ۲۵۱ نفر در طول سه سال قطع روش مورد مصرف را داشته‌اند که بالاترین تعداد مربوط به کاندوم ۱۰۱ نفر، در مرتبه بعدی OCP، ۸۳ نفر و IUD ۶۳ نفر و آمپول ۴ نفر بود. گرچه خدمات تنظیم خانواده و روش‌های پیشگیری از بارداری به وفور و به طور رایگان در دسترس خانواده‌ها می‌باشد ولی به نظر می‌رسد آموزش و مشاوره کامل با فرد، قبل از شروع هر روش بتواند برنامه‌های تنظیم خانواده را ارتقا بخشد و گامی مؤثر در جهت کنترل مولید و جلوگیری از بروز حاملگی ناخواسته باشد. توصیه می‌شود مسئولین برای تداوم استفاده صحیح از روش‌ها از پرسنل آموزش دیده کمک بگیرند و سعی شود با افراد مشاوره کامل انجام گیرد.

### سپاسگزاری

بدینوسیله از شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی به خاطر تصویب و حمایت مالی از طرح و از همکارانی که در جمع‌آوری اطلاعات همکاری صمیمانه داشته و از سرکار خانم کیوان که در تایپ مقاله همکاری نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود.

۱- *سیمای سلامت در روستائینیان ایران*، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت و مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، بهار سال ۱۳۸۴، شماره دوم، صفحه ۶۲.  
 ۲- صائبی پور سهیلا، سیشکار سیستانی ناصر، *سقط‌های غیرقانونی ناشی از حاملگی‌های ناخواسته*، فصلنامه بهروز، تابستان ۱۳۸۳، سال

۷/۲ درصد به علت حاملگی ناخواسته و ۹/۶ درصد خونریزی و لکه بینی و ۴/۸ درصد به علت چاقی بوده است، که در مطالعه‌ای که در بخش اپیدمیولوژی دانشگاه آمریکا توسط هابر انجام گرفته مهمترین علت قطع مصرف قرص، عوارض پزشکی بوده است<sup>(۷)</sup>.  
 در مطالعه حاضر علل قطع روش IUD، به ترتیب: خواهان فرزند ۳۰/۲٪، خونریزی ۲۷٪، تجویز پزشک ۱۷/۵٪ و حاملگی ناخواسته ۴/۷٪ و خروج IUD و یا تمام شدن مهلت آن ۴/۷٪ بیان شده است. در مطالعه‌ای مشابه در شهر همدان شایع‌ترین علت خارج سازی IUD (خونریزی ۵۸/۲٪) و پس از آن (درد ۱۱/۶٪) بوده است<sup>(۹)</sup>. در مطالعه دیگری در زاهدان علت قطع روش IUD عوارض جانبی گزارش شده است<sup>(۵)</sup>.

نتایج این مطالعه علل قطع روش کاندوم به ترتیب: ۴۵/۵ درصد تمایل به داشتن فرزند، ۲۱/۸ درصد حاملگی ناخواسته، ۱۱/۹ درصد مخالفت همسر و ۸ درصد خواستار روش طولانی مدت مثل IUD و یا استفاده از روش‌های دائمی را علت قطع مصرف گزارش نموده‌اند، اما در مطالعه‌ی دیگری که در روستاهای استان اصفهان انجام شده مهمترین علت قطع مصرف کاندوم را اینگونه گزارش کرده‌اند. مخالفت شوهر ۱۵/۴ درصد، حاملگی ناخواسته ۱۳ درصد و تمایل به داشتن فرزند ۱۲ درصد<sup>(۴)</sup>.

نتایج مطالعه حاضر، علل قطع استفاده از روش آمپول دپوپروورا را، ۷۵ درصد به علت بیماری و ۲۵ درصد به علت کمبود آمپول قطع روش داشته‌اند و مطالعه‌ای مشابه علت قطع مصرف آمپول تغییر روش عنوان گردیده است<sup>(۵)</sup>.

فریمن میزان بالایی از کارآیی آمپول دپوپروورا را در استفاده کنندگان از این روش گزارش نموده است<sup>(۸)</sup>.  
 مطالعه‌ای که در زاهدان انجام گرفته بیشترین تداوم طی سال اول

### منابع

۱- شمس برهان طوبی، اسعدی سوسن: *حاملگی‌های ناخواسته*، فصلنامه بهروز، زمستان ۱۳۸۱، سال سیزدهم، شماره چهارم، ص ۶۶.  
 ۲- تقوی محسن، جعفری ناهید، جمشیدیگی عصمت، واثق سیدحسین، آزاد امیرمسعود و اکبری محمداسماعیل: *دگرگونی*

- پانزدهم، شماره دوم، صفحه ۶۲.
- ۴- محمدزاده زهرا، مهدیزاده مرتضی، سلیمانی بهرام. *علل قطع استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری در زنان روستایی استان اصفهان در سال ۱۳۵۸*، پژوهش در علوم پزشکی، سال دوم، شماره ۳، صفحه ۱۶۸.
- ۵- رخشانی فاطمه، محمدی مهدی، مختاری مژگان، رفاهی رویا. *بررسی میزان تداوم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در شهر زاهدان*، خلاصه مقالات نهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری در ایران، سال سوم: شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۱: ۹-۴۴.
- ۶- نقیبی سیدابوالحسن. *بررسی طول مدت استفاده، علل قطع و عوارض ناشی از مصرف قرصهای خوراکی (OCP) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اسلامشهر*. خلاصه مقالات اولین کنگره آموزش بهداشت، طلوع بهداشت، سال دوم، شماره دوم و سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲، صفحه ۱۶۳.
- 7- Huber LR, Hogue CJ, Drewsc. *Contraceptive use and discontinuation: Findings From the contraceptive history, initiation and choice study*. Am joestet Gynecol. 194(5): 1290-5-Epub 2006, Apr 21.
- 8- Freeman S: *Nondailyhormonal contraception: considerations in contraceptive choice and patient counseling*. Jam Acad Nurse pract. 2004 Jun; 16(6): 226-36.
- ۹- بخت رفعت، خداکرمی بتول و آقا بابایی سودابه. *بررسی مدت استفاده و فراوانی علل خارج سازی IUD نوع cut380A*. مجله علمی دانشکده پرستاری مامایی همدان، سال سیزدهم، شماره بیست و سوم، تابستان ۸۴، صفحه ۹.
- 10- Adeyemi AS, Adekanle DA, Komolafe JO. *Patternof contraceptives choice among the married women attending the family planning clinic of a tertiary health institution*, Niger J Med, 2008 Jan-Mar; 17(1): 67-70.
- 11- Konje JC, Oladini F, Otolorin EO, Ladipo OO, *Factors determining the choice of contraceptive methods at the Family Planning clinic*, University College Hospital, Ibadan, Nigeria, Br J Fam Plann, 1998 Oct; 24(3): 107-10.