

## فازترایی: گذشته، حال و آینده

فرزانه فتحی<sup>۱</sup>، مهدی زین‌الدینی<sup>\*</sup>

### مقاله مروری

**مقدمه:** فازها به عنوان عوامل ویروسی، نقش مهمی در زیست‌فناوری مولکولی ایفا می‌کنند. این ویروس‌ها به عنوان ابزاری ایده‌آل در این حوزه شناخته شده و تحقیقات جدید نشان‌دهنده پتانسیل گسترده آن‌ها در زیست‌پزشکی است. تحقیقات در مورد فازها نشان داد که این ویروس‌ها دارای پتانسیل در توسعه درمان‌های جدید از جمله استفاده از فازها به عنوان عوامل ضد سرطان، حامل مولکول‌ها در تصویربرداری، بازسازی بافت، دارورسانی، توسعه واکسن و درمان بیماری کووید ۱۹ است. اثر باکتری‌کشی فاز توسط فناوری CRISPR-Cas برای درمان باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این مقاله مروری نقش کلیدی فازها در تحقیقات و توسعه درمان‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

**نتیجه‌گیری:** فازها به عنوان ابزاری با پتانسیل عظیم در زمینه مهندسی زیستی، مهندسی بافت، توسعه واکسن و ایمونوتراپی، ظهور کرده‌اند. ترکیب ژنتیکی فازها را می‌توان برای توسعه واکسن‌های جدید و سیستم‌های نمایش آنتی‌ژن مورد استفاده قرار داد. فازها فرصت‌های جدیدی را برای هدف قرار دادن فاکتورهای اختصاصی سلول‌های سرطانی، باز کرده‌اند.

**واژه‌های کلیدی:** فازدرمانی، نمایش فاز، واکسن فاز

**ارجاع:** فتحی فرزانه، زین‌الدینی مهدی. فازترایی: گذشته، حال و آینده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۴۰۳؛ ۳۲ (۱۱): ۷۹-۸۳۶۶.

۱ - پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

\* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۲۱۲۲۹۷۴۶۰۴، پست الکترونیکی: zeinoddini@modares.ac.ir، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۱۷۷۴

پيشرفت‌هاي اخير در اين زمينه و ظرفيت‌هاي بي‌نظير فاژها براي توسعه درمان‌هاي جديد و بهبود سلامت انسان‌ها را بررسي كنيم.

### روش بررسي

اين مطالعه مروري روايتي با استفاده از مقالات مرتبط از پايگاه‌هاي علمي معتبر انگليسي مانند PubMed, ProQuest, Scopus و موتور جستجوي Google Scholar در بازه زماني ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ انجام شد. كليدواژه‌هاي phage therapy, Phage vaccine و Phage display و تركيبات احتمالي آنها براي جستجو استفاده شد. پس از حذف موارد تكراري و ارزيابي عنوان و چكيده، ۲۸ مقاله براي مطالعه انتخاب شدند. ابتدا خلاصه‌اي از کاربردهاي غيردرماني فاژها ارايه مي‌گردد، سپس در بخش کاربردهاي درماني به بيان واكسن‌هاي فاژي، درمان بيماري سرطان و كوويد ۱۹ با استفاده از فاژها، نقش فاژها در بازسازي بافت، به‌كارگيري فناوري كريسپر در مقابله با باكتري‌ها و درمان عفونت‌هاي باكتريايي اشاره خواهد شد.

### نتايج


۱. کاربردهاي غيردرماني: فاژها به‌عنوان نانومواد در توسعه كاوشگرهاي زبستي مبتني بر فاژ براي تشخيص موادي مانند DNA، پروتئين‌ها، باكتري‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها استفاده مي‌شوند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، He و همكاران يك پروب مغناطيسي PAP<sub>1</sub> را براي تشخيص سودوموناس آئروژينوزا توسعه دادند. اين پروب ابتدا به باكتري متصل شده، سپس با آلوده كردن آن، باكتري ليز شده و ATP آزاد مي‌گردد كه به‌وسيله سيستم شبتابي لوسيفراز ATP-بيولومينسانس شناسايي شد (شكل ۱-الف). در سال ۱۹۳۸، فاژها براي طبقه‌بندي باكتري‌ها براساس تايپ فاژي مورد استفاده قرار گرفتند. فاژتايپينگ براساس تفاوت حساسيت باكتري‌ها به فاژها امكان شناسايي جنس‌ها و گونه‌ها را فراهم مي‌كند. از خواص نوري نانومواد مي‌توان براي تشخيص سريع و حساس استفاده كرد. به‌عنوان مثال، برخي از نانومواد فلزي (نقره يا طلا) داراي اثرات تشديد پلاسموني قوي هستند، بنابر اين مي‌توانند

### مقدمه

فاژدرماني اولين بار توسط Felix d'Herelle بيش از يك قرن پيش كشف شد و از آن زمان به‌عنوان يك ابزار مؤثر در توسعه زبست‌شناسي و درمان عفونت‌هاي باكتريايي مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از فاژها به‌عنوان تنها عوامل درماني در طول دوره عفونت باكتريايي به بيمار، فاژدرماني معمولي گفته مي‌شود (۱). باكتريوفاژها، ويروس‌هايي هستند كه به‌طور اختصاصي در باكتري‌ها تكثير مي‌شوند و به‌عنوان يكي از اشكال زنده غالب روي اين سياره شناخته مي‌شوند. اين ويروس‌ها به سلول‌هاي باكتريايي حمله کرده و در آنها تكثير مي‌شوند، و به همين دليل به‌عنوان ابزاري مؤثر در درمان عفونت‌هاي باكتريايي مورد توجه قرار گرفته‌اند (۲،۳). فاژدرماني، به‌ويژه پروتئين‌هاي مشتق‌شده از فاژ، به‌عنوان يك عامل ضدميكروبي قوي، مدت‌ها قبل از كشف پني‌سيلين شناخته شده بود. با كشف پني‌سيلين و ساير آنتي‌بيوتيك‌ها در دهه ۱۹۴۰، فاژدرماني به تدریج کنار گذاشته شد. در حال حاضر، فاژدرماني در ايالات متحده براي ضدعفوني كردن مواد غذايي و سطوح، دام و محصولات گياهي به‌كار مي‌رود. در روسيه و گرجستان، محصولات مبتني بر فاژ براي درمان عفونت‌هاي باكتريايي مقاوم به درمان‌هاي مرسوم در دسترس هستند (۳). فاژها، باكتري‌هاي گرم مثبت و منفي را آلوده کرده و معمولاً تحت تأثير مقاومت آنتي‌بيوتيكي قرار نمي‌گيرند، كه اين ويژگي آنها را به ابزار موثري در مقابله با باكتري‌هاي مقاوم به چند دارو (Multi Drug Resistant, MDR, XDR, and Extensively Drug Resistant) تبديل کرده است. فاژهاي بدخيم با چرخه ليتيك (lytic cycle) به دليل توانايي در ايجاد شكست سلولي و کاهش خطر انتقال ژن افقي از طريق ترانسداكشن (Transduction)، براي اهداف درماني ترجيح داده مي‌شوند. فاژدرماني به دو شكل مونوفاژ (استفاده از يك فاژ) و پلي فاژ (استفاده از چند فاژ، معروف به كوكتل فاژ) انجام مي‌شود (۳،۴). با توجه به توانايي‌هاي متعدد و کاربردهاي گسترده، فاژها نقش كليدي در آينده تحقيقات و درمان‌هاي زبست‌پزشكي ايفا خواهند كرد. ما در اين مقاله قصد داريم

مهندسی شده است. ماتریس‌های رنگی ساختاری براساس فاژها به سادگی با کنترل سرعت کشش بسته‌های فاژ M13 عامل‌دار ساخته شدند. این سیستم هنگام قرارگرفتن در معرض حلال‌های آلی، آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد شیمیایی مضر مانند تری‌نیتروتولون تغییرات رنگ قابل توجهی را نشان می‌دهد. از این پتانسیل به‌عنوان پلتفرمی برای نظارت بر محیط زیست در زمان واقعی استفاده می‌شود (۶).

مستقیماً حضور و کمیت اشیاء کشف شده در نمونه‌ها را هنگامی که کاوشگرهای هیبریدی جذب کرده و با اهداف مورد نظر کمپلکس تشکیل می‌دهند، منعکس کنند (۵). حس‌گرهای رنگ‌سنجی توجه قابل توجهی را در زمینه حس‌گرهای زیستی مبتنی بر باکتریوفاژ M13 به دلیل مزایایی مانند فرآیندهای ساخت آسان و روش‌های تشخیص سریع و مستقیم به خود جلب کرده‌اند. Moon و همکارانش گزارش کردند که دو نوع حسگر ساختاری مبتنی بر رنگ با استفاده از فاژهای M13



شکل ۱: الف- ترکیب فاژ و مهره مغناطیسی همجوشی بسیار ویژه برای ساخت یک پروب خاص برای غنی‌سازی سودوموناس آئروژینوزا و آزادسازی ATP از باکتری از طریق لیز فاژ (۵). ب- کاربردهای بالینی فاژ M13 در تحویل ژن و دارو، فاژتراپی، کشف دارو، توسعه واکنش و تشخیص گونه‌های زیستی (۱۳).

به‌ویژه مغز استفاده کند (شکل ۱-ب) (۱۰). این ویژگی‌ها نشان‌دهنده پتانسیل بالای فاژها در تحویل هدفمند دارو و واکنش و مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی است (۱۱). روش نمایش فاژ، که توسط Smith در سال ۱۹۸۵ معرفی شد، شامل تزئین کپسید فاژ با پپتیدها یا پروتئین‌ها است و به‌عنوان ابزار مؤثری در انتقال عوامل درمانی از جمله ژن‌ها، واکنش‌ها و داروها، هدف‌گیری سلول‌های یوکاریوتی، طراحی نانومواد، تحقیقات و درمان سرطان، تصویربرداری زیستی و بسیاری کاربردهای دیگر نقش مهمی ایفا می‌کند و رویکردی موثر برای شناسایی پروتئین‌ها، اپی‌توپ‌ها، میموتوپ‌ها (mimotope) و آنتی‌ژن‌ها است (شکل ۲-الف) (۱۲). فرآیند غربالگری کتابخانه‌های فاژ در برابر پروتئین‌های هدف با استفاده از

۲. کاربردهای درمانی: استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها منجر به ظهور پاتوژن‌های MDR شده‌است. فاژها با داشتن مکانیسم‌های ضدباکتری متعدد می‌توانند عفونت‌های مقاوم به دارو را کاهش دهند (۴). فاژهای لیتیک بدون تأثیر بر فلور طبیعی بدن و سلول‌های یوکاریوتی در محل عفونت تکثیر می‌شوند و نیازی به تنظیم دقیق دوز ندارند، زیرا تعداد آن‌ها به‌صورت خودکار در محل عفونت افزایش می‌یابد (۷،۸). پلاستیسیته ژنتیکی فاژها امکان تغییر سطح و استفاده از آن‌ها را برای اهداف پزشکی آینده‌نگر فراهم می‌کند (۹). فاژ M13 به‌عنوان نانوحامل چندظرفیتی عمل می‌کند و می‌تواند پپتیدها یا آنتی‌بادی‌های هدفمند را نمایش دهد تا تحویل دارو را بهبود بخشد و از ساختار نازک نانوالیاف مانند خود برای نفوذ به موانع


مبتنی بر فاز به نام RBDSARS-PLPs یا RBDSARS-PLPs با تزئین ذرات فازمانند (Phage-like particle)، (Receptor binding domain)، (RBD) نوترکیب از سندروم تنفسی خاورمیانه ساخته شده است (۲). واکسن مبتنی بر فاز محافظت کافی در برابر چندین بیماری ویروسی مانند ویروس نقص ایمنی انسانی، ویروس هرپس سیمپلکس و ویروس پاپیلومای انسانی نوع شانزده ارائه می‌کند. همچنین فناوری نمایش فاز، محافظت ضد ویروسی کافی در برابر ویروس هپاتیت سی انسانی و هپاتیت بی انسانی فراهم می‌کند (۱۱، ۲). واکسن‌های مبتنی بر فاز علیه عفونت‌های باکتریایی شامل کلامیدیا تراکوماتیس، اشرشیاکلا، ویبریولا، بوردتلاپروتوسیس در مدل‌های موشی امتحان شده و اثربخش بوده‌اند. همچنین، واکسن‌های مبتنی بر فاز علیه عفونت‌های انگل ریسیسفالوس میکروپلاس، فاسیولاهیاتیکا و پلاسمودیوم-فالسپاروم ساخته و آزمایش شده‌اند. واکسن‌های مبتنی بر فاز علیه بیماری‌های غیرعفونی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله این بیماری‌ها می‌توان به بیماری آلزایمر دمانس فرونتوتیمپورال (Frontotemporal dementia)، رینیت آلرژیک (Allergic rhinitis)، فشارخون بالا و بیماری‌های قلبی و عروقی اشاره کرد (۲).

**۲.۲. سرطان سینه و فازدرمانی:** فازدرمانی به‌عنوان روشی نوین و امیدوارکننده در درمان سرطان‌ها، به‌ویژه سرطان سینه در حال پیشرفت است. در سال ۲۰۰۴، An و همکارانش پپتید ضدسرطانی F56 را از طریق غربالگری کتابخانه فاز M13 جداسازی کردند که در موش‌های دارای نقص ایمنی شدید که با سلول‌های سرطان سینه انسانی کاشته شده بودند، اثرات ضد رگزایی و ضدمتاستاتیک نشان داد. همچنین، آنتی‌بادی انسانی scFv 12H7 با اثرات مهارتی تومور بر روی سلول‌های سرطان سینه سه‌گانه منفی شناسایی شد که به‌طور قابل توجهی اندازه تومور را کاهش داد. پپتید فاز LGLRGS� نیز که به‌طور خاص به سلول‌های گذار اپیتلیال - مزانشیمی متصل می‌شود، به‌عنوان ابزاری برای شناسایی اولیه سرطان سینه متاستاتیک


انتخاب میل ترکیبی در شرایط آزمایشگاهی به‌عنوان بیوپنینگ (biopanning) شناخته می‌شود. این فرآیند شامل انتخاب میل ترکیبی فازها با پروتئین‌های هدف و بررسی کاربردهای بالقوه آن‌ها است، که ممکن است با توالی‌یابی نسل بعدی (NGS، Next Generative Sequencing) بهبود یابد (۱۳).  
**۱.۲. واکسن‌های فاز در مبارزه با بیماری‌ها:** واکسیناسیون یکی از مؤثرترین روش‌ها برای پیشگیری از بیماری‌های عفونی است. فناوری واکسن‌های مبتنی بر فاز از فازها به‌عنوان حامل‌هایی برای ارائه آنتی‌ژن به سیستم ایمنی استفاده می‌کند تا پاسخ ایمنی مناسبی برای محافظت در برابر بیماری‌های خاص ایجاد شود. این فناوری شامل سه نوع واکسن اصلی است: واکسن‌های نمایشی، واکسن‌های DNA و واکسن‌های هیبریدی (شکل ۲-ب). در واکسن‌های نمایشی، از روش نمایش فاز برای بیان آنتی‌ژن‌ها استفاده می‌شود. در این روش، فازها، پروتئین‌ها یا پپتیدهای آنتی‌ژنی را با پروتئین‌های پوششی خود بیان می‌کنند یا آنتی‌ژن‌ها به‌صورت شیمیایی به سطوح فاز متصل می‌شوند. واکسن‌های DNA مبتنی بر فاز شامل یک قطعه ژنی کدکننده آنتی‌ژن یا تقلید از اپی‌توپ ژنوم فاز هستند که در یک کاست یوکاریوتی در پلاسمید کلون شده و سپس در ذرات فاز بسته‌بندی می‌شود. این فازها توسط سلول‌های ارائه‌دهنده آنتی‌ژن مانند ماکروفاژها و سلول‌های دندریتیک شناسایی و جذب می‌شوند، که به نوبه خود آنتی‌ژن را بیان کرده و پاسخ ایمنی تطبیقی را آغاز می‌کنند (۱۱، ۲، ۱). واکسن‌های هیبریدی ترکیبی از واکسن‌های نمایشی و واکسن‌های DNA هستند. برای تولید این واکسن‌ها، از چندین فاز لیتیک و رشته‌ای استفاده می‌شود، به‌ویژه آن‌هایی که در اشریشیاکلا تکثیر می‌شوند. فازهای رایج استفاده‌شده در مطالعات انتخابی شامل لامبدا، M13، AP205، T7، MS2، T4، Qβ و M13KE هستند. ذرات فاز نمی‌توانند در سلول‌های یوکاریوتی تکثیر شوند، بنابراین ایمن‌تر از سایر واکسن‌های ویروسی هستند. واکسن‌های مبتنی بر فاز معمولاً نیازی به ادجوانت ندارند، زیرا دی‌نوکلئوتید دئوکسی‌سیتیدیلات-فسفات-دئوکسی‌گوانیلات غیرمتیل‌دار در ژنوم فاز این اثر کمکی را القا می‌کند. واکسن

مورد توجه قرار گرفته است. پلتفرم واکسن مبتنی بر فاز با نمایش HER2 و نوع D16HER2 بر روی فازهای M13 ایجاد شده و نشان داده که می‌تواند پاسخ‌های ایمنی مؤثری علیه سلول‌های سرطانی حاوی HER2 ایجاد کند. فازدرمانی با استفاده از فازهای M13 به‌عنوان روشی نوآورانه در درمان سرطان مطرح شده‌است (شکل ۳) (۲).

معرفی شده‌است. هم‌چنین، ذرات فاز M13 نو ترکیب توانسته‌اند هشت ایمونوژن واکسن را نمایش دهند که استفاده از سه مورد از این واکسن‌ها در مدل‌های موش T1 BC4 به مهار واضح رشد تومور منجر شده‌است (۱۴). گیرنده دو فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (Human epidermal growth factor receptor-2) که با پیش‌آگهی ضعیف سرطان سینه مرتبط است، به‌عنوان یک هدف واکسن در برابر این بیماری



شکل ۲: الف- تحویل دارو و ژن با استفاده از ذرات فاز M13 و پروتئین‌های منتقله از فاز M13 (۱۳). ب- تصویری از واکسن‌های نمایش فاز، واکسن‌های DNA فاز و واکسن‌های فاز هیبریدی (۱۱).



شکل ۳: تصویری از مهندسی، کاربرد و انواع فازهای مورد استفاده در ایمونوتراپی سرطان (۲).

۵.۲. استفاده از فاژها در مقابله با کووید ۱۹: کروناویروس جدید (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)، SARS-CoV-2 باعث ایجاد بحران جهانی در بهداشت عمومی شده است. همراه با واکسن‌ها و داروها، محققان استفاده از نانومواد چندظرفیتی مبتنی بر فاژ را برای مقابله با این ویروس بررسی کرده‌اند. این نانومواد که میموتوپ‌های ویروسی پروتئین‌های اسپایک SARS-CoV-2 را نمایش می‌دهند، می‌توانند به گیرنده‌های سلول‌های انسانی متصل شوند و درک بهتری از مکانیسم عفونت ویروسی ارائه دهند (۱۷).

۶.۲. نقش فاژهای M13 در بازسازی پوست، استخوان، قلب و عروق، و اعصاب: بازسازی پوست با استفاده از فاژها به دلیل فعالیت ضدباکتریایی آن‌ها در مقابله با عفونت‌ها و مقاومت ضدباکتریایی مؤثر است. در سال ۲۰۲۰، Zhang و همکاران هیدروژل ABgel را تولید کردند که شامل مواد زیستی (مانند اسید هیالورونیک، اکس آلژینات، آنژلاتین)، باکتریوفاژها و فاکتورهای رشد (فاکتور رشد فیبروبلاست اسیدی) برای تقویت بازسازی زخم و مبارزه با باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک است. این مطالعه، نشان داد که ABgel بهتر از HOGgel (شامل اسید هیالورونیک، اگزالژینات و ژلاتین) عمل می‌کند. فاژهای مهندسی‌شده نیز به‌عنوان مواد زیست‌سازگار برای بازسازی استخوان استفاده شده‌اند، Wang و همکاران گزارش کرد که آرژنین-گلیسین-اسپارتیک اسید M13-(RGD) باعث ایجاد استئوتوژنز عروقی در داربست‌های سه بعدی از جمله HA/β-TCP و کیتوزان با سلول‌های بنیادی مزانشیمی می‌شود (۶). یکی از روش‌های مهندسی نانومواد مبتنی بر فاژ، تکنیک الکتروریسی است. الکتروریسی، الیافی را در محدوده نانومتر تا میکرومتر با عبور محلول‌های پلیمری از ولتاژ بالا ایجاد می‌کند. فاژ M13 با استفاده از تکنیک الکتروریسی برای ایجاد بیونانوفیبرها در مهندسی بافت به کار رفته و نانوالیاف الکتروریسی‌شده به دلیل ساختار متخلخل و نسبت سطح به حجم بالا شبیه ماتریکس خارج سلولی بافت‌های بومی است و همچنین رطوبت و مواد مغذی را برای محل زخم فراهم کرده و

۳.۲. تومور مغزی و فاژدرمانی: گلیوبلاستوما یکی از بدخیم‌ترین تومورهای اولیه مغزی است که به دلیل رشد سریع و مقاومت به درمان‌های مرسوم، درمان آن دشوار است. فاژ M13 به‌عنوان یک ابزار کمک‌کننده در افزایش اثربخشی داروهای شیمی‌درمانی مطرح شده است. در سال ۲۰۱۹، Przystal و همکارانش پیشنهاد کردند که تموزولوماید (Temozolomide)، داروی شیمی‌درمانی که قادر به عبور از سد خونی-مغزی است، می‌تواند با ژن‌درمانی ترکیب شده و از طریق فاژ M13 به‌طور مستقیم به محل گلیوبلاستوما منتقل شود. بیان *HSVtk* تحت کنترل یک پروموتور ناشی از تجویز TMZ قرار گرفت. ناقل، لیگاند RGD4C را در پروتئین پوشش جزئی pIII روی کپسید M13 که گیرنده اینتگرین  $\alpha v\beta 3$  موجود در سلول‌های تومور را متصل می‌کند، دارد. سپس، وکتور هیبریدی درونی شده و ژنوم نو ترکیب به هسته تحویل داده می‌شود تا بیان ژن درمانی به نام *HSVtk* را ایجاد کند که باعث مرگ سلولی با آپوپتوز می‌شود (۱۴، ۱۵). ترکیب ژن‌درمانی و شیمی‌درمانی از طریق فاژها می‌تواند بهبود قابل توجهی در اثربخشی درمان‌ها ایجاد کند (۲).

۴.۲. سرطان روده بزرگ و فاژدرمانی: سرطان کولورکتال (Colon Cancer)، (CRC) یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان است. رشد بیش از حد فوزوباکتریوم نوکلئاتوم (*Fusobacterium Nucleatum*، (Fn) در بافت CRC نقش مهمی در ایجاد یک ریز محیط توموری سرکوب‌کننده ایمنی ایفا می‌کند. استفاده از فاژ M13 به‌عنوان یک راه‌حل مناسب برای بازسازی ریز محیط ایمنی تومور و فعال‌سازی سلول‌های ایمنی ذاتی مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹، Dong و همکارانش درمان ترکیبی نانومواد فاژی را پیشنهاد کردند که شامل سویه فاژ M13 متصل به Fn بود. نانوذرات نقره به سطوح فاژ M13 متصل شدند تا سیستم هیبریداسیون M13@Ag ایجاد شود. این سیستم توانست Fn پروتومورال را حذف کرده، گسترش سلول‌های سرکوب‌گر مشتق از میلوئید را مهار و سلول‌های ایمنی ضد تومور را فعال کند (۱۶).

فعال سازی رگ‌زایی و تمایز سلولی را تسهیل می‌کنند (شکل ۴). در بازسازی قلب و عروق، فاز M13 به‌عنوان نانوحامل برای افزایش توانایی پیوند و عملکرد سلول‌های بنیادی استفاده می‌شود. *Jang* و همکاران فازهای M13 مهندسی‌شده‌ای را طراحی کردند که پپتیدهای RGD و SDKP را به‌ترتیب در pVIII و pIII نمایش می‌دهند که برای بررسی اثربخشی و ماندگاری پیوند سلول‌های پیش‌ساز قلب انسان (human Hcpc),cardiac progenitor cells در نواحی ایسکمیک قلب طراحی شدند. نتایج نشان داد که فازهای مهندسی‌شده رگ‌زایی و احتباس hCPC را در ناحیه انفارکتوس میوکارد موش افزایش داده‌اند. در بازسازی عصبی در دستگاه عصبی مرکزی شامل رشد مجدد آکسون‌ها از سلول‌های عصبی نوزاد به‌دنبال آسیب تروماتیک مغزی است. فازهای M13 می‌توانند سلول‌های درمانی را حمل کرده و پپتیدهای عملکردی را با نشانه‌های بیوشیمیایی در امتداد ویریون نانساختار نمایش دهند. میکروذرات فیبروئین ابریشم از پیل‌های کرم ابریشم برای زیست‌سازگاری تهیه شده و سپس با پلی‌اتیلن ایمین پوشانده شدند تا امکان اتصال الکترواستاتیکی فاز به آن‌ها فراهم شود. ترکیب فاز با میکروذرات فیبروئین ابریشم به بهبود ترمیم بافت مغز آسیب‌دیده در اثر سکته مغزی کمک کرد و نورون‌های غنی از آکسون را در مغز متصل کرده و عملکرد حرکتی اندام حیوانات را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشید (۱۴).

#### ۷.۲. کریسپر ابزاری نوین برای مقابله با باکتری‌های مقاوم


به دارو: اگرچه کریسپر به‌عنوان سامانه ایمنی باکتری در برابر باکتریوفازها معرفی شده است، اما سیستم کریسپر-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) به‌عنوان یک ابزار مولکولی قدرتمند، جایگزینی مؤثر برای آنتی‌بیوتیک‌های معمولی در درمان باکتری‌های مقاوم به دارو نیز شناخته شده‌است. این سیستم توانایی غیرفعال کردن ژن‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک و فاکتورهای بیماری‌زا باکتریایی را دارد و با برش مکان‌های خاص در ژنوم باکتری‌ها، آن‌ها را به باکتری‌های حساس تبدیل می‌کند. فازها به‌دلیل توانایی طبیعی خود در تزییق DNA به

باکتری‌ها، به‌عنوان حامل‌هایی مناسب برای انتقال سیستم کریسپر-Cas9 به باکتری‌ها استفاده می‌شوند. در این روش، کریسپر-Cas9 در ناقل‌های فازمید (phagemid) بسته‌بندی شده و باکتری‌های مقاوم را هدف قرار می‌دهد. پس از تحویل، سیستم کریسپر-Cas9 توالی‌های هدف را از طریق RNA راهنما شناسایی و باعث برش دو رشته‌ای DNA باکتریایی یا حذف پلاسمید مقاومت دارویی شده که منجر به مرگ سلولی می‌شود (شکل ۵-الف). مزیت این فناوری این است که می‌تواند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که طیف اثر ضد میکروبی آن در برابر توالی‌های DNA خاص یک باکتری خاص تنظیم شود. این ویژگی باعث می‌شود که تنها باکتری‌هایی که حاوی DNA هدف هستند از بین بروند، در حالی که سایر باکتری‌ها تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. از طریق این فناوری می‌توان فازهای مهندسی‌شده را مستقیماً تولید کرد (۱۸). از کریسپر هم‌چنین برای ساخت فازهای نو ترکیب و توسعه واکسن‌ها، از جمله واکسن کووید-۱۹، استفاده شده‌است. استفاده از نوکلئازهای Cas9 و نوع پنج Cas12a با مهندسی ژنوم کریسپر، توالی از درج‌های ژن SARS-CoV-2 نو ترکیب را در یک فاز برای توسعه واکسن T4 کووید ۱۹ ایجاد کرد؛ که پاسخ‌های آنتی‌بادی گسترده‌ای را علیه اجزای مختلف، مانند آنتی‌ژن‌های اختصاصی NP و E تحریک و اثربخشی آن را تأیید کرد (شکل ۵-ب) (۱۱). در مطالعه‌ای، *Robert* و همکاران یک سیستم CRISPR-Cas9 IIA را برای ایجاد شکست‌های دو رشته‌ای در ژن‌های *blaSHV-18* یا *blaNDM-1* ایجاد کردند که به ترتیب مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام با طیف گسترده را رمزگذاری می‌کند. آن‌ها نشان دادند که درمان *E. coli* *EMG2* با یک پلاسمید مبتنی بر M13 حاوی نوکلئاز هدایت‌شده با RNA منجر به کاهش ۲ تا ۳ برابری در سلول‌های زنده می‌شود (۱۳). باکتریوفازها مهارکننده‌هایی را رمزگذاری می‌کنند که به‌عنوان پروتئین‌های آنتی کریسپر شناخته می‌شوند. این بازدارنده‌ها سیستم دفاعی کریسپر-Cas9 باکتریایی را مختل کرده و منجر به توقف رشد و متعاقب آن شکست باکتریایی می‌شوند. پروتئین‌های

اوتیت خارجی و میانی مزمن است. در نواحی غیرقابل دسترس مانند گوش داخلی، استنشاق فاز می‌تواند یک مکمل درمانی ارزشمند باشد. مطالعه‌ای نشان داد که پپتیدهای خاصی می‌توانند از پرده گوش به گوش میانی منتقل شوند و کارایی درمان‌های ژنی یا دارویی را افزایش دهند. در درمان عفونت‌های دندان، فرمولاسیون پولوکسامر P407 حاوی فازهای انتروکوکی EFDG1 و EFLK1 توانست تعداد سلول‌های انتروکوک را در کانال‌های ریشه موش‌ها تا ۹۹ درصد کاهش دهد (۲۱،۲۲). عفونت‌های دستگاه گوارش و ادراری مشکلات شایعی هستند که اثرات زیانباری بر سلامت افراد دارند. فازدرمانی به‌عنوان رویکردی نوین برای درمان این عفونت‌ها به‌دلیل توانایی آن‌ها در هدف‌گیری باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک و تخریب بیوفیلم‌ها، مورد توجه قرار گرفته است (۲۰). برای درمان هلیکوباکتر پیلوری، عامل اصلی زخم معده، فازدرمانی می‌تواند بدون آسیب به تعادل میکروبیوتای روده مؤثر باشد (۱۵). هم‌چنین، فازها در درمان عفونت‌های ادراری ناشی از باکتری‌های انتروباکتریاسه، اشرشیاکلاهی و کلیسیلاپنومونیه نتایج مثبتی داشته‌اند (۲۱). علاوه بر این، فازدرمانی می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای درمان واژینوز ناشی از رشد بیش از حد گاردنرلاواژینالیس استفاده شود و به کاهش نرخ عود این عفونت کمک کند (۱۵).


آنتی‌کریسپر می‌توانند جایگزین خوبی برای پاتوژن‌های مقاوم به دارو باشند. کشف این بازدارنده‌ها در سیستم باکتریایی کریسپر دری جدید به روی رویکردهای درمانی جایگزین علیه باکتری‌های مقاوم به دارو باز کرده است (۳).

**۸.۲. نقش فازدرمانی در درمان عفونت‌ها: اگرچه کارآزمایی‌های بالینی هنوز شواهد قطعی برای اثربخشی فازدرمانی ارائه نکرده‌اند، اما تعداد مطالعات موردی موفق در استفاده از فازتراپی برای درمان عفونت‌های تهدیدکننده زندگی در حال افزایش است (جدول ۱) (۱۹). فازها به‌عنوان یک راه‌حل نوین و مؤثر برای درمان عفونت‌ها، به‌ویژه در برابر باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک، مطرح شده‌اند. بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی به‌دلیل گردش خون ضعیف، ایجاد بیوفیلم روی زخم‌های مزمن و مقاومت باکتریایی به آنتی‌بیوتیک‌ها، در معرض خطر بالای قطع عضو قرار دارند. فازها، که مستقل از مقاومت آنتی‌بیوتیکی عمل می‌کنند، می‌توانند بیوفیلم‌ها را تخریب کرده و عفونت‌های مزمن را پاکسازی کنند (۲۰). استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و دیگر پاتوژن‌ها مانند انتروکوک فکالیس و سودوموناس آئروژینوزا می‌توانند عفونت‌های چشمی ایجاد کنند. استفاده از فاز KPP12 به‌صورت قطره چشمی در درمان کراتیت در موش‌ها، موفق به کنترل عفونت و حفظ ساختار قرنیه شد (۱۵). سودوموناس آئروژینوزا یکی از شایع‌ترین عوامل ایجادکننده**



شکل ۴: الف- داربست متعارف مبتنی بر مواد زیستی با پپتیدهای نمایش داده‌شده توسط فاز و سلول‌های بنیادی کاشته‌شده برای نیچ‌های مهندسی‌شده. ب- داربست مبتنی بر فاز بیومیمتیک با سلول‌های بنیادی کاشته‌شده برای نیچ مهندسی‌شده (۱۴).





شکل ۵: الف- راه اندازی مجدد فاز و مونتاژ توسط DNA ژنومی، DNA سازواره سلول میزبان فاز با فازهای عفونی نو ترکیب جدید ترکیب می شود (۱۸). ب- مراحل ساخت نانوواکسن T4-SARS-CoV-2 با استفاده از کریسپر (۱۱).

جدول ۱: کارآزمایی های بالینی ثبت شده با استفاده از فازدرمانی در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ (۷، ۱۹).

سال	مسیر اولیه تجویز	نوع عفونت	پاتوژن باکتریایی	نتیجه بالینی
۲۰۲۰	آبیاری مثانه	عفونت مجاری ادراری	<i>Staphylococcus</i> <i>Streptococcus</i> <i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Proteus</i>	میزان موفقیت مشابه با دارونما (۷).
۲۰۲۰	داخل وریدی	باکتری، اندوکاردیت	<i>Staphylococcus aureus</i>	هیچ واکنش نامطلوبی گزارش نشد. این روش در عفونت های شدید از جمله اندوکاردیت عفونی و شوک سپتیک بی خطر است (۷).
۲۰۱۹	داخل وریدی	عفونت تیپیا/استخوان مربوط به تروما	<i>XDR Acinetobacter baumannii</i> and <i>MDR Klebsiella pneumoniae</i>	موفقیت بالینی: بهبود سریع بافت و ریشه کنی کشت های مثبت (۱۹).
۲۰۱۹	داخل وریدی	فیبروز سیستیک	<i>MDR Pseudomonas aeruginosa</i>	موفقیت بالینی: عدم وجود ذات الریه مکرر یا تشدید CF در ۱۰۰ روز پس از پیگیری (۱۹).
۲۰۱۹	داخل وریدی	فیبروز سیستیک	<i>Mycobacterium abscessus</i>	بهبود بالینی: بسته شدن زخم استرنوم، بهبود عملکرد کبد و رفع قابل توجه ندول های پوستی عفونی (۱۹).
۲۰۱۸	موضعی	عفونت مفصل پروتز (لگن)/استخوان	<i>MDR Pseudomonas aeruginosa</i> and <i>penicillin-resistant Staphylococcus aureus</i>	موفقیت بالینی: نتیجه در ۱۸ ماهگی مطلوب بود، بدون هیچ نشانه بالینی عفونت مداوم (۱۹).
۲۰۱۸	موضعی	زخم پای دیابتی با استئومیلیت/استخوان	<i>Penicillin-resistant Staphylococcus aureus</i>	موفقیت بالینی: رفع کامل زخم عفونی و استئومیلیت (با پیگیری ۳ سال بعد ثابت شد) (۱۹).
۲۰۱۸	موضعی	عفونت استخوان و مفاصل	<i>XDR Pseudomonas aeruginosa</i>	بهبود سریع و عدم رشد باکتری، اما بیمار در روز ۴۵ به دلیل پیشرفت قابل توجه متاستازهای ستون فقرات فوت کرد (۱۹).

## فرزانه فتحي و همكارش

۲۰۱۸	خوراكي و استنشاقی	فیبروز سیستیک	<i>MDR Achromobacter xylosoxidans</i>	موفقیت بالینی: رفع تنگی نفس، کاهش سرفه، بهبود عملکرد ریه از ۵۴٪ به ۸۴٪ (۱۹).
۲۰۱۸	داخل وریدی و استنشاقی	پنومونی مکرر (گیرنده پیوند ریه دو طرفه)	<i>MDR Pseudomonas aeruginosa</i>	موفقیت بالینی: رفع پنومونی و بهبود وضعیت تنفسی (۱۹).
۲۰۱۸	داخل وریدی	عفونت محل کرانیکتومی	<i>MDR Acinetobacter baumannii</i>	هیچ نشانه دیگری از عفونت در محل کرانیوتومی وجود ندارد. کشت باکتری های خون منفی است. درمان قطع شد. بیمار فوت کرد (۱۹).
۲۰۱۸	موضعی	عفونت پیوند عروق پروتز با فیستول همراه	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	موفقیت بالینی: هیچ نشانه ای از عود در ۱۸ ماهگی وجود ندارد (۱۹).
۲۰۱۸	داخل وریدی	باکتری می / سپسیس	<i>MDR Pseudomonas aeruginosa</i>	درمان با باکتریوفاز خون بیمار را استریل کرد، اما تزریق باید پس از جبران آنافیلاکسی به دلیل نارسایی پیشرونده قلبی متوقف شود (۱۹).

جدول ۲: مزایا، معایب و شباهت‌های فازدرمانی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک درمانی (۱).

مزایا	شباهت‌ها	معایب
ویژگی: میکروبیوتا را از بین نمی‌برد	تجویز به محیطی با pH خنثی شده نیاز دارد	ویژگی: باکتری عامل باید از قبل شناسایی شود، طیف اثر باریک
خود محدودسازی: پس از کشته شدن میزبان باکتریایی، فعالیت آن متوقف می‌شود	موفقیت درمانی به متغیرهایی مانند زمان شروع درمان بستگی دارد	القای تولید آنتی‌بادی خنثی کننده فاز (ارتباط بالینی باید تعیین شود)
برای بیماران مبتلا به آلرژی آنتی‌بیوتیکی موجود است	فعالیت تحت تأثیر سیستم ایمنی بدن بیمار است	حجم قابل توجهی از شواهد کوچک تر و کارآزمایی‌های بالینی به درستی طراحی شده که از اثربخشی آن حمایت می‌کند
ایمنی: هیچ تأثیری بر سلول‌های پستانداران ندارد	تطبيق پذیری در مسیرهای مدیریت	فقدان چارچوب قانونی خاص و مسائل حقوقی در مورد مالکیت معنوی
تولیدمثل نمایی امکان دوزهای کمتری را فراهم می‌کند	بروز مقاومت باکتریایی به عامل درمانی	
تکامل: اگر مقاومت ایجاد شود، فازها در کنار باکتری‌ها جهش می‌یابند		
فعالیت آنتی‌بیوفیلیم		
تولید ساده و ارزان		
فراگیر بودن		

## نتیجه‌گیری

علی‌رغم نیاز به روش‌های جدید برای درمان عفونت‌های باکتریایی، فازتراپی به‌طور معمول در کاربردهای بالینی استفاده نمی‌شود، زیرا فازها با آنتی‌بیوتیک‌های معمولی بسیار متفاوت هستند (جدول ۲) (۲۳). هم‌چنین، عدم وجود استاندارد روشن برای جداسازی و خالص‌سازی فازها باعث می‌شود اثربخشی آن‌ها متغیر باشد، لذا توسعه استراتژی‌های مناسب برای غلبه بر این محدودیت‌ها ضروری است (۲۴). با توجه به بحران فزاینده

مقاومت ضد میکروبی و پیش‌بینی افزایش مرگ‌ومیر تا سال ۲۰۵۰، نیاز فوری به توسعه درمان‌های ضدباکتریایی مانند فازها احساس می‌شود. یکی از راهکارها ایجاد بانک فاز ملی یا منطقه‌ای است (۲۵). شناسایی گیرنده‌های فاز می‌تواند بهبود طراحی کوکتل‌های فاز، کشف ضد میکروب‌های جدید و ترکیب هم‌افزایی فازها با آنتی‌بیوتیک‌ها را ممکن سازد (۲۶). تحقیقات جدید نشان می‌دهند که فازها ممکن است در ترکیب میکروبیوتای روده برای بهبود فرایندهای شناختی یا درمان

پتانسیل بالایی در مقابله با مقاومت دارویی دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک نقش مهمی در درمان عفونت‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک ایفا کند. درک تکامل باکتری‌ها در برابر فازها و مقاومت به فازدرمانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد مجموعه‌های جامع داده‌های ژنوتیپی و فنوتیپی و استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود انتخاب فاز کمک کند. همچنین، پیشرفت‌های فناوری در خالص‌سازی و مهندسی دقیق‌تر فازها پتانسیل بالایی برای بهبود این روش دارند. با وجود اینکه جنبه‌های بالینی فازدرمانی هنوز به‌طور کامل روشن نشده‌است، مهندسی ژنتیک امکان طراحی فازهایی با ویژگی‌های مطلوب را فراهم می‌کند. با تلاش‌های مستمر، فازها می‌توانند به یکی از ارکان اصلی درمان‌های ضدباکتریایی در آینده تبدیل شوند (۳،۱۲،۲۸).

### سپاس‌گزاری

این مطالعات در پژوهشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، انجام شده است که از مسئولین دانشگاه تشکر می‌گردد.

حامی مالی: ندارد.

تعارض در منافع: وجود ندارند.

### مشارکت نویسندگان

در ایده، نگارش و ویرایش مقاله کلیه نویسندگان مشارکت داشتند.

بیماری‌های باکتریایی سیستم عصبی مانند آنسفالیت مننگوکوکی مؤثر باشند. همچنین، ارتباط باکتریوفازها با سیستم‌های ضدویروسی شبیه کریسپر پیشرفت قابل‌توجهی است که می‌تواند چشم‌انداز جدیدی در فازدرمانی ایجاد کند (۲۷). فازها در تصویربرداری و تشخیص سلول‌های سرطانی با استفاده از نانولوله‌های کربنی و نانوذرات مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که دقت و کارایی تشخیص و درمان سرطان را بهبود می‌بخشند (۱۴). در آینده، فازها ممکن است به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای حل برخی مشکلات جهانی مانند افزایش تولید غذا با مبارزه با پاتوژن‌های باکتریایی، ضعیف کردن حشرات، نماتدها و سایر آفات یوکاریوتی که به میکروبیوتای باکتریایی خود وابسته هستند، کاهش گونه‌های باکتریایی محرک چاقی در میکروبیوتای روده انسان یا افزایش تکثیر گونه‌های تقویت‌کننده لاغری، کاهش جمعیت متانوژن‌ها و در نتیجه کاهش گرمایش جهانی مفید باشند. استفاده از فازها در صنایع غذایی می‌تواند برای جلوگیری از آلودگی توسط کرونوباکتر ساکازاکی در شیرخشک نوزاد و کلسترییدیوم بوتولینوم در عسل مفید باشد. کشورهای در حال توسعه باید به‌سمت استقلال در تولید و توسعه فازها پیش بروند تا بتوانند با بحران‌های بهداشتی مقابله کنند (۱۵). تحقیقات در حوزه فازدرمانی به‌سرعت در حال گسترش است و هر روز کاربردهای جدیدی برای این روش درمانی کشف می‌شود. اگرچه فازدرمانی هنوز به‌طور کامل جایگزین آنتی‌بیوتیک‌ها نشده‌است، اما

### References:

- 1-Gordillo Altamirano FL, Barr JJ. *Phage Therapy in the Postantibiotic Era*. Clin Microbiol Rev 2019; 32(2): e00066-18.
- 2-Palma M. *Aspects of Phage-Based Vaccines for Protein and Epitope Immunization*. Vaccines 2023; 11(2): 436.
- 3-Anyaegbunam NJ, Anekpo CC, Anyaegbunam ZK, Doowuese Y, Chinaka CB, Odo OJ, et al. *The Resurgence of Phage-Based Therapy in the Era of Increasing Antibiotic Resistance: From Research Progress to Challenges and Prospects*. Microbiol Res 2022; 264: 127155.

- 4-Luong T, Salabarria AC, Roach DR. *Phage Therapy in the Resistance Era: Where Do We Stand and Where are We Going?* Clin Ther 2020; 42(9): 1659-80.
- 5-Paramasivam K, Shen Y, Yuan J, Waheed I, Mao C, Zhou X. *Advances in the Development of Phage-Based Probes for Detection of Bio-Species.* Biosensors 2022; 12(1): 30.
- 6-Kim SM, Heo HR, Kim CS, Shin HH. *Genetically Engineered Bacteriophages as Novel Nanomaterials: Applications Beyond Antimicrobial Agents.* Ront Bioeng Biotechnol 2024; 12: 1319830.
- 7-Pirnay JP, Ferry T, Resch G. *Recent Progress Toward the Implementation of Phage Therapy in Western Medicine.* FEMS Microbiol Rev 2022; 46(1): fuab040.
- 8- Samaee HR, Eslami G, Rahimzadeh G, Saeedi M, Badabi AD, Asare-Addo K, et al. *Inhalation Phage Therapy as a New Approach to Preventing Secondary Bacterial Pneumonia in Patients with Moderate to Severe COVID-19: A Double-Blind Clinical Trial Study.* J Drug Deliv Sci Technol 2023; 84: 104486.
- 9- Ragothaman M, Yoo SY. *Engineered Phage-Based Cancer Vaccines: Current Advances and Future Directions.* Vaccines (Basel) 2023; 11(5): 919.
- 10-Nazir A, Song J, Chen Y, Liu Y. *Phage-Derived Depolymerase: Its Possible Role for Secondary Bacterial Infections in COVID-19 Patients.* Microorganisms 2023; 11(2): 424.
- 11-Ul Haq I, Krukiewicz K, Yahya G, Haq MU, Maryam S, Mosbah RA, et al. *The Breadth of Bacteriophages Contributing to the Development of the Phage-Based Vaccines for COVID-19: An Ideal Platform to Design the Multiplex Vaccine.* Int J Mol Sci. 2023; 24(2): 1536.
- 12-Rehman S, Ali Z, Khan M, Bostan N, Naseem S. *The Dawn of Phage Therapy.* Rev Med Virol 2019; 29(4): e2041.
- 13-Fadaie M, Dianat-Moghadam H, Ghafouri E, Naderi S, Darvishali MH, et al. *Unraveling the Potential of M13 Phages in Biomedicine: Advancing Drug Nanodelivery and Gene Therapy.* Environ Res 2023; 238(Pt 1): 11713.
- 14-Chang C, Guo W, Yu X, Guo C, Zhou N, Guo X, et al. *Engineered M13 Phage as A Novel Therapeutic Bionanomaterial for Clinical Applications: From Tissue Regeneration to Cancer Therapy.* Mater Today Bio 2023; 20: 100612.
- 15-García-Cruz JC, Huelgas-Méndez D, Jiménez-Zúñiga JS, Rebollar-Juárez X, Hernández-Garnica M, Fernández-Presas AM, et al. *Myriad Applications of Bacteriophages Beyond Phage Therapy.* PeerJ 2023; 11: e15272.
- 16-Dong X, Pan P, Zheng DW, Bao P, Zeng X, Zhang XZ. *Bioinorganic Hybrid Bacteriophage for Modulation of Intestinal Microbiota to Remodel Tumor-Immune Microenvironment Against Colorectal Cancer.* Sci Adv 2020; 6(20): eaba1590.
- 17-Petrenko VA, Gillespie JW, De Plano LM, Shokhen MA. *Phage-Displayed Mimotopes of SARS-Cov-2 Spike Protein Targeted to Authentic and Alternative Cellular Receptors.* Viruses 2022; 14(2): 384.
- 18-Balcha FB, Neja SA. *CRISPR-Cas9 Mediated Phage Therapy as an Alternative to Antibiotics.* Animal Diseases 2023; 3(1): 1-1.

- 19-Pires DP, Costa AR, Pinto G, Meneses L, Azeredo J. *Current Challenges and Future Opportunities of Phage Therapy*. FEMS Microbiol Rev 2020; 44(6): 684-700.
- 20-Young MJ, Hall LM, Merabishvili M, Pirnay JP, Clark JR, Jones JD. *Phage Therapy for Diabetic Foot Infection: A Case Series*. Clin Ther 2023; 45(8): 797-801.
- 21-Melo LD, Oliveira H, Pires DP, Dabrowska K, Azeredo J. *Phage Therapy Efficacy: A Review of the Last 10 Years of Preclinical Studies*. Crit Rev Microbiol 2020; 46(1): 78-99.
- 22-Pierzynowska K, Morcinek-Orłowska J, Gaffke L, Jaroszewicz W, Skowron PM, Węgrzyn G. *Applications of the Phage Display Technology in Molecular Biology, Biotechnology and Medicine*. Crit Rev Microbiol. 2024; 50(4): 450-90.
- 23-Nilsson AS. *Pharmacological Limitations of Phage Therapy*. Ups J Med Sci 2019; 124(4): 218-27.
- 24-Lin J, Du F, Long M, Li P. *Limitations of Phage Therapy and Corresponding Optimization Strategies: A Review*. Molecules 2022; 27(6): 1857.
- 25-Nagel T, Musila L, Muthoni M, Nikolich M, Nakavuma JL, Clokie MR. *Phage Banks as Potential Tools to Rapidly and Cost-Effectively Manage Antimicrobial Resistance in the Developing World*. Curr Opin Virol 2022; 53: 101208.
- 26-Altamirano FL, Barr JJ. *Unlocking the Next Generation of Phage Therapy: The Key is in the Receptors*. Curr Opin Virol 2021; 68: 115-23.
- 27-Jędrusiak A, Fortuna W, Majewska J, Górski A, Jończyk-Matysiak E. *Phage Interactions with the Nervous System in Health and Disease*. Cells 2023; 12(13): 1720.
- 28-Gelman D, Yerushalmy O, Alkalay-Oren S, Rakov C, Ben-Porat S, Khalifa L, et al. *Clinical Phage Microbiology: A Suggested Framework and Recommendations for the In-Vitro Matching Steps of Phage Therapy*. Lancet Microbe 2021; 2(10): e555-63.

## Phage Therapy: Past, Present and Future

Farzaneh Fathi<sup>1</sup>, Mehdi Zeinoddini<sup>\*2</sup>

### Review Article

**Introduction:** As viral agents, phages serve a significant purpose in molecular biotechnology. These viruses are considered as ideal tools in this field and recent studies revealed their wide potential in biomedicine. Research on phages showed that these viruses have the potential to develop new treatments, encompassing phages as anti-cancer solutions, transporters of imaging substances, tissue repair, medication distribution, vaccine formulation, and addressing COVID-19. The bactericidal effect of phage via CRISPR-Cas technology is also used to treat antibiotic-resistant bacteria. In this review study, we will explore the key role of phages in the research and development of future treatments.

**Conclusion:** Phages have arisen in the field of bioengineering with great potential in tissue engineering, vaccine development, and immunotherapy. The genetic composition of phages can be utilized to develop new vaccines and antigen display systems. Phages have opened new opportunities to target specific molecular determinants of cancer cells.

**Keywords:** phage therapy, phage display, phage vaccine.

**Citation:** Fathi F, Zeinoddini M. **Phage Therapy: Past, Present and Future.** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2025; 32(11): 8366-79.

<sup>1</sup>Department of Science and Biotechnology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

**\*Corresponding author:** Tel: 02122974604, email: zeinoddini52@mut.ac.ir